This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

044 106 451 651

C
43
H77.1

HARVARD UNIVERSITY

LIBRARY

OF THE

GRAY HERBARIUM

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

T. Conr. Hoppens

Geraische Flora

mit einer Vorrede begleitet

von

Johann Ernst Immanuel Walch

H. F. S. Weimar- und Eisenach- HofRath, der Beredsamkeit und Dichtkunst ordentlichen öffentlichen Lehrer auf der Universität zu Jena.

JENA

in Christian Friedrich Gollners Buchhandlung

1774.

Digitized by Google

Mar. 31, 1911
Gray Herbarium
Harvard University.

FL
43
H77.1

67

Digitized by Google

Dem

Hochwohlgebohrnen

und

Hochgelahrten Herrn

Herrn

Casimir Christoph Schmiedel

Marggräflich Anspachischem geheimden HofRath, erstem Leibarzt, Deputato der Friederich-Alexanders Universität zu Erlangen, wie auch hochansehnlichen Scholarchen,

Seinem hochzuverehrendem Gönner.

Digitized by Google

Digitized by Google

Hochwohlgebohrner Herr,
Hochzuverehrender Gönner,

Mit einem lebhafften Vergnügen erinnere ich mich noch derjenigen Stunden, in welchen ich einen für mich höchst lehrreichen Umgang mit Ew. Hochwohlgebohrnen zu geniessen, das Glück gehabt.

Digitized by Google

Ew. Hochwohlgebohren sind iederzeit nicht nur ein Freund der Natur gewesen, sondern Sie haben sich auch um deren Geschichte grose Verdienste erworben, die Dero Nahmen der späten Nachwelt anpreisen werden. Diese Verdienste haben Hochdieselben durch die Bekanntmachung so vieler seltenen Versteinerungen, welche dem schönen Knorrischen PetrefactenWerck mit einverleibet sind, ansehnlich vermehret.

Unter den so mancherley Feldern der Naturgeschichte ist auch das botanische Dero fruchtbaren Aufmerksamkeit nicht entgangen. Hochdieselben haben sich auch hier als einen ächten Kenner bewiesen. Und da ich schon längst einer bequemen Gelegenheit entgegen gesehen, ein öffentliches Denkmal meiner unvergröserlichen

Hoch-

Digitized by Google

Hochachtung gegen Ew. Hochwohlgebohren zu ſtiften, ſo ergreife ich die, ſo ſich mir iezt anbietet, deſto begieriger.

Ich erbitte mir nehmlich die Erlaubnis, Ew. Hochwohlgebohren berühmten Nahmen meiner Geraiſchen Flora vorſetzen und ſie Hochdenenſelben zueignen zu dürfen. Da ich dabey die reineſte Abſicht habe, ſo mache ich mir zugleich zu einer hochgeneigten Aufnahme iezgedachter Flora die zuverläſſigſte Hofnung.

Ich habe von Jugend auf an der Betrachtung der Natur mein einziges Vergnügen gefunden und dieſe Betrachtung war mir der ſicherſte Weg, der mich täglich zu der Bewunderung und Verherrlichung des groſen Herrn und Schöpfers der Natur leitete. Ich genieſe iezt davon in meinem

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

T. C. Hoppens

Geraische Flora

mit einer Vorrede begleitet

von

Johann Ernst Immanuel Walch

H. S. S. Weimar- und Eisenach- HofRath, der Beredsamkeit und Dichtkunst ordentlichen öffentlichen Lehrer auf der Universität zu Jena.

JENA

bey Christian Friedrich Gollners Buchhandlung

1774.

Digitized by Google

Mar 31, 1911
Gray Herbarium
Harvard University.

FL
43
H77.1

67

Digitized by Google

Dem

Hochwohlgebohrnen

und

Hochgelahrten Herrn

Herrn

Caſimir Chriſtoph Schmiedel

Marggräflich Anſpachiſchem geheimden HofRath, erſtem Leibarzt, Deputato der Friederich-Alexanders Univerſität zu Erlangen, wie auch hochanſehnlichen Scholarchen,

Seinem hochzuverehrendem Gönner.

Digitized by Google

Digitized by Google

Hochwohlgebohrner Herr,
Hochzuverehrender Gönner,

Mit einem lebhafften Vergnügen erinnere ich mich noch derjenigen Stunden, in welchen ich einen für mich höchst lehrreichen Umgang mit Ew. Hochwohlgebohrnen zu geniessen, das Glück gehabt.

Digitized by Google

Ew. Hochwohlgebohren sind iederzeit nicht nur ein Freund der Natur gewesen, sondern Sie haben sich auch um deren Geschichte grose Verdienste erworben, die Dero Nahmen der späten Nachwelt anpreisen werden. Diese Verdienste haben Hochdieselben durch die Bekanntmachung so vieler seltenen Versteinerungen, welche dem schönen Knorrischen PetrefactenWerck mit einverleibet sind, ansehnlich vermehret.

Unter den so mancherley Feldern der Naturgeschichte ist auch das botanische Dero fruchtbaren Aufmerksamkeit nicht entgangen. Hochdieselben haben sich auch hier als einen ächten Kenner bewiesen. Und da ich schon längst einer bequemen Gelegenheit entgegen gesehen, ein öffentliches Denkmal meiner unvergröserlichen

Hoch-

Digitized by Google

Hochachtung gegen Ew. Hochwohlgebohren zu ſtiften, ſo ergreife ich die, ſo ſich mir iezt anbietet, deſto begieriger.

Ich erbitte mir nehmlich die Erlaubnis, Ew. Hochwohlgebohren berühmten Nahmen meiner Geraiſchen Flora vorſetzen und ſie Hochdenenſelben zueignen zu dürfen. Da ich dabey die reineſte Abſicht habe, ſo mache ich mir zugleich zu einer hochgeneigten Aufnahme ietzgedachter Flora die zuverläſſigſte Hofnung.

Ich habe von Jugend auf an der Betrachtung der Natur mein eintziges Vergnügen gefunden und dieſe Betrachtung war mir der ſicherſte Weg, der mich täglich zu der Bewunderung und Verherrlichung des groſen Herrn und Schöpfers der Natur leitete. Ich genieſe iezt davon in meinem

Digitized by Google

zum Alter die seligsten Früchte, wofür ich Gott nicht genugsam danken kan.

Ew. Hochwohlgebohren hochschätzbarer Gewogenheit empfehle ich mich auch ferner mit derjenigen unvergeßlichen Hochachtung, mit welcher ich zeitlebens seyn werde

Ew. Hochwohlgebohrnen

gehorsamster Diener

Tob. Conrad Hoppe.

Digitized by Google

Vorrede.

Der Verfasser dieser Geraischen Flora, Herr Carl Tobias Hoppe, verdient um so mehr die Hochachtung der Naturfreunde, da er von Jugend auf nicht professionsmäsig studiert, die lateinische Sprache nicht gelernet, sich beständig der Handlung gewidmet,

Digitized by Google

und es dennoch in der Naturkenntniß, gröſtentheils durch eigene Beobachtungen, weiter als viele andere gebracht, die mehr Gelegenheit und Hülfsmittel dazu gehabt haben. Er hat bereits ſeit vielen Jahren die ſich erlangten Kenntniße nicht blos zu ſeinem eigenen Vergnügen angewendet, ſondern ſie auch durch verſchiedene kleine Schriften und Aufſätze andern nutzbar zu machen geſucht. Sie ſind insgeſamt wohl aufgenommen worden, beſonders von denienigen billigen Leſern, die in Schriften dieſer Art mehr auf die Sachen, als auf deren Einkleidung zu ſehen gewohnt ſind. Das machte, weil er eigene Beobachtungen gröſtentheils lieferte und nicht aus zehn Abhandlungen die eilfte zuſammen ſchrieb.

In

Vorrede

In seinem hohen Alter stellt er anietzt seine Geraische Flora ans Licht, und ich hoffe zuverlässig, daß sie von den Liebhabern der Kräuterkunde gut aufgenommen und, in Betracht der kurz vorher angeführten Umstände, in aller Rücksicht auf billige Art beurtheilt werden wird. Ein gelehrter Freund von ihm und mir, der es in der Botanik weit gebracht, aus Bescheidenheit aber, seinen Nahmen zu nennen, mir nicht gestatten wollen, hat mit vieler Sorgfalt die Revision des Manuscripts übernommen und dasselbe zum Druck fähig und geschickt gemacht. Ihm haben wir dahero die Bekanntmachung dieser Hoppischen Flora vorzüglich zu danken.

Vielleicht dürften manche diese Geraische

Flora

Digitized by Google

Flora für überflüssig halten, weil ihre Nachbarin, die Jenaische, die wir von Ruppen haben, eben dasienige in ihren Gefilden, was diese in den ihrigen, besitze. Allein eine Vergleichung beyder Floren wird das Gegentheil zeigen. Freylich sind eine Menge wildwachsender Kräuter beyden Gegenden, so wie vielen andern, gemein. Dadurch aber wird der Nutzen einzelner Floren keinesweges aufgehoben. Sie sind vielmehr zur künftigen Vervollständigung einer allgemeinen Flora von Deutschland unumgänglich nothwendig.

Unser Herr Verfasser hat sich schon in seinen iungen Jahren mit der Botanik beschäfftigt, und also ehe noch das Linneische System in unserm Deutschland bekannt und an die Stelle der bisher üblich gewesenen gesezt wurde. Er

hielt

Digitized by Google

hielt sich an die Ruppische Ordnung des Rivins, weil damals dieselbe, besonders in unsern Gegenden, die gewöhnlichste und bekannteste war. Wer weiß, wie schwer es hält, einmal angenommene und offt mühsam erlernte Systeme zu verlassen, und gleichsam von neuem wieder in die Schule zu gehen, wer da weiß, mit wie vieler Mühe die Erlernung einer neuen botanischen Sprache verbunden ist, zumal bey Personen, deren Gedächtnißkraft mit dem Alter mehr ab- als zu nimmt, der wird es unsern Herren Zoppen gewiß nicht zur Last legen, daß er die Mode nicht mit gemacht und ein Linneaner geworden. Das wer für ihn, zumal bey seinen weitläuftigen Handlungsgeschäfften, eine ganz unmögliche Sache.

Dieses sage ich, um die Beybehaltung

Digitized by Google

der Ruppischen Ordnung zu entschuldigen, welche in dieser Flora zum Grund gelegt worden. Es findet diese Entschuldigung desto eher statt, da der gelehrte Freund, dem wir die Berichtigung dieser Hoppischen Flora zu danken haben, denen gewöhnlichen und von Ruppen angenommenen Benennungen die Linneischen beygefügt, und damit diesem zu machendem Vorwurf sattsam vorgebeugt. Durch diese getroffene Auskunfft gewinnen beyde, die entweder an die Ruppische oder Linneische Nomenclatur gewöhnt sind. Jene können dadurch nach und nach die Linneische Sprache lernen, diese können mit leichter Mühe dasjenige, so sie zu suchen haben, in dieser Flora finden, wenn sie gleich nicht Linneisch ist. Durch dieses Mittel wurde auch der Beschwerlichkeit überhoben, durch

Bey-

Digitized by Google

Beysetzung der so vielen und mannigfaltigen Synonymien diese Schrifft ohne Noth weitläuftig zu machen.

Gleichwohl ist in der Ruppischen Ordnung selbst hie und da ein und das andere, wenn es nöthig war, verbessert worden. So findet man hier z. E. die Storchschnäbel beysammen verzeichnet, welche, wie bekannt, von Ruppen sind getrennt worden. Bey den Schwämmen hat man der Linneischen Eintheilung gefolgt, ohne dabey auf die so mannigfaltigen und nicht sattsam unterschiedenen Spielarten mit Rücksicht zu nehmen.

Der Hr V. hat sich bemühet, den Standort der Gewächse in seiner Gegend sorgfältig anzuzeigen. Doch ist ihm solches nicht bey allen möglich gewesen. Er hat seit langer Zeit

Digitized by Google

an dieser Flora gesammlet, und da er nicht bey allen Pflanzen sogleich ihren Ort angemerkt, so konnte es nicht anders kommen, als daß ihm ein und der andere wieder entfallen muste.

Ich wünsche übrigens, daß diese Schrifft bey allen Freunden und Liebhabern des Pflanzenreichs eine günstige Aufnahme erhalten und vielen Nutzen stifften möge. Diesen wird ihr rechtschaffener Verfasser als eine wahre Belohnung seiner vielen an diese Schrifft verwendeten Mühe und Arbeit ansehen. Jena, den vierten Oct. 1774.

Joh. Ernst Immanuel Walch.

Erste

Erſte Klaſſe.

Gewächſe mit gleichförmig einblätteriger Blume.

1.

Mit einzelnen unbekleideten Samen.

Mirabilis. Riu.

Mirabilis (*Ialappa*) floribus congeſtis terminalibus erectis. Lin. Spec. Plant. 252

Wunder-Blume. Blüht im Auguſt in Gärten, mit verſchiedenen Abänderungen von Farben.

2.

Mit doppelten unbekleideten Samen.

Gallium luteum. C. Bauh.

Galium (*verum*) foliis octonis linearibus ſulcatis ramis floriferis breuibus. Lin. 155.

Meyenkraut, Labkraut, unſer Frauen Bettſtroh. Blüht im Juni und Juli an den graſigten Rändern nach Pforte und der Nonneburger Anhöhe zu.

Digitized by Google

Gallium album latifolium pratenſe. Rupp.
Mollugo montana anguſtifolia ſ. Gallium album latifolium. C. Bauh.
Galium (*Mollugo*) foliis octonis ouato-linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. Lin. 156.
Am Haynberge.

Gallium album ſupinum, multicaule anguſtifolium polyſpermum. Rup.
Galium (*Saxatile*) foliis ſenis obouatis obtuſis caule ramoſiſſimo procumbente. Lin. 154.
Bey dem ſo genannten Erdfalle.

Gallium album latifolium ſyluaticum. Rup.
Galium (*Syluaticum*) foliis octonis laeuibus, ſubtus ſcabris, floralibus binis, pedunculis capillaribus, caule laeui. Linn. 155.
Am Haynberge.

Aparine vulgaris. C. Bauh.
Galium (*Aparine*) foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris, retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido. Lin. 157.
Klebkraut. Blüht im May an Zäunen.

Aſperula laeuior acuto quaterno folio. Rupp.
Galium (*boreale*) foliis quaternis lanceolatis trineruiis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſpidis. Lin. 156.
Bey Mittelpölnitz auf feuchten Wieſen und in Wäldern.

Aſperula quadrifolia paluſtris. Rupp.
Galium (*paluſtre*) foliis quaternis obouatis inaequalibus, caulibus diffuſis. Lin. 153.
Am Haynberge und Martins-Grunde.

Aſperula ſyluatica. Rupp.

Aſperula

Aſperula (*odorata*) foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis. Lin. 150.

Stern-Leberkraut, Waldmeiſter. Im Hayнberge hinter dem Schloſſe, und in verſchiedenen Gründen.

Aſperula coerulea aruenſis. C. Bauh.

Aſperula (*aruenſis*) foliis ſenis, floribus ſeſſilibus aggregatis terminalibus. Lin. 150.

Blüht vom Juni bis im September auf Aeckern.

Rubeola Tournef. Rubia cynanchica. C. Bauh.

Aſperula (*cynanchica*) foliis quaternis linearibus ſuperioribus oppoſitis ſtipulatis, caule erecto, floribus quadrifidis. Lin. 151.

Cruciata hirſuta. C. Bauh.

Valantia (*cruciata*) floribus maſculis quadrifidis pedunculis diphyllis. Lin. 1491.

Gelb Kreuzkraut, blüht im May an Zäunen.

3.

Mit vier unbekleideten Samen.

Symphytum Conſolida maior. C. Bauh.

Symphytum (*officinale*) foliis ouato-lanceolatis decurrentibus. Lin. 195.

Wallwurz, Schwarzwurz. Blüht mit weiſſer, rother, auch blauer Blume, bey Pubitz an ſumpfigten Wieſen.

Pulmonaria folio non maculoſo. Cluſ.

Pulmonaria (*officinalis* γ) foliis radicalibus ouato-cordatis ſcabris. Lin. 194.

Lungenkraut, blaue Schlüſſelblumen. Am Haynberge im Merz.

Symphytum maculoſum ſ. Pulmonaria latifolia. C. Bauh.

Pulmonaria officinalis. α. Linn. 194.

Digitized by Google

Blüht mit weiſſer, blauer und fleiſchfarbener Blüthe.

Pulmonaria montana anguſtifolia. Rupp.

Pulmonaria (*anguſtifolia*) foliis radicalibus lanceolatis. Lin. 194.

Bey Kunndorf ohnweit Zeitz an Bergen.

Myoſotis paluſtris maior perennis. Rupp.

Echium Scorpioides paluſtre. C. Bauh.

Myoſotis (*Scorpioides paluſtris* β) ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis. Lin. 188.

Vergiß mein nicht. Blüht im May am Haynberge bey dem Erdfalle.

Myoſotis paluſtris maior, flore albo et carneo. Rupp.

— paluſtris minor flore coeruleo et albo.

Varietäten von iener. Bey der Waſſerkunſt, bey Burksdorf nach Schmelle, uud auf den Wieſen über der Elſter.

Myoſotis minor aruenſis. Rupp. Echium Scorpioides aruenſe. C. Bauh.

Myoſotis *Scorpioides aruenſis* α. Lin. 188.

Blüht vom April den ganzen Sommer.

Cynogloſſum minus. C. Bauh. Lappula. Riu.

Myoſotis (*Lappula*) ſeminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis. Lin. 189.

Blüht im Juli.

Lithoſpermum maius erectum. C. Bauh.

Lithoſpermum (*officinale*) ſeminibus laeuibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis. Lin. 189.

Steinſame, Steinhirſe; Blüht vom May bis im Juli.

Bugloſſum anguſtifolium maius. C. Bauh.

Anchuſa.

Digitized by Google

Anchusa (*officinalis*) foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. Lin. 191.

Ochsenzunge. Blüht auf Feldern im May und Juni.

Omphalodes lusitanica, lini folio. Tourn. Linum vmbilicatum. Park.

Cynoglossum (*linifolium*) foliis lineari-lanceolatis glabris. Lin. 193.

Omphalodes pumila verna, Symphyti folio. Tournef.

Cynoglossum (*omphalodes*) repens, foliis radicalibus cordatis. Lin. 193.

Blüht im April und May.

Borrago officinalis Rupp.

Borrago (*officinalis*) foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. Lin. 197.

Borragen, Borretsch. Blüht im Junio und Julio mit blauen und weissen Blumen.

4.

Mit mehrern unbekleideten Samen.

Malua sylvestris folio subrotundo. C. Bauh.

Malua (*rotundifolia*) caule prostrato, foliis cordato-orbiculatis, obsolete quinquelobis, pedunculis fructiferis declinatis. Lin. 969.

Pappel. Blüht vom Junio bis im September an Zäunen und ungebauten Oertern.

Malua sylvestris folio sinuato. C. Bauh.

Malua (*Sylvestris*) caule erecto herbaceo, foliis septem lobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. Lin. 969.

Haasenpappel. In Gärten und auf Schutthaufen der grossen Brücke.

Digitized by Google

Malua folio ficus altera, C. Bauh.

Malua (*Mauritiana* β.) caule erecto herbaceo, foliis quinquelobatis obtusis, pedunculis petiolisque glabriusculis. Lin. 970.

In Gärten.

Malua foliis crispis, C. Bauh.

Malua (*crispa*) caule erecto, foliis angulatis crispis, floribus auxiliaribus glomeratis. Lin. 970.

Im Geimslschen Garten.

Malua sylvestris altissima, folio cannabino, flore amplo, Rupp.

Alcea vulgaris maior, C. Bauh.

Malua (*Alcea*) caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis, Lin. 971.

Siegmarswurz, Felrißpappeln. Bey dem Buchwerke nach Zwätzen und auf dem Felde unter Köschwitz.

Malua arborea veneta dicta, paruo flore, C. Bauh.

Lauatera (*arborea*) caule arboreo, foliis septem angularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis vnifloris axillaribus, Lin. 972.

Im Kaufmanns-Garten.

Malua montana mollis et incana, flore maiore. Rupp.

Althaea flore maiore, C. Bauh.

Lauatera (*thuringiaca*) caule herbaceo, fructibus denudatis, calycibus incisis, Lin. 973.

In der Gleist, nicht weit von Bürgel.

Malua rosea folio subrotundo, C. Bauh.

Alcea (*rosea*) foliis sinuato-angulosis. Lin. 966.

Stokrosen, Pyramidalische Pappeln. Blühen auch gefüllt, in Gärten.

Digitized by Google

5.

Mit bedekten Samen, und zwar

a) mit einer einkämmerigen Samenkapsel.

Primula veris odorata, flore luteo simplici. I. Bauh.
Primula (*veris officinalis*) foliis dentatis rugosis. Lin. 204.
Schlüsselblumen. Blühen im Merz und Aprill auf Wiesen.

Primula syluatica, flore pallido et inodoro. Rupp.
Primula *veris elatior* β. Lin. 204.
Hinter dem Schlosse im grasigten Grunde, auch auf der Wiese am Haynberge.

Primula veris hortensis, perianthio colorato aemulo. Rupp.
Primeln. In Gärten.

Auricula vrsi flore luteo, purpureo et vario Rupp.
Primula (*auricula*) foliis serratis glabris. Lin. 205.
Aurikeln. Blühn im Merz und April in den Gärten mit mannigfaltigen Abänderungen von Farben.

Nummularia maior lutea. C. Bauh.
Lysimachia (*Nummularia*) foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. Lin. 211.
Pfennigkraut, Wiesengold.

Nummularia erecta Riu. Lysimachia lutea maior. C. Bauh.
Lysimachia (*vulgaris*) paniculata, racemis terminalibus. Lin. 209.
Gelber Weiderich; am Mühlgraben.

Lysimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. C. Bauh.

Digitized by Google

Lyſimachia (*punctata*) foliis ſubquaternis, pedunculis verticillatis vnifloris. Lin. 210.

In den Gärten.

Lyſimachia canadenſis, Ialappae foliis, Walth. hort.

Lyſimachia (*ciliata*) petiolis ciliatis, floribus cernuis. Lin. 210.

In Genſeliſchen Garten.

Anagallis lutea nemorum. C. Bauh.

Lyſimachia (*nemorum*) foliis ouatis acutis, floribus ſolitariis, caule procumbente. Lin. 211.

In der Schlucht am Haynberge. Blüht im Juli.

Anagallis phoeniceo flore. C. Bauh.

Anagallis (*aruenſis*) foliis indiuiſis, caule procumbente. Lin. 211.

Gauchheil. Blüht vom May bis im Juli. Man findet es auch mit rother Blüthe bey Schönkleine.

Anagallis paludoſa minima *Vaillant.* ſ. ſpuria ſ. minima aruenſis tetrapetaloides. Rupp.

Centunculus minimus. Lin. 169.

Im Julio bey Mühlsdorf.

Trientalis. Cord. et Riu. Pyrola alſines flore europaea. C. Bauh.

Trientalis (*europaea*) foliis lanceolatis integerrimis. Lin. 488.

Bei Hekewalde im Buſchholze, am Fuße des Hindelberges bey Nonneburg, im Juli und Auguſt.

Cyclamen orbiculato folio interne purpureo. C. Bauh.

Cyclamen (*europaeum*) corolla retroflexa. Lin. 207.

Saubrodt. Im Geimſiſchen Garten.

Millefolium aquaticum ſ. Viola aquatica caule nudo. C. Bauh.

Hotto-

Digitized by Google

Hottonia (*paluſtris*) pedunculo verticillato multifloro. Lin. 208.

Waſſerfenchel. Blüht im Juni und Juli in der Lache nach Dieſchitz.

Gentiana alpina verna maior. C. Bauh.

Gentiana (*verna*) corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis maioribus. Lin. 331.

Entian. Blüht im April und May in den Gärten.

Gentiana alpina latifolia magno flore. C. Bauh.

Gentiana (*acaulis*) corolla quinquefida campanulata, caulem excedente. Lin. 330.

Auf dem Hausberge bey Langenberg im Auguſt.

Gentianella coerulea oris piloſis. C. Bauh.

Gentiana (*ciliata*) corollis quadrifidis, margine ciliatis. Lin. 334.

In Zauſens Graben bey Pforten und auf der Anhöhe bey Köldiz.

Centaureum minus. C. Bauh.

Gentiana (*centaurium*) corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. Linn. 332.

Tauſendgüldenkraut. Man findet es ſowohl mit rother, als auch mit weiſſer Blüthe auf den büſchichten Rändern bey Pubek.

Centaureum minus Valerianae facie Rupp.

Eine Varietät. Auf der Wieſe nach dem kleinen Weſer und bey der Schmelzhütte.

Trifolium fibrinum officinarum. Tabern.

Menyanthes (*trifoliata*) foliis ternatis. Lin. 208.

Sumpfklee, Bitterklee. Blüht im May bey Pforten auf der ſumpfigten Wieſe und bey Sara.

Acacia indica farneſiana. Aldin.

Digitized by Google

Mimosa (*farnesiana*) spinis stipularibus distinctis foliis bipinnatis octo iugis, spicis globosis sessilibus. Lin. 1506.

Indianischer Schlehdorn. Im Gräflichen Garten, im May.

b) Mit einer zweykämmerigen Samenkapsel.

Syringa flore coeruleo maior. Rupp. Lilac. Tournef.

Syringa (*vulgaris*) foliis cordato-ouatis. Lin. 11.

Spanischer Holunder. Blüht im May so wohl mit röthlicher, als auch weisser Blüthe.

Syringa laciniato folio. Rupp.

Syringa (*persica laciniata* β.) foliis lanceolatis. Linn. 11.

Im Geimsischen Garten.

Nicotiana maior latifolia. C. Bauh.

Nicotiana (*Tabacum*) foliis lanceolato-ouatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis. Lin. 258.

Tabak. In den Gärten.

Nicotiana minor. C. Bauh.

Nicotiana (*rustica*) foliis petiolatis ouatis integerrimis, floribus obtusis. Lin. 258.

Türkischer Tobak. Blüht im August.

Nicotiana (*paniculata*) foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus paniculatis obtusis clauatis. Lin. 259.

Im Geimsischen Garten.

Apocynum erectum maius latifolium indicum. Pluck.

Asclepias (*gigantea*) foliis amplexicaulibus oblongo-oualibus. Lin. 312.

Ausländischer Hundskohl. Im Gensel'schen und Geimsischen Garten.

Apocy-

Digitized by Google

Apocynum aethiopicum frutescens, folio salicis, flore ochroleuco. Volckam.

Asclepias (*curassauica*) foliis lanceolatis petiolatis glabris, caule simplici, vmbellis erectis solitariis. Lin. 314.

Blüht im May und Junio ebendaselbst.

Asclepias e Virginia. C. Bauh.

Asclepias (*variegata*) foliis ouatis rugosis nudis, caule simplici, vmbellis subsessilibus, pedicellis tomentosis. Lin. 312.

Im Gräflichen Garten.

Vincetoxicum. Dodon. Asclepias albo flore. C. Bauh.

Asclepias (*Vincetoxicum*) foliis ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbellis proliferis. Lin. 314.

Schwalbenwurzel. Blüht im Juni und Juli am Pfortner Berge und am Felsen bey Weida.

Vincetoxicum flore nigricante. Rupp. Asclepias nigro flore. C. Bauh.

Asclepias (*nigra*) foliis ouatis basi barbatis, caule superne subuolubili. Linn. 315.

In Genselischen Garten.

Periploca. Tournef.

Periploca (*graeca*) floribus interne hirsutis. Lin. 309.

Im Kaufmanns-Garten. Im Juni.

Nerium floribus rubescentibus. C. Bauh.

Nerium (*Oleander*) foliis lineari-lanceolatis ternis. Lin. 305.

Lorber-Rosen. Im Geimischen Garten, im August und September.

Nerium latifolium flore rubro pleno. Rupp.

— floribus albis. C. Bauh.

Varietäten von iener.

Vinc-

Digitized by Google

Vinca Riu. Peruinca. Tournef. Clematis daphnoides maior. C. Bauh.

Vinca (*maior*) caulibus erectis, foliis ouatis, floribus pedunculatis. Lin. 304.

Wintergrün, Todtenviolen. Blühen im Merz und April, am Haynberge.

Vinca flore albo. Rupp.

— — purpureo pleno. Rupp.

— — foliis variegatis.

Varietäten von iener.

Clematis daphnoides minor. C. Bauh.

Vinca (*minor*) caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ouatis, floribus pedunculatis. Lin. 304

Blüht im Auguſt und September im gräflichen Garten.

Cuſcuta maior. C. Bauh.

Cuſcuta (*europaea*) floribus ſeſſilibilibus. Lin. 180.

Flachsſeide, Frauenhaar, Filzkraut. Im Juni an Hecken, Büſchen und Zäunen, an der Elſter, im Mühlgraben, nach der Waſſerkunſt und am Pfortner Berge.

c) Mit einer dreikämmerigen Samenkapſel.

Conuoluulus maior albus. C. Bauh.

Conuoluulus (*Sepium*) foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis tetragonis vnifloris. Lin. 218.

Groſſe Winde, Zaun-Glocke. Blüht im Juni und Juli an Hecken und Zäunen, auch in Gärten, als Unkraut.

Conuoluulus minor aruenſis. C. Bauh.

Conuoluulus (*aruenſis*) foliis ſagittatis, vtrinque acutis, pedunculis vnifloris. Lin. 218.

Winde.

Conuo-

Digitized by Google

Conuolu ulus purpureus folio ſubrotundo. C. Bauh.

Conuoluulus (*purpureus*) foliis cordatis indiuiſis, fructibus cernuis, pedicellis incraſſatis. Lin. 219.

In den Gärten.

Conuoluulus peregrinus caeruleus, folio oblongo. C. Bauh.

Conuoluulus (*tricolor*) foliis lanceolato-ouatis glabris, caule declinato, floribus ſolitariis. Lin. 225.

In den Gärten.

Quamoclit americana, folio hederae, flore coccineo. Commel.

Ipomoea (*coccinea*) foliis cordatis acuminatis, baſi angulatis, pedunculis multifloris. Lin. 228.

In Miedings Garten.

Campanula vulgatior, foliis vrticae, vel maior et aſperior. C. Bauh.

Campanula (*Trachelium*) caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. Lin. 235.

Glockenblume. Blüht im Junio an grasigten Orten, man findet ſie blau, weiß, und auch gefüllt.

Campanula pyramidata altiſſima. Tournef.

Rapunculus hortenſis latiore folio, ſeu pyramidalis. C. Bauh.

Campanula (*pyramidalis*) foliis ouatis glabris ſubſerratis, caule erecto paniculato, ramulis breuibus. Lin. 233.

In den Gärten.

Campanula hortenſis folio et flore oblongo. C. Bauh.

Campa-

Digitized by Google

Campanula (*media*) capſulis quinqueloculariſbus obtectis, caule ſimplici erecto folioſo, floribus erectis. Lin. 236.

In den Gärten.

Campanula pratenſis flore conglomerato. C. Bauh.

Campanula (*glomerata*) caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali. Lin. 235.

Blüht ſowohl mit blauer, als weiſſer Blüthe bey Pforten am Berge, und nach Anſchitz.

Campanula hortenſis, rapunculi radice. C. Bauh.

Campanula (*rapunculoides*) foliis cordato-lanceolatis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis. Lin. 234.

Auf dem Felde.

Campanula perſicae folio. Cluſ. Rapunculus perſicifolius, magno flore. C. Bauh.

Campanula (*decurrens*) foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. Lin. 232.

Auf dem Haynberge und bey Pforten, auch in Gärten gefüllt.

Campanula minor rotundifolia alpina. C. Bauh.

Campanula (*rotundifolia* β.) foliis radicalibus reniformibus caulinis linearibus. Lin. 232.

Auf Wieſen und graſigten Orten.

Rapunculus eſculentus. C. Bauh.

Campanula (*Rapunculus*) foliis vndulatis, radicalibus lanceolato-oualibus, panicula coarctata. Lin. 232.

Rapünzel. Bey Schönkleine, und in den Gärten.

Speculum flore coeruleo aruenſe. Rupp.

Campanula (*ſpeculum veneris*) caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis oblongis ſubcrenatis, calycibus foliis-

solitariis corolla longioribus, capsulis prismaticis. Lin. 238.

In den Gärten mit blauen und weissen Blumen.

Polemonium flore coeruleo et albo. Rupp. Valeriana coerulea. C. Bauh.

Polemonium (*coeruleum*) foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollae tubo longioribus. Lin. 230.

Blüht im Junio in den Gärten.

Iris vulgaris germanica, s. sylvestris. C. Bauh.

Iris (*germanica*) corollis barbatis, caule foliis longiore multifloro, floribus inferioribus pedunculatis. Lin. 55.

Schwerdlilien. Blühn im May auf Mauern und in Gärten.

Iris alba florentina. C. Bauh.

Iris (*florentina α.*) corollis barbatis caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus. Lin. 55.

Iris alba germanica. C. Bauh.

Iris *florentina β.* Linn.

Grosse weisse Schwerdlilien. In den Gärten.

Iris susiana flore maximo et albo nigricante. C. Bauh.

Iris (*Susiana*) corolla barbata, caule foliis longiore vnifloro. Lin. 55.

Im Gräflichen Garten.

Iris pratensis anguſtifolia, folio foetido. C. Bauh.

Iris (*spuria*) corollis imberbibus, germinibus sexangularibus, caule tereti, foliis sublinearibus. Lin. 58.

Bey Arnstadt und Leipzig auf den Wiesen.

Iris graminea. I. Bauh.

Iris

Iris (*graminea*) corollis imberbibus germinibus ſexangularibus, caule ancipiti, foliis linearibus. Linn. 58.

In Geims Garten.

Chamaeris minor flore purpureo. C. Bauh.

Iris (*pumila*) corollis barbatis, caule foliis breuiore vniflоro. Lin. 56.

Ebend.

Acorus adulterinus. C. Bauh.

Iris (*pſeudacorus*) corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus. Linn. 56.

Am Mühlgraben bey Pforten und in Sümpfen. Gelbe Waſſerlilien. Blühn im May.

Iris bulboſa latifolia caule donata. C. Bauh.

Xiphium. Tournef.

Iris (*xiphium*) corollis imberbibus, floribus binis, foliis ſubulato-canaliculatis, caule breuioribus. Lin. 58.

In Geims Garten.

Crocus vernus anguſtifolius floribus coeruleis ſ. violaceis. I. Bauh.

Crocus vernus latifolius flauus. C. Bauh.

— — — albus variegatus. C. Bauh.

Crocus (*ſatiuus vernus*) ſpatha vniualui radicali, corollae tubo longiſſimo. Lin. 50.

Saffran. Blüht im Merz in den Gärten.

Crocus ſatiuus. C. Bauh.

Crocus ſatiuus vernus. Lin. 50.

Im Geimſiſchen Garten. Blüht im Septembe

Narciſſus maior totus luteus, calice praelongo. C. B

Narciſſus (*bicolor*) ſpatha vniflora, nectario cam pan-

Digitized by Google

panulato, margine patulo criſpo aequante petala. Lin. 415.

Gelbe Hornungsblumen, gelber Jacobsſtab. Im Gräflichen und Kaufmanns-Garten.

Narciſſus multiplex totus flauus. C. Bauh.

Eine Varietät.

Narciſſus ſylueſtris pallidus calyce luteo. C. Bauh.

Narciſſus (*pſeudonarciſſus*) ſpatha vniflora, nectario campanulato erecto criſpo, aequante petala ouata. Lin. 414.

In Gärten.

Narciſſus albus circulo purpureo. C. Bauh.

Narciſſus (*poëticus*) ſpatha vniflora, nectario rotato breuiſſimo ſcarioſo crenulato. Lin. 414.

Ebend. Narciſſen.

Narciſſus iuncifolius, oblongo calice, luteus maior. C. Bauh.

Narciſſus (*Ionquilla*) ſpatha multiflora, nectario hemiſphaerico crenato, breuiore petalis, foliis ſemiteretibus. Lin. 411.

Jonquillen.

Lilium luteum Aſphodeli radice. C. Bauh.

Hemerocallis (*flaua*) corollis flauis. Lin. 462.

Lilium rubrum Aſphodeli radice. C. Bauh.

Hemerocallis (*fulua*) corollis fuluis. Lin. 462.

Blühn im May und Junio in den Gärten.

Aloe in oblongum aculeum abienſ. C. Bauh.

Agaue (*americana*) foliis dentato-ſpinoſis, ſcapo ramoſo. Lin. 461.

In den Gärten.

Colchicum commune. C. Bauh.

Digitized by Google

Colchicum (*autumnale*) foliis planis lanceolatis erectis. Linn. 485.

Zeitloſen, Nakthuren, Herbſtblumen. Blühn im September mit röthlichen, gelben und weiſſen Blumen, auf den Wieſen am Haynberge und nach Dieſchitz; die gelben ſind aber ſelten.

Hyacinthus orientalis. C. Bauh.

Hyacinthus (*orientalis*) corollis infundibuliformibus ſemiſexfidis baſi ventricoſis. Lin. 454.

Hyacinthen. Blühn im Merz und Aprill mit verſchiedenen Abänderungen der Farbe, auch gefüllt.

Hyacinthus botryoides. Cluſ. H. racemoſus coeruleus minor iuncifolius. C. Bauh.

Hyacinthus (*racemoſus*) corollis ouatis, ſummis ſeſſilibus, foliis laxis. Lin. 455.

Trauben-Hyacinthen.

Hyacinthus racemoſus moſchatus. C. Bauh. Muſcari obſoletiore flore. Cluſ.

Hyacinthus (*muſcari*) corollis ouatis omnibus aequalibus. Lin. 454.

Muskat-Hyacinthen. Mit den vorhergehenden in den Gärten.

d) Mit einer vierkämmerigen Samenkapſel.

Lyſimachia lutea corniculata. C. Bauh. Onobrys Tournef.

Oenothera (*biennis*) foliis ouato-lanceolato planis, caule muricato-ſubuilloſo. Lin. 492.

Weiderich, wächſt am Mühlgraben an der Herrenwieſe. Blüht im Junio und Julio.

Lyſimachia chamaenerion dicta, anguſtifolia. C. Bauh. Epilo-

Digitized by Google

Epilobium (*anguſtifolium*) foliis ſparſis lineari lanceolatis, floribus inaequalibus. Lin. 493.

Waldweiderich, Weiderichröszgen. An der Elſter bey Pforten, und nach Dientz zu; blüht im Juni.

Lyſimachia Chamaenerion diſta latifolia. C. Bauh.

Epilobium anguſtifolium β. Lin. 494.

Am Haynberge und hinter Pappeln.

Lyſimachia ſiliquoſa glabra maior. C. Bauh.

Epilobium (*montanum*) foliis oppoſitis ouatis dentatis. Lin. 494.

Im Mühlgraben und an der Elſter.

Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore. C. Bauh.

Epilobium (*hirſutum*) foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis decurrenti-amplexicaulibus. Lin. 494.

Blüht im Juli, Juni und Auguſt, in Waſſergräben.

Stramonium ſeu Datura. Rupp. Solanum foetidum pomo ſpinoſo oblongo, flore albo. C. Bauh.

Datura (*Stramonium*) pericarpiis ſpinoſis erectis ouatis, foliis ouatis glabris. Lin. 255.

Tollkraut; Blüht im Juli bey Pforten an den Zäunen.

Stramonium maius purpureum flore maiore. Rupp.

Datura (*Tatula*) pericarpiis ſpinoſis erectis ouatis, foliis cordatis glabris dentatis. Lin. 259.

In den Gärten.

Erica ſpuria ſ. Tetralix. Rupp.

Erica (*Tetralix*) antheris bicornibus incluſis, corollis ſubgloboſis confertis folio longioribus, foliis quaternis ciliatis patentibus. Lin. 502.

Auf der Lüneburger Heide, auch in dieſen Gegenden.

Digitized by Google

e) Mit einer fünfkämmerigen Samenkapsel.

Ketmia Syrorum s. Alcea arboreſcens ſyriaca. C. Bauh.

Hibiſcus (*ſyriacus*) foliis cuneiformi-ouatis, ſuperne inciſo dentatis, caule arboreo. Lin. 978.

Blüht im Juli in den Gärten.

Ketmia aegyptiaca ſemine moſchato. Tournef. Alcea aegyptiaca villoſa. C. Bauh.

Hibiſcus (*Abelmoſchus*) foliis ſubpeltato-cordatis ſeptemangularibus ſerratis hiſpidis. Lin. 980.

Im Auguſt im Gräflichen Garten.

Ketmia veſicaria vulgaris. Tournef. Alcea veſicaria. C. Bauh.

Hibiſcus (*Trionum*) foliis tripartitis inciſis, calycibus inflatis. Lin. 981.

Wetterrosen, Stundenblume. In den Gärten.

Cotyledon maior. C. Bauh. Cotyledon vmbilicus veneris. Cluſ.

Cotyledon (*vmbilicus veneris tuberoſa*) foliis cucullato-peltatis ſerrato dentatis alternis, caule ramoſo, floribus erectis. Lin. 615.

Cotyledon africanum fruteſcens incanum, orbiculatis foliis. Moris.

Cotyledon (*orbiculata*) foliis ſubrotundis planis integerrimis. Lin. 614.

Im Gräflichen und Geinſiſchen Garten.

f) Mit einer vielkämmerigen Samenkapsel.

Abutilon Dodon. Althaea Theophraſti flore luteo. C. Bauh.

Sida (*Abutilon*) foliis ſubrotundo-cordatis indiuiſis, pedunculis folio breuioribus, capſulis multilocularibus, corniculis bifidis. Lin. 963.

Alceae

Alceae affinis indica, Abutilon dicta, flore paruo, foliis mollibus profunde venosis, siliculis lanuginosis. Pluck.

Sida (*asiatica*) foliis cordatis indiuisis, stipulis reflexis, pedunculis longioribus, capsulis multilocularibus hirsutis, calyce breuioribus. Lin. 964.

Blüht mit jenem im August in den Gärten.

Abutilon americanum foliis Ricini. Rupp. Sida foliis palmatis, laciniis lanciolato-attenuatis. Hort. Cliff.

Napaea (*hermaphrodita*) pedunculis nudis laeuibus, foliis glabris, floribus hermaphroditis. Lin. 965.

Blüht im August und September, in den Gärten.

6.

Mit einer weichen Frucht oder Beere.

a) Mit einer einkernigen Frucht.

Laureola folio deciduo, Mezereum germanicum. I. Bauh.

Daphne (*Mezereum*) floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. Lin. 509.

Kellerhals, Seidelbast, Bergpfeffer. Blüht im Februar und Merz, auf dem Haynberge.

Laureola folio deciduo, flore albo, officinis Laureola femina. C. Bauh.

Eine Varietät.

Olea satiua. C. Bauh.

Olea (*europaea*) foliis lanceolatis. Lin. 81.

Oliven-Baum. Im Geimsischen Garten.

Olea syluestris folio molli incano. C. Bauh.

Elaeagnus (*angustifolia*) foliis lanceolatis. Lin. 176.

Digitized by Google

Wilder oder Böhmischer Oehl-Baum. In Münchs Garten.

Viburnum vulgo. C. Bauh. Lantana. Dodon.

Viburnum (*Lantana*) foliis cordatis ferratis venosis subtus tomentosis. Lin. 384.

Schlingbaum, Rothschlinge. Blüht im Junio in Geims Garten, und bey Groß und Schönkleine.

Laurus Tinus seu sylvestris prior. I. Bauh.

Viburnum (*Tinus*) foliis integerrimis ouatis, ramificationibus venarum subtus villoso-glandulosis, Lin. 383.

Laurustinus, Bastardlorber. In den Gärten.

Opulus Ruellii. Tournef. Sambucus aquatica flore simplici. C. Bauh.

Viburnum (*Opulus*) foliis lobatis, petiolis glandulosis. Lin. 384.

Hirschholder, Wasserflieder, Schoalbeere. Blüht im May, bey dem Erdfalle am Hayuberge.

Opulus flore globoso. Tournef. Sambucus aquatica flore globoso pleno. C. Bauh.

Viburnum Opulus roseum β. Lin. 384.

Schneebälle, Rosenholder. Sind unfruchtbar und bringen keinen Saamen.

Viscum baccis albis. C. Bauh.

Viscum (*album*) foliis lanceolatis obtusis, caule dichotomo, spicis axillaribus. Lin. 1451.

Mistel. Wächst auf Eichen, Birken, Birn- und Aepfelbäumen. Blüht im Merz.

Sycioides americana, fructu echinato, foliis angustis. Tournef.

Sycios

Sycios (*angulata* β.) foliis angulatis. Lin. 1439.
Hunds-Gurken. Blühn in den Gärten.

b) Mit einer zweykernigen Frucht.

Iaſminum vulgatius flore albo. C. Bauh.
Iasminum (*officinale*) foliis oppoſitis pinnatis. Lin. 9.
Jasmin. Blüht im May und Juni in den Gärten.

Iaſminum hiſpanicum flore maiore externe rubente. I. Bauh. Iaſminum humilius magno flore. C. Bauh.
Iaſminum (*grandiflorum*) foliis oppoſitis pinnatis: foliolis extimis confluentibus. Lin. 9.

Iaſminum humile luteum. C. Bauh.
Iaſminum (*humile*) foliis alternis ternatis pinnatisque, ramis angulatis. Lin. 9.

Iaſminum indicum flauum odoratiſſimum Ferrar.
Iaſminum (*odoratiſſimum*) foliis alternis ternatis pinnatisque ramis teretibus. Lin. 10.
Mit jenen in den Gärten.

Rubia tinctorum ſatiua. C. Bauh.
Rubia (*tinctorum* β.) foliis ſubſenis. Lin. 158.
Färberröthe. Blüht im Junio.

Frangula. Dodon. Alnus nigra baccifera. C. Bauh.
Rhamnus (*Frangula*) inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. Lin. 280.
Faulbaum, Pinnholz, Zapfenholz, Pulverholz, Ahlkirſche, Grindholz. Auf der Pfortner Wieſe bey dem Buchwerke; blüht im May.

c) Mit einer dreikernigen Frucht.

Sambucus fructu in vmbella nigro. C. Bauh.
Sambucus (*nigra*) cymis quinquepartitis, caule arboreo. Lin. 385.

Digitized by Google

Holunder, Fliederbaum. Blüht im Junio.

Sambucus fructu in vmbella viridi. C. Bauh.

Sambucus nigra β. Lin. 386.

Bey Schippach und Culmsch.

Sambucus laciniato folio. C. Bauh.

Sambucus nigra laciniata. Lin. 386.

Sambucus racemosa rubra. C. Bauh.

Sambucus (*racemosa*) racemis compositis ouatis, caule arboreo. Lin. 386.

Waldholunder, rother Bergholunder. Im Martins-Grunde und Pfortner Buschholze. Blüht im Aprill und May.

Sambucus humilis s. Ebulus. C. Bauh.

Sambucus (*Ebulus*) cymis trifidis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. Lin. 385.

Attich, Niederholunder. In der Gegend nach Geitz.

d) Mit einer vierfernigen Frucht.

Ilex aculeata baccifera, folio sinuato. C. Bauh. Aquifolium. Tournef.

Ilex (*Aquifolium*) foliis ouatis acutis spinosis. Lin. 181.

Stecheiche, Stechpalmen. In Geims Garten, blüht im May und Juni.

Liguſtrum germanicum. C. Bauh.

Liguſtrum (*vulgare*) Lin. 10.

Beinholz, Kehlholz, Rheinweide, Mundholz. An den Zäunen, blüht im Junio.

e) Mit einer vielfernigen Frucht.

Momordica vulgaris. Tournef. Balsamina rotundifolia repens, s. mas. C. Bauh.

Mo-

Digitized by Google

Momortica (*Balſamina*) pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis. Lin. 1433.

Balſamäpfel. Blühn im Auguſt im Herrſchaftl. und Geimſiſchen Garten.

Elaterium Riu. et officinarum. Cucumis ſylueſtris, aſininus dictus. C. Bauh.

Momordica (*Elaterium*) pomis hiſpidis, cirrhis nullis. Lin. 1434.

Eſelsgurken. Blühn im Auguſt in den Gärten.

Cucumis ſatiuus vulgaris. C. Bauh.

Cucumis (*ſatiuus*) foliorum angulis rectis, pomis oblongis ſcabris. Lin. 1437.

Gurken, Kukumern.

Colocynthis fructu rotundo maior. C. Bauh.

Cucumis (*Colocynthis*) foliis multifidis, pomis globoſis glabris. Lin. 1435.

Coloquinten.

Melo vulgaris. C. Bauh.

Cucumis (*Melo*) foliorum angulis rotundatis, pomis toruloſis. Lin. 1436.

Melonen.

Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. C. Bauh.

Cucurbita (*lagenaria*) foliis cordatis denticulatis tomentoſis, baſi ſubtus biglanduloſis, pomis lignoſis. Lin. 1434.

Flaſchenkürbis.

Cucurbita maior rotunda, flore luteo, folio aſpero. C. Bauh.

Cucurbita (*Pepo*) foliis lobatis, pomis laeuibus Lin. 1435.

Kürbis.

Pepo oblongus. C. Bauh.

Cucurbita Pepo β. Lin.

Digitized by Google

Melopepo clypeiformis. C. Bauh.
Cucurbita (*Melopepo*) foliis lobatis, caule erecto, pomis depresso-nodosis. Lin. 1435.
Von diesen giebt es noch viele Abwechselungen in Ansehung der Frucht.

Anguria Citrullus dicta. C. Bauh.
Cucurbita (*Citrullus*) foliis multipartitis. Lin. 1435.
Citrullen.

Bryonia alba baccis nigris. C. Bauh.
Bryonia (*alba*) foliis palmatis vtrinque calloso-scabris. Lin. 1438.
Zaunrübe, Gichtrübe. Blüht im May und Juni, an den Zäunen und in den Gärten.

Solanum officinarum acinis nigricantibus. C. Bauh.
Solanum (*nigrum vulgatum*) caule inermi herbaceo, foliis ouatis dentato-angulatis, vmbellis nutantibus. Lin. 266.
Nachtschatten, Saukraut. Blüth im Juni und Juli, bey der großen Brücke und an ungebauten Oertern und Zäunen.

Solanum annuum hirsutius, baccis luteis. Dillen.
Solanum nigrum, villosum γ. Lin. 266.
Bey Arnstadt und Erfurth.

Solanum scandens s. Dulcamara. C. Bauh.
Solanum (*Dulcamara*) caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus haſtatis, racemis cymosis. Lin. 264.
Steigender Nachtschatten. An der Elster und am Mühlgraben.

Solanum fruticosum bacciferum. C. Bauh. Pseudo-capsicum Dodon.

Soli-

Digitized by Google

Solannm (*Pseudocapsicum*) caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis repandis, vmbellis sessilibus. Lin. 263.

Buschichter Nachtschatten, Korallen-Kirschen, Bouquet-Kirschen. In den Gärten.

Solanum tuberosum esculentum. C. Bauh.

Solanum (*tuberosum*) caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis sub diuisis. Lin. 265.

Tartoffeln, Erdäpfel. Blühn im Juli und Auguſt.

Solanum spinosum indicum flore Borraginis. Hort. reg. Par.

Solanum (*tomentosum*) caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis, foliis cordatis inermibus subrepandis tenellis purpureo-puluerulentis. Lin. 269

Blüht im Auguſt in den Gärten.

Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli. C. Bauh. Lycopersicum maius flore multifido. Rupp.

Solanum (*Lycopersicum*) caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis simplicibus. Lin. 265.

Liebesäpfel.

Lycopersicum fructu rubro non striato. Tournef. Solanum racemosum ceraforum forma. C. Bauh. Solanum Lycopersicum β.

Capsicum siliquis longis propendentibus. Tournef. Piper indicum vulgatissimum. C. Bauh.

Capsicum (*annuum*) caule herbaceo pedunculis solitariis. Lin. 270.

Spanis

Spaniſcher Pfeffer. In den Gärten, blüht im Auguſt.

Alkekengi. Tournef. Solanum veſicarium. C. Bauh.
Phyſalis (*Alkekengi*) foliis geminis integris acutis, caule herbaceo inferne ſubramoſo. Lin. 262.
Judenkirſchen. Blüht im Junio bey Langenberg.

Alkekengi indicum maius. Tournef. Solanum veſicarium indicum. C. Bauh.
Phyſalis (*angulata*) ramoſiſſima ramis angulatis glabris, foliis ouato-dentatis. Lin. 262.
Blüht in Juni und Juli in den Gärten.

Lilium conuallium album, latifolium. C. Bauh.
Conuallaria (*maialis*) ſcapo nudo. Lin. 451.
Mayblümgen. Man findet ſie auch mit röthlicher und gefüllter Blüthe auf dem Haynberge und bey Großſtein.

Polygonatum latifolium maximum. C. Bauh. Polygonatum vulgo ſigillum Salomonis. I. Bauh.
Conuallaria (*multiflora*) foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. Lin. 452.
Weißwurz. Auf dem Haynberge.

Polygonatum floribus ex ſingularibus pedicellis. C. Bauh.
Conuallaria (*Polygonatum*) foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti; pedunculis axillaribus, ſubunifloris. Lin. 451.
Blüht auch mit gefüllter Blume in den Gär[illegible]

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum. C. B[illegible]
Conuallaria (*verticillata*) foliis verticillatis. Lin. 4[illegible]
Blüht mit jenen im May.

Va[illegible]

Digitized by Google

Vaccinium Riu. Vitis idaea, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. C. Bauh.

Vaccinium (*Myrtillus*) pedunculis vnifloris, foliis ferratis ouatis deciduis, caule angulato. Lin. 498

Heidelbeere. Im Stadtholze und Gangeldorfischen Walde.

Vaccinium foliis oblongis crenatis, fructu albo. Rupp.

Weisse Heidelbeeren. Eine Varietät.

Vaccinium altissimum f. Vitis idaea foliis subrotundis exalbidis. Rupp. C. Bauh.

Vaccinium (*vliginosum*) pedunculis vnifloris, foliis integerrimis oualibus, basi ciliatis. Lin. 499.

Trunkelbeere. Bey Schönkleine.

Vaccinium foliis buxi, semperuirens, baccis rubris Rupp.

Vitis idaea foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris. C. Bauh.

Vaccinium (*Vitis idaea*) racemis terminalibus nutantibus, foliis obouatis reuolutis integerrimis, subtus punctatis. Lin. 500.

Mehlbeere, Preuselbeere.

Moschatellina. Tournef.

Adoxa Moschatellina. Lin. 527.

Bey Weida an der Fahrstraße zwischen den Gärten und Zäunen nach der PapierMühle zu. Blüht im Merz und Aprill.

Grossularia simplici acino vel spinosa sylueſtris. C. Bauh.

Ribes (*Vua crispa*) racemis aculeatis, baccis glabris petioli bractea monophylla. Lin. 292.

Wilde Stachelbeere, Klosterbeere. Blühn im Merz

Merz und Aprill. Die Beere ſind ſowohl ihrer Farbe, als Größe nach, verſchieden. Einige Spielarten haben haarichte Beere, andere glatte.

Groſſularia fructu maximo hiſpido margaritarum fere colore. Rai.

Ribes (*Groſſularia*) ramis aculeatis, petiolorum ciliis piloſis, baccis hirſutis. Lin. 291.

Gartenſtachelbeere.

Groſſularia ſpinoſa ſatiua altera foliis latioribus. C. Bauh.

Ribes (*reclinatum*) ramis ſubaculeatis reclinatis pedunculi bractea triphylla. Lin. 291.

Rothe Stachelbeere. In den Gärten.

Groſſularia multiplici acino, ſiue non ſpinoſa hortenſis ſ. Ribes officinarum. C. Bauh.

Ribes (*rubrum*) inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis. Lin. 290.

Rothe Johannisbeere.

Groſſularia hortenſis fructu margaritis ſimili. C. Bauh.

Ribes rubrum. Lin. *β*.

Weiſſe Johannisbeere.

Groſſularia vulgaris fructu dulci. C. Bauh.

Ribes (*alpinum*) inerme, racemis erectis, bracteis, flore longioribus. Lin. 291.

Süſſe wilde Johannisbeere. Bey Arnſtadt nach dem ſchönen Brunnen.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro. C. Bauh.

Ribes (*nigrum*) inerme, racemis piloſis, foliis oblongis. Lin. 291.

Schwarze Johannisbeere. Bey Rübitz am [illegible]

Digitized by Google

an der Mühle, und bey Köſtritz. Blühn im Aprill.

Melocactus Indiae occidentalis. C. Bauh.

Cactus (*Melocactus*) ſubrotundus quatuordecim angularis. Lin. 666.

Im Geimſiſchen Garten.

Zweite Klaſſe.

Gewächſe mit einer gleichförmigen zweiblätterigen Blume.

Stellaria aquatica. C. Bauh.

Callitriche (*verna*) foliis ſuperioribus oualibus, floribus androgynis. Lin. 6.

Blüht im Juli, im Graben am Haynberge nach Dientz, und bey Schmiedels Teichen.

Stellaria minor foliis ſubrotundis coniugatis. Rupp.

Callitriche verna β. Lin. 6.

Bey Schippach auf der Wieſe.

Stellaria foliis linearibus, apice reſecto. v. Haller.

Callitriche (*autumnalis*) foliis omnibus linearibus, apice bifidis, floribus hermaphroditis. Lin. 6.

Circaea minima F. Column.

Circaea (*alpina*) caule adſcendente, racemo vnico. Lin. 12.

Hexenkraut. In der Schlucht nach Fonſee. Blüht im Juni und Juli.

Dritte

Digitized by Google

Dritte Klasse.

Gewächse mit einer gleichförmigen dreiblätterigen Blume.

I.

Mit einem einzelnen unbedekten Samen.

Rhaponticum folio lapathi maioris glabro. C. Bauh.
Rheum (*rhaponticum*) foliis glabris, petiolis subsulcatis. Lin. 531.
In den Gärten.

Lapathum folio acuto crispo. C. Bauh.
Rumex (*crispus*) floribus hermaphroditis, valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. Lin. 476.
Grindwurzel. An der Elster.

Lapathum folio acuto rubente. C. Bauh.
Rumex (*Sanguineus*) floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis, vnica granifera, foliis cordato-lanceolatis. Lin. 476.
Im Freißlebischen Garten.

Lapathum aquaticum folio cubitali. C. Bauh.
Rumex (*aquaticus*) floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis. Lin. 479.
An der Elster bey Koschwitz und Silbitz.

Lapathum acutum s. Oxylapathum. C. Bauh.
Rumex (*acutus*) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis acuminatis. Lin. 478.

Auf

Digitized by Google

Auf Aeckern und Wieſen.

Lapathum hortenſe rotundifolium ſ. montanum. C. Bauh. Lapathum maius ſ. Rhabarbarum chonachorum. I. Bauh.

Rumex (*alpinus*) floribus hermaphroditis ſterilibus femineisque, valuulis integerrimis nudis, foliis cordatis obtuſis rugoſis. Lin. 480.

In den Gärten.

Lapathum folio acuto, flore aureo. C. Bauh. Lapathum anthoxanthon. I. Bauh.

Rumex (*maritimus*) floribus hermaphroditis, valuulis dentatis graniferis, foliis linearibus. Lin. 478.

An der Elſter, auf ſandigten und grieſigten Orten.

Lapathum folio minus acuto. C. Bauh.

Rumex (*obtuſifolius*) floribus hermaphroditis, valuulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis. Lin. 478.

In den Gärten.

Acetoſa pratenſis. C. Bauh.

Rumex (*Acetoſa*) floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis. Lin. 481.

Sauerampfer. Blüht im Junio auf Wieſen.

Acetoſa foliis criſpis. C. Bauh.

Rumex acetoſa. γ. Lin.

Acetoſa montana maxima. C. Bauh.

Rumex acetoſa. δ.

Acetoſa aruenſis lanceolata. C. Bauh.

Rumex (*Acetoſella*) floribus dioicis, foliis lanceolato-haſtatis. Lin. 481.

Acetoſa aruenſis minima non lanceolata. C. Bauh.

Rumex Acetoſella γ. Lin. 482.

Digitized by Google

An Rändern und in den Holzschlägen nach Wünschen und Bernsdorff.

Acetosa rotundifolia hortensis. C. Bauh.

Rumex (*Scutatus*) floribus hermaphroditis, foliis cordato-hastatis. Lin. 480.

Im Geimsischen Garten.

2.

Mit drey unbedekten Saamen.

Triglochin Riu. Gramen iunceum spicatum seu Triglochin C. Bauh.

Triglochin (*palustre*) capsulis trilocularibus sublinearibus. Lin. 482.

Auf der Wiese vor dem Klozthore, bey der Schmelzhütte. Blüht im Junio.

3.

Mit vielen unbedekten Saamen.

Plantago aquatica latifolia. C. Bauh. Alisma Riu.

Alisma (*Plantago aquatica*) foliis ouatis acutis, fructibus obtuse trigonis. Lin. 486.

Wasser-Wegerich, Frosch-Löffelkraut.

Plantago aquatica humilis angustifolia. C. Bauh.

Alisma (*Ranunculoides*) foliis lineari-lanceolatis, fructibus globoso-squarrosis. Lin. 486.

Blüht mit jenen im Junio, in der Lache am Hayneberge nach Dieschitz, auch an der Elbe bey Laugen.

Sagitta aquatica maior. C. Bauh.

Sagittaria (*sagittifolia* γ.) foliis sagittatis acutis. Lin. 1410.

In

In der Elster oder Lache bey Dieschiz. Blüht im Junio und Julio.

Sagitta aquatica minor latifolia. C. Bauh.

Sagittaria *sagittifolia* α. Linn. 1410.

Sagitta aquatica minor angustifolia. C. Bauh.

Sagittaria *sagittifolia* β. Linn. 1410.

Bey Grotig und Oberpölniz.

4.

Mit bedekten Saamen.

a) Mit einer dreykämmerigen Saamen-Kapsel.

Tradescantia, siue Ephemerum virginianum. Rupp.

Tradescantia (*virginiana*) erecta laeuis, floribus congestis. Linn. 411.

Blüht im May und Junio, im Geimsischen Garten.

Morsus ranae foliis Asari. Rupp. Nymphaea alba, minima. C. Bauh.

Hydrocharis *morsus ranae* Lin. 1466.

In den Teichen bey Oberpölniz. Blüht im Junio.

b) Mit einer sechskämmerigen Kapsel.

Asarum Dioscoridis et officinarum. I. Bauh.

Asarum (*europaeum*) foliis reniformibus obtusis binis. Linn. 633.

Haselwurz. Blüht im April bey Lippersdorf.

Digitized by Google

Vierte Klasse.

Gewächse mit einer regulären vierblätterigen Blume.

I.

Mit einem einzelnen unbedekten Saamen.

Tribulus aquaticus. C. Bauh.
Trapa *natans*. Linn. 175.
Stachelnüsse, Wassernüsse. Bey Altenburg in den Teichen. Blüht im Junio.

Isatis satiua vel latifolia. C. Bauh. Glastum siue Isatis. Rupp.
Isatis (*tinctoria* β.) foliis radicalibus crenatis caulinis sagittatis, siliculis oblongis. Linn. Sp. 936.
Weid. Blüht im Junio. Es wird häufig bey Erfurt und Langensalz gebaut.

Isatis sylueſtris vel anguſtifolia. C. Bauh.
Isatis *tinctoria* α. Linn. ib.
Eine Varietät.

Sanguisorba maior pratensis. Rupp.
Pimpinella sanguisorba maior. C. Bauh.
Sanguisorba (*officinalis*) spicis ouatis. Linn. Sp. 169.
Biebernelle; Blutkraut. Bey Nepteniz und Bruckersdorf auf dasigen Wiesen.

Sanguisorba Canadensis, flore albo, spicato. Rupp.
Pimpinella sanguisorba canadensis maior, spica longiore alba. Morison.

Sangui-

Digitized by Google

Sanguiſorba (*Canadenſis*) ſpicis longiſſimis. Linn. Sp. 169.

Blüht im Julio; Im Geimſiſchen Garten.

Sanguiſorba minor, montana, laeuis, hirſuta. Rupp.

Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta. C. Bauh.

Poterium (*Sanguiſorba*) inerme, caulibus ſubangulosis. Linn. Sp. 1411.

Kleine Pimpinelle. An dem Pfortner Berge, und Steinbruche am Haynberge.

Alchymilla vulgaris. C. Bauh.

Alchemilla (*vulgaris* β.) foliis lobatis. Linn. 179.

Löwenfuß, Marienmantel. Blüht im May, auf hieſigen Wieſen, und in dem Grunde hinter dem Schloſſe.

Alchymilla montana minima. F. Column.

Aphanes aruenſis. Linn. 179.

Blüht im May und Junio.

2.

Mit vier unbekleideten Saamen.

Potamogeton rotundifolium. C. Bauh.

Potamogeton (*natans*) foliis oblongo-ouatis petiolatis natantibus. Linn. 182.

Samkraut. Im Rathsteiche und beim Steinbruche in Schreibers Teiche. Blüht im May.

Potamogeton capillaceum capitulis ad alas trifidis. C. Bauh.

Potamogeton (*puſillum*) foliis linearibus oppoſitis, alternisque diſtinctis; baſi patentibus, caule tereti. Linn. 184.

In Waſſergräben und Teichen.

Potamogeton gramineum ramoſum. C. Bauh.

Digitized by Google

Potamogeton (*pectinatum*) foliis ſetaceis parallelis approximatis diſtichis. Lin. 183.

Bey Bazdorf in Lechen.

Potamogeton foliis criſpis, ſiue lactuca ranarum. C. Bauh.

Potamogeton (*criſpum*) foliis lanceolatis alternis vndulatis ſerratis. Linn. 183.

Im Mühlgraben der Glozmühle.

Potamogeton foliis anguſtis ſplendentibus. C. Bauh. Fontinalis lucens maior. I. Bauh.

Potamogeton (*lucens*) foliis lanceolatis planis in petiolos deſinentibus. Linn. 183.

In den Teichen bey Eiſenberg.

Tormentilla ſylueſtris. C. Bauh.

Tormentilla (*erecta*) caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus. Linn. 716.

Tormentill, oder Terpenthin-Wurzel.

Tormentilla radice repente. Tournefort.

Tormentilla (*reptans*) caule repente, foliolis petiolatis. Linn. 716.

Im Rathsholze. Blüht im Auguſt.

3.

Mit vielen unbedekten Saamen.

Clematis ſiue flammula ſcandens, tenuifolia alba. I. Bauh. Clematis ſeu Flammula repens. C. Bauh.

Clematis (*Flammula*) foliis inferioribus pinnatis ſcandentibus, ſummis ſimplicibus integerrimis lanceolatis. Linn. 766.

Reben, Bremkraut, Reebinden. Blüht im Junio und Julio, am Pfortner und Hausberge.

Cle-

Digitized by Google

Clematis siue Flammula surrecta alba, Flammula Iouis quibusdam, I. Bauh. Flammula recta. C. Bauh.

Clematis (*recta*) foliis pinnatis, foliolis ouato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetaliſque. Linn. 767.

Im Geimſiſchen und andern Gärten.

Clematis ſylueſtris latifolia. C. Bauh.

Clematis (*Vitalba* γ.) foliis pinnatis, foliolis cordatis ſcandentibus. Linn. 766.

In den Gärten.

Clematis pannonica erecta, flore coeruleo. I. Bauh. Clematis coerulea erecta. C. Bauh.

Clematis (*integrifolia*) foliis ſimplicibus ſeſſilibus ouato-lanceolatis, floribus cernuis. Linn. 767.

Im Genſelſchen und Geimſiſchen Garten.

Clematis coerulea vel purpurea repens. C. Bauh.

Clematis (*Viticella*) foliis compoſitis decompoſitisque, foliolis ouatis integerrimis. Linn. 765.

In Kutſchenbachs und Geims Garten.

Thalictrum pratenſe anguſtiſſimo folio. C. Bauh.

Thalictrum (*anguſtifolium*) foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. Linn. 769.

Wieſenraute. Blüht im Junio.

Thalictrum montanum. Rupp. Thalictrum minus. C. Bauh.

Thalictrum (*minus*) foliis ſexpartitis, floribus cernuis. Linn. 799.

Bergraute.

Thalictrum maius, florum ſtaminibus purpuraſcentibus. C. Bauh. Thalictrum alpinum, Aquilegiae

Digitized by Google

foliis, florum staminibus purpurascentibus. Tournef.

Thalictrum (*Aquilegifolium*) fructibus pendulis triangularibus rectis, caule tereti. Linn. 770.

Man findet es auch mit weisser Blume, und weissen Staubfäden, bey Päppeln auf Schmiedels Wiese. Blühet mit den vorhergehenden im August.

4.

Mit bedekten Saamen.

a) Mit einer einkämmerigen Kapsel.

Papauer hortense, semine albo. C. Bauh.

Papauer (*somniferum*) calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. Linn. 726.

Mohnen.

Papauer hortense semine nigro. C. Bauh.

Papauer *somniferum* β. Lin. 726.

Papauer flore pleno album. C. Bauh.

Papauer *somniferum* ε. Linn. 727.

In den Gärten, mit verschiedenen Farben.

Papauer erraticum maius. C. Bauh.

Papauer (*Rhoeas*) capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis, Linn. 726.

Wilder Mohn, Klatschrosen.

Papauer erraticum flore pleno. C. Bauh.

Papauer *Rhoeas* β. Linn. ib.

In den Gärten. Mit unzähligen Abänderungen von Farben.

Papauer erraticum minus. C. Bauh.

Papauer Rhoeas γ. Linn. ib.

Blüht mit den vorhergehenden im Junio und Julio.

Glau-

Digitized by Google

Glaucium flore luteo. Tournef. Papauer corniculatum luteum. C. Bauh. P.

Chelidonium (*Glaucium*) pedunculis vnifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. Linn. 724.

Gehörnter Mohnsaamen.

Glaucium hirsutum flore phoeniceo. Tournefort. Papauer corniculatum, phoeniceum, hirsutum. C. Bauh.

Chelidonium (*corniculatum*) pedunculis vnifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule hispido. Linn. 724.

In Steidels und Geims Garten. Blühet mit vorhergehenden im Junio und Julio.

Chelidonium maius vulgare. C. Bauh.

Chelidonium (*maius*) pedunculis vmbellatis. Linn. 723.

Schellkraut, Goldwurz. Blüht im May an den Zäunen.

Rapistrum flore albo, siliqua articulata. C. Bauh.

Raphanistrum segetum, flore luteo vel pallido. Tournefort.

Raphanus (*Raphanistrum*) siliquis teretibus articulatis laeuibus vnilocularibus. Linn. 935.

Hederich. Blüht im Junio, Julio und Auguſt auf Feldern.

Raphanus maior, orbicularis seu rotundus. C. Bauh.

Raphanus (*sativus*) siliquis teretibus torosis bilocularibus. Linn. 935.

Rettich. Blüht im Julio.

Raphanus minor oblongus. C. Bauh.

Raphanus (*sativus*) Lin. 935.

Digitized by Google

Rediesgen. Eine Varietät. Man findet sie in den Gärten von verschiedener Farbe.

Chrysosplenium foliis pedunculis oblongis insidentibus. Tournef.

Chrysosplenium (*alternifolium*) foliis alternis. Lin. 569.

Am Haynberge an feuchten und schattigten Gründe, bey dem Lusthause. Blüht im April.

b) Mit einer zweykämmerigen Saamen-Kapsel, und zwar

a) Mit einer Schote.

Brassica capitata alba. C. Bauh.

Brassica (*Oleracea capitata*) radice caulescente tereti carnosa. Linn. 932.

Kohl, Kohlkraut, Hauptkraut, Weißkraut.

Brassica capitata rubra. C. Bauh.

Brassica *oleracea rubra* Linn. 932.

Brassica alba, crispa. C. Bauh.

Brassica *oleracea sabauda* Linn. 932.

Wirsing, Herzkohl.

Brassica gongylodes. C. Bauh.

Brassica *oleracea gongylodes* Linn. 932.

Kohlrabi.

Brassica radice Napiformi Tournef. Napo-Brassica. C. Bauh.

Brassica *Oleracea Napobrassica*. Linn. 932.

Kohlrüben.

Brassica fimbriata. C. Bauh.

Brassica *Oleracea Sabellica*. Linn. 932.

Kochkohl, Braunkohl.

Brassica cauliflora. C. Bauh.

Brassica

Braſſica *oleracea botrytis* Linn. 932.
Blumenkohl. Es giebt verſchiedene Spielarten davon.

Braſſica campeſtris, perfoliata, flore albo. C. Bauh.
Braſſica (*orientalis*) foliis cordatis amplexicaulibus glabris; radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. Lin. 931.
Wilder Kohl. Blüht mit den vorhergehenden im May und Junio.

Braſſica aruenſis. C. Bauh.
Braſſica (*campeſtris*) radice cauleque tenui, foliis caulinis vniformibus cordatis ſeſſilibus. Lin. 931.
Schnittkohl.

Napus ſylueſtris. C. Bauh.
Braſſica (*Napus*) radice cauleſcente fuſiformi. Lin. 931.
Rübſen.

Rapa ſatiua rotunda. C. Bauh.
— — oblonga. ſ. femina —
Braſſica (*Rapa*) radice cauleſcente orbiculari depreſſa carnoſa. Lin. 931.
Weiſſe Rüben.

Keiri incanum maius. ſ. Leucoium, incano folio hortenſe. C. Bauh.
Cheiranthus (*incanus*) foliis lanceolatis integerrimis obtuſis incanis, ſiliquis apice truncatis compreſſis, caule ſuffruticoſo. Linn. Sp. 924.
Levcojen.

Keiri incanum minus. Rupp. Leucoium incanum minus. C. Bauh.
Cheiranthus (*annuus*) foliis lanceolatis ſubdentatis

Digitized by Google

tis obtusis incanis, siliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. Linn. 925.

Keiri luteum magno flore. Rupp. Leucoium luteum magno flore. C. Bauh.

Cheiranthus (*Cheiri β.*) foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis. Linn. Sp. 924.

Güldener Lak, gelber Lak.

Keiri s. Leucoium luteum vulgare. Rupp. C. Bauh.

Cheiranthus *cheiri α.* Lin. 924.

Gemeine gelbe Veilchen.

Keiri luteum pleno flore maius. C. Bauh.

Cheiranthus *Cheiri δ.* Linn. ib.

Keiri flore luteo pleno, minore. Rupp.

Cheiranthus *Cheiri ε.* Linn.

Keiri sylueſtre, foliis Hieracii. Rupp. Leucoium luteum, sylueſtre, hieracifolium. C. Bauh.

Erysimum (*hieracifolium*) foliis lanceolatis serratis. Linn. 923.

Blüht mit den vorhergehenden im April und May.

Hesperis hortensis. C. Bauh. Viola matronalis. Gesneri.

Hesperis (*matronalis*) caule simplici erecto, foliis ouato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. Linn. 927.

Violamatronalis. Man findet sie sowohl einfach, als gefüllt in den Gärten.

Hesperis montana, pallida odoratissima. C. Bauh.

Hesperis (*tristis*) caule hispido ramoso patente. Linn. 927.

Nacht-Violen. Blüht mit vorhergehender im May und Junio.

Alli-

Digitized by Google

Alliaria. C. Bauh.

Eryſimum (*Alliaria*) foliis cordatis. Linn. 922.

Knoblauchskraut. Wächſt im May an allen Zäunen und Hecken.

Siſymbrium Erucae folio glabro, flore luteo. Tournef. Eruca lutea latifolia ſ. Barbarea. C. Bauh.

Eryſimum (*Barbarea*) foliis lyratis extimo ſubrotundo. Lin. 922.

Bitter Kreſſe, Sanct Barber-Kraut.

Eryſimum vulgare. C. Bauh.

Eryſimum (*officinale*) ſiliquis ſpicae adpreſſis, foliis runcinatis. Lin. 922.

Wegſenff. Bey dem Baderthore und gräflichen Fiſchhauſe.

Turritis foliis inferioribus cichoraceis, ceteris Perfoliatae. Tournef.

Braſſica ſylueſtris, foliis circa radicem cichoraceis.

Turritis (*glabra*) foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis amplexicaulibus glabris. Linn. 930.

Thurm-Senf, Thurm-Kraut. Bey Langenberg an Ländern und Zäunen.

Turritis vulgaris, ramoſa. Tournef.

Burſae paſtoris ſimilis, ſiliquoſa maior. C. Bauh.

Arabis (*thaliana*) foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. Linn. Sp. 929.

Bey Rauenberg, an ſteilen Orten.

Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente. Tournefort. Naſturtium pratenſe, magno flore. C. Bauh.

Cardamine (*pratenſis*) foliis pinnatis: foliolis radicali-

calibus subrotundis, caulinis lanceolatis. Linn. 915.

Wilde Kresse. Blüht im April und May auf Wiesen und am Hausberge.

Cardamine syluatica flore albo minore, folio vario. Rupp. Cardamine annua exigua flore. Tournef.

Cardamine (*impatiens*) foliis pinnatis incisis, floribus pulatis apetalis. Linn. 914.

Im Walde und Martinsgrunde.

Cardamine flore maiore, elatior Tournefort. Sisymbrium cardamine s. Nasturtium aquaticum maius et amarum. C. Bauh.

Cardamine (*amara*) foliis pinnatis, axillis stoloniferis. Linn. 915.

Am Mühlgraben, und im Törken-Grunde.

Dentaria neptaphyllos, baccifera. C. Bauh.

Dentaria (*bulbifera*) foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus. Linn. 912.

Schuppen-Wurz, Zahn-Kraut. Blüht im May bey Zwickau in Wäldern.

Sisymbrium aquaticum. Matthioli. Nasturtium aquaticum supinum. C. Bauh.

Sisymbrium (*Nasturtium aquaticum*) siliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis subcordatis. Linn. Sp. 916.

Brunnkresse. In Zauffens Graben bey Dörne und bey Dienz am Ende des gräflichen Gartens in dasigen Quellen.

Sisymbrium aquaticum, Raphani folio, siliqua leuiori. Tournefortii. Raphanus aquaticus, rapistri folio. C. Bauh.

Si-

Digitized by Google

Siſymbrium (*amphibium aquaticum*) ſiliquis declinatis oblongo-ouatis, ſerratis. Linn. Sp. 917.

Waſſer-Kreſſe. Blüht im Julio, nach der Unterhäuſer Mühle, im Mühlgraben.

Siſymbricum paluſtre repens, Naſturtii folio, Tournefortii. Eruca paluſtris, naſturtii folio, ſiliqua oblonga. C. Bauh.

Siſymbrium (*ſylueſtre*) ſiliquis declinatis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis ſerratis. Lin. 916.

Kleine kriechende Kreſſe. Am Wege nach dem Unterhäuſiſchen Herrngarten.

Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio. Tournefortii.

Naſturtium ſylueſtre, tenuiſſime diuiſum. C. Bauh.

Siſymbrium (*Sophia*) petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. Linn. 920.

Sophien-Kraut, Well-Saamen. Bey der groſſen Brücke, an ungebauten Orten. Blüht im Julio.

Eruca aruenſis vulgaris. Rupp. Rapiſtrum flore luteo, foliis inciſis vel ſinuatis. C. Bauh.

Sinapis (*aruenſis*) ſiliquis multangulis toroſo-turgidis roſtro longioribus. Linn. Sp. 933.

Auf hieſigen Kornfeldern.

Eruca Rapi folio. Rupp. Sinapi Rapi folio. C. Bauh.

Sinapis (*nigra*) ſiliquis glabris apice tetragonis. Linn. Sp. 933.

Sinapi Apii folio. C. Bauh.

Sinapi ſiliqua hirſuta, ſemine albo et ruffo. I. Bauh.

Sinapis (*alba*) ſiliquis hiſpidis, roſtro obliquo longiſſimo. Linn. Sp. 933.

Bey Erfurt.

Digitized by Google

b) Mit kleinen kurzen Schötgen.

Thlaſpi aruenſe, Vaccariae incano folio, maius, C. Bauh. Thlaſpi vulgatius. I. Bauh.

Thlaſpi (*campeſtre*) ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. Linn. 902.

Bauren-Senf. Blüht im May und Junio, an ungebauten Orten.

Thlaſpi aruenſe, ſiliquis latis. C. Bauh.

Thlaſpi (*aruenſe*) ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. Linn. 901.

Pfennigkraut.

Thlaſpidium alpinum foliis Globulariae. Rupp.

Thlaſpi alpinum Bellidis coeruleae folio. C. Bauh.

Thlaſpi (*montanum*) ſiliculis obcordatis, foliis glabris radicalibus carnoſis obouatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calyce maioribus. Lin. 902.

Am Haynberge.

Thlaſpi aruenſe, perfoliatum maius. C. Bauh.

Thlaſpi (*perfoliatum*) ſiliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calycis, caule ramoſo. Linn. Sp. 902.

Bey Langenberg, an den Rändern der Fahrſtraße.

Burſa paſtoris maior, folio ſinuato. C. Bauh.

Thlaſpi (*burſa paſtoris*) ſiliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis. Linn. Sp. 903.

Burſa paſtoris media. C. Bauh.

Thlaſpi *burſa paſtoris* β. Linn. 903.

Hirtentaſche, Täſchelkraut. Blüht im April und May.

Alyſſum

Alyſſum incanum, Serpylli folio, fructu nudo. Tournefort.

Thlaſpi montanum incanum luteum ſerpylli folio, maius. C. Bauh.

Alyſſum (*campeſtre*) caule herbaceo, ſtaminibus ſtipatis pari ſetarum, calycibus deciduis. Lin. 909.

Im Steinbruche bey der Ziegelſcheune. Blüht im May, Junio und Julio.

Alyſſum ſ. Thlaſpi fruticoſum incanum Tournef. C. Bauh. Thlaſpi incanum Mechlinenſe. Lobel.

Alyſſum (*incanum*) caule erecto, foliis lanceolatis, incanis integerrimis, floribus corymboſis. Lin. 908.

Blüht im Julio.

Thlaſpi Roſa de Hiericho dictum Moriſon.

Roſa hierichuntea vulgo dicta. C. Bauh.

Anaſtatica (*hierochuntica*) foliis obtuſis, ſpicis axillaribus breuiſſimis, ſilicatis vngulatis ſpinoſis. Linn. 895.

In den Gärten.

Naſturtium hortenſe criſpum. C. Bauh.

Lepidium (*ſatiuum* β.) floribus tetradynamis, foliis oblongis multifidis. Linn. 899.

Garten-Kreſſe. Blüht im Junio.

Iberis latiore folio. C. Bauh.

Lepidium (*Iberis*) floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis; ſuperioribus linearibus integerrimis. Linn. 900.

Stinkende Kreſſe.

Lepidium latifolium C. Bauh.

Digitized by Google

Lepidium (*latifolium*) foliis ouato-lanceolatis integris serratis. Lin. 899.

Pfefferkraut. Blüht im Juni und Juli in den Gärten.

Alyſſum foliis Veronicae. Rupp. Burſa paſtoris maior, loculo oblongo. C. Bauh.

Draba (*muralis*) caule ramoſo, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus. Linn. Sp. 897.

Bey Nuxteniz und Borkersdorf, nach Schmella auf den Feldern. Blüht im Merz und April.

Alyſſum ſegetum, foliis auriculatis acutis. Tournef. Myagrum ſatiuum. C. Bauh.

Myagrum (*ſatiuum* β.) ſiliculis obouatis pedunculatis polyſpermis. Linn. Sp. 894.

Leindotter, Flachsdotter. Blüht im Junio und Julio, auf dem Felde unter dem Getraide.

Cochlearia folio ſubrotundo. C. Bauh.

Cochlearia (*officinalis*) foliis radicalibus ſubrotundis, caulinis oblongis ſubſinuatis. Linn. Sp. 903.

Löffelkraut. Blüht im April in den Gärten.

Cochlearia folio cubitali. Tournefort. Raphanus ruſticanus. C. Bauh. Armoracia. Riuini.

Cochlearia (*armoracia*) foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis. Linn. Sp. 904.

Meer-Rettich. Blüht im Junio und Julio.

Coronopus Ruellii ſiue Naſturtium verrucoſum. I. Bauh. Ambroſia campeſtris repens. C. Bauh.

Cochlearia (*Coronopus*) foliis pinnatifidis. Linn. Sp. 904.

Bey Ronneburg auf den Feldern. Blüht im Julio.

Digitized by Google

Pſyllium maius erectum. C. Bauh.. Plantago caule ramoſo. Roy.

Plantago (*pſyllium*) caule ramoſo herbaceo, foliis ſubdentatis recuruatis, capitulis aphyllis. Linn. Sp. 167.

Flöh-Kraut. Blüht im Junio.

Plantago latifolia incana. C. Bauh.

Plantago (*media*) foliis ouato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. Linn. Sp. 163.

Wegbreit.

Plantago latifolia glabra. C. Bauh.

Plantago (*maior β.*) foliis ouatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. Linn. Sp. 163.

Blüht mit vorhergehenden überal auf den Feldern.

Plantago anguſtifolia maior. C. Bauh.

Plantago (*lanceolata*) foliis lanceolatis, ſpica ſubouata nuda, ſcapo angulato. Linn. Sp. 164.

Blüht im Junio und Julio.

Plantago anguſtifolia minor. C. Bauh.

Eine Varietät.

Plantago latifolia roſea, flore expanſo. C. Bauh.

Plantago (*maior ε.*) Lin. 164.

3.

Mit einer vierkämmerigen Saamen-Kapſel.

Syringa alba ſ. Philadelphus Athenaei. C. Bauh.

Philadelphus (*coronarius*) foliis ſubdentatis. Linn. Spec. 671.

Wilder einfacher Jesmin. Blüht im May und Junio, in den Gärten.

Digitized by Google

Ruta hortenſis latifolia. C. Bauh.

Ruta (*graueolens* γ.) foliis decompoſitis, petalis laceris, floribus lateralibus quadrifidis. Linn. Spec. 548.

Raute. Blüht im Julio und Junio, in den Gärten.

Erica vulgaris flore purpureo. Rupp. Erica vulgaris glabra. C. Bauh.

Erica (*vulgaris*) antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis. Linn. Spec. 501.

Heyde. Blüht im Auguſt, am Haynberge, und im Rathsholze.

Hypopitys Riuini. Orobanche, quae hypopitys dici poteſt. C. Bauh.

Monotropa (*Hypopithys*) floribus lateralibus octandris, terminali decandro. Linn. 555.

Blüht im Julio und Auguſt, im Martins-Grunde.

Roſea Riuini et officinorum. Rhodia radix. C. Bauh. Rhodiola *roſea* Linn. 1465.

Roſenwurz. In Geims Garten, blüht im May.

4.

Mit einer achtkämmerigen Saamen-Kapſel.

Linoides ſiue Radiola quorundam. Rupp. Chamaelinum vulgare. Vaillant.

Linum (*Radiola*) foliis oppoſitis, caule dichotomo, floribus tetrandris tetragynis. Linn. 402.

Bey Barsdorf auf ſandigen Aeckern. Blüht im Julio.

5.

Digitized by Google

5.

Mit einer Beere, und zwar

a) Mit einer einkörnigen.

Cornus vulgaris Rupp.

Cornus hortenſis mas. C. Bauh.

Cornus (*mas β.*) arborea, vmbellis inuolucrum aequantibus. Linn. 171.

Herlizgen. Blüht im Merz und April.

Cornus ſylueſtris mas. C. Bauh.

Cornus (*mas α.*) Linn. 171.

Wilde Herlizgen, Cornel-Kirſchen. Bey Nordhauſen im Buſchholze, auf dem Harz, und bey Jena auf dem Kunizer Berge.

Cornus foemina. C. Bauh. Oſſea Loniceri et Riuini.

Cornus (*Sanguinea*) arborea, cymis nudis. Linn. 171.

Hart-Riegel. Blüht im May.

Cornus (*Canadienſis*) herbacea ramis nullis. *L.*

Im Herrſchaftlichen Garten.

Laurus vulgaris. C. Bauh.

Laurus, (*nobilis*) foliis venoſis lanceolatis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. Linn. 529.

Lorbeerbaum.

b) Mit einer zweykernigen Beere.

Lilium conuallium minus. C. Bauh.

Conuallaria (*bifolia*) foliis cordatis. Linn. 452.

c) Mit einer vierkernigen Beere.

Euonymus vulgaris, gramis rubentibus. C. Bauh.

Euonymus foliis oblongo-ouatis. v. Haller. Helu.

Digitized by Google

Euonymus (*europaeus tenuifolius*) floribus plerisque quadrifidis. Linn. Sp. 286.

Spindelbaum, Spillbaum, Pfaffenhüthgen. Blüht im Junio, an den Zäunen.

Rhamnus catharticus. C. Bauh.

Rhamnus (*Catharticus*) spicis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ouatis. Linn. 279.

Kreuzbeere, Wegdorn, Kreuzdorn. Blüht im Junio, am Wege nach Wünschen, Bernsdorf, an den Rubizer Berge, und vor dem Klozthore an den Zäunen.

d) Mit einer vielkernigen Beere.

Herba Paris. Tournefortii. Solanum quadrifolium bacciferum. C. Bauh.

Paris *quadrifolia*. Linn. 526.

Einbeere, Wolffsbeere. Blüht im May, am Pfortner Berge in den Büschen.

Oxycoccus. Tournefortii. Vitis Idea paluſtris. C. Bauh.

Vaccinium (*oxycoccus*) foliis integerrimis reuolutis ouatis, caulibus repentibus filiformibus nudis. Linn. 500.

Mooßbeere, Sumpfbeere. Bey Schönkleine. Blüht im May.

Chriſtophoriana vulgaris noſtras racemoſa et ramoſa. Moriſon. Aconitum bacciferum. C. Bauh.

Actaea (*ſpicata nigra*) racemo ouato, fructibusque baccatis. Linn. 722.

Chriſtoph-Wurzel. An dem Schloßberge und an der Fahrſtraße.

Fünfte

Fünfte Klasse.

Gewächse mit einer regulären fünfblätterigen Blume.

I.

Mit einem einzigen unbedekten Saamen.

Statice. H. Lugd. Caryophyllus montanus maior, flore globoso. C. Bauh.

Statice (*Armeria*) scapo simplici capitato, foliis linearibus. Linn. 394.

Wiesen-Nelken. In den Gärten und auf dürren Wiesen. Blühet im Junio und Julio.

Polygonum latifolium. C. Bauh.

Polygonum (*auiculare*) floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. Linn. 519.

Weg-Tritt, Weg-Gras. Blüht im Junio.

Polygonum oblongo, angustoque folio. C. Bauh.

Polygonum *auiculare* γ. Linn. 520.

Auf sandigten Aeckern.

Polygonum breui angustoque folio. C. Bauh.

Polygonum *auiculare* β. Linn. 520.

Bey dem Steinbruche nach Ronneburg.

Persicaria orientalis altissima, Nicotianae folio, calice florum purpureo. Tournefort.

Polygonum (*orientale*) floribus heptandris digynis, foliis ouatis, caule erecto, stipulis hirtis hypocrateriformibus. Linn. 519.

Digitized by Google

Im Geimfischen Garten. Blüht im August und September.

Persicaria mitis maculosa et non maculosa. C. Bauh.
Polygonum (*persicaria*) floribus hexandris digynis, spicis ouato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. Linn. 518.
Flöh-Kraut, Pfersing-Kraut. Vor dem Klozthore, auf dem ausgeworfenen Schlamme des Mühlgrabens, bey Schippach.

Persicaria angustifolia. C. Bauh.
Polygonum (*persicaria* β.) Linn.
Im Stadtholze.

Persicaria viens seu Hydropiper. C. Bauh.
Polygonum (*Hydropiper*) floribus hexandris semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. Linn. Sp. 517.
In Lachen, und an der Elster im Mühlgraben.

Persicaria salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta Raii. Potamogeton salicis folio. C. Bauh.
Polygonum (*amphibium*) floribus pentandris semidigynis, staminibus corolla longioribus. Linn. Sp. 517.
Auf der Herren-Wiese an der Elster. Blüht selten.

Persicaria palustris fluitans, foliis breuioribus et latioribus, florum spica specioſa, purpurea, compactiore. Rupp.
Eine Varietät von ienер. Blüht im August im Gräflichen Teiche in Dienz.

Bistorta maior, radice magis intorta. C. Bauh.
Polygonum (*Bistorta*) caule simpliciſſimo monostachyo,

Digitized by Google

chyo, foliis ouatis in petiolum decurrentibus. Linn. 516.

Krebswurz, Natterwurz. Bey der Schmelzhütte vor dem Klozthore. Blühet im Junio.

Fagopyrum vulgare erectum. Tournefort. Helxine caule erectiusculo inermi, foliis cordato-sagittatis. Hort. Cliffort.

Polygonum (*Fagopyrum*) foliis cordato-sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus. Linn. 522.

Heide-Korn, Buch-Weizen. Bey Schönkleine.

Fagopyrum vulgare scandens. Tournefort. Conuoluulus minor, semine triangulo. C. Bauh. Helxine caule volubili. Hortus Cliffort.

Polygonum *Conuoluulus*) foliis cordatis, caule volubili, floribus pleniusculis. Linn. 522.

Wild Heidekorn, Vogelzunge. Unter dem Getreide auf den Aeckern.

Fagopyrum scandens, altissimum dumetorum, seminibus tribus, alis pellucidis cinctis. Rupp.

Polygonum (*dumetorum*) foliis cordatis caule volubili laeui, floribus carinato-alatis. Linn. 522.

An den Zäunen und Hecken, am Wege nach Pforten.

Agrimonia officinarum Rupp. Eupatorium veterum siue Agrimonia. C. Bauh.

Agrimonia (*Eupatoria*) foliis caulinis pinnatis impari petiolato, fructibus hispidis. Linn. 643.

Acker-Mennig, Oder-Mennig. Auf grasigten Rändern nach Roschiz. Blüht im Junio.

Agrimonia orientalis humilis, radice crassissima repente, fructu in spicam breuem et densam congesto. Tournef.

Digitized by Google

Agrimonia (*repens*) foliis caulinis pinnatis, impari ſeſſili, fructibus hiſpidis. Lin. 643.

Im Genſeliſchen Garten.

Tilia foemina, folio maiore. C. Bauh.

Tilia (*europaea*) floribus nectario deſtitutis. Linn. 733.

Linde. Blüht im May und Junio.

Tilia foemina folio minore. C. Bauh.

Tilia *europaea* γ. Linn. ib.

Toxicodendron triphyllum, folio ſinuato pubeſcente Tournefort. Arbor trifolia venenata virginiana, folio hirſuto. Raii.

Rhus (*Toxicodendron*) foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus, caule radicante. Linn. 381.

Im Gräflichen Garten.

2.

Mit zwey unbedekten Saamen.

Acer montanum candidum. C. Bauh. Acer maius. Dodon.

Acer (*Pſeudo-Platanus*) foliis quinquelobis inaequaliter ſerratis, floribus racemoſis. Lin. 1495.

Gemeiner Ahorn, Waldeſcher. In Langens Garten, und am Haynberge.

Acer montanum tenuiſſimis et acutis foliis. C. Bauh.

Acer (*Platanoides*) foliis quinquelobis acuminatis acute dentatis glabris, floribus corymboſis. Linn. 1496.

Lehne, Rüſter. Auf dem Hausberge bey Langenberg.

Acer

Acer campestre et minus. C. Bauh.

Acer foliis semitrilobis, lobis obtuse incisis. v. Haller.

Acer (*Campestre*) foliis lobatis obtusis emarginatis. Linn. 1497.

Maas-Eller. An Hecken und Zäunen. Blüht mit den vorhergehenden im May.

3.

Mit mehreren unbedekten Saamen.

Vlmaria Clusii. Barba Caprae, floribus compactis. C. Bauh.

Spiraea (*Vlmaria*) foliis pinnatis, impari maiore lobato, floribus cymosis. Linn. 702.

Geißbart, in dem Grunde am Haynberge, bey dem Lusthause, auch bey Päppeln. Blüht im Junio und Julio. Man findet es auch in den Gärten mit gefüllter Blüthe.

Ranunculus nemorosus vel syluaticus folio subrotundo. C. Bauh.

Ranunculus (*Auricomus*) foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. Linn. 775.

Blüht im April und May, auf dem Rubizer Berge, im Buschholze.

Ranunculus pratensis repens hirsutus. C. Bauh.

Ranunculus (*repens*) calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. Linn. 779.

Hahnenfuß, Krähenfuß. Man findet ihn auch mit gefüllter Blüthe.

Ra-

Digitized by Google

Ranunculus pratenſis erectus acris. C. Bauh.

Ranunculus (*acris*) calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, ſummis linearibus. Linn. 779.

Auf den Wieſen.

Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus flore maiore. C. Bauh.

Ranunculus (*Aconitifolius*) foliis omnibus quinatis lanceolatis inciſo-ſerratis. Linn. 776.

Im Buſchholze bey dem Haynberge, und am Erdfalle.

Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. C. Bauh.

Ranunculus Aconitifolius γ. Linn. 776.

Ranunculus longifolius paluſtris maior. C. Bauh.

Ranunculus (*Lingua*) foliis lanceolatis, caule erecto. Linn. 773.

Bey Zwickau im Teiche.

Ranunculus longifolius paluſtris minor. C. Bauh. Ranunculus longifolius, aliis Flammula. I. Bauh.

Ranunculus (*Flammula*) foliis ouato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. Linn. 772.

Im Stadtholze, nach Wünſchen, Brensdorf, in ſtehenden Lachen.

Ranunculus paluſtris foliis ſerratis. C. Bauh.

Ranunculus *Flammula* β. Linn. 773.

Auf ſumpfigten Wieſen, im Walde nach Grätz.

Ranunculus aquaticus, capillaceus. C. Bauh. Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ranunculi flore et capitulo. C. Bauh.

Ranunculus (*aquatilis* γ) foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis ſubpeltatis. Linn. 782.

In

Digitized by Google

In der Lache nach Dieschiz.

Ranunculus aquatilis albus, fluitans, Peucedani foliis, Hermann. Millefolium aquaticum, foliis foeniculi, ranunculi flore et capitulo. C. Bauh.

Ranunculus *aquatilis* δ. Linn. 782.

Im Mühlgraben bey der Klozmühle.

Ranunculus paluſtris, Apii folio laeuis. C. Bauh.

Ranunculus (*ſceleratus*) foliis inferioribus palmatis, ſummis digitatis, fructibus oblongis. Linn. 776.

In dem Waſſergraben nach dem Gräflichen Garten.

Ranunculus aruenſis echinatus. C. Bauh.

Ranunculus (*aruenſis*) ſeminibus aculeatis, foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus. Linn. 780.

Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo. C. Bauh.

Ranunculus (*Aſiaticus* η.) foliis ternatis biternatisque, foliolis trifidis inciſis, caule inferne ramoſo. Linn. 777.

Ranunculus montanus, folio plantaginis. C. Bauh.

Ranunculus (*amplexicaulis*) foliis ouatis acuminatis amplexicaulibus, caule multifloro, radice faſciculata. Linn. 774.

Mit den vorhergehenden, in den Gärten.

Myoſurus foliis integerrimis. Hort. Cliffort. Holoſteo affinis Cauda muris. C. Bauh.

Myoſurus *minimus*. Linn. 407.

Mäuſe-Schwanz. Bey Ronneburg und nach Poſchwiz.

Quinquefolium album, maius alterum. C. Bauh.

Pentaphyllum album. I. Bauh.

Poten-

Digitized by Google

Potentilla (*alba*) foliis quinatis, apice conniventi-ferratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirsutis. Linn. 713.

Fünffingerkraut. Im Geimsischen Garten. Blüht im Julio.

Quinquefolium maius repens. C. Bauh.

Potentilla (*reptans*) foliis digitatis, caule repente, pedunculis vnifloris. Linn. 714.

Am Haynberge.

Quinquefolium minus repens luteum. C. Bauh.

Potentilla (*verna*) foliis radicalibus quinatis acute serratis retusis, caulinis ternatis, caule declinato. Linn. 712.

Ebendaselbst.

Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum. C. Bauh.

Potentilla (*opaea*) foliis radicalibus quinatis cuneiformibus serratis, caulinis suboppositis, ramis filiformibus decumbentibus. Linn. 713.

Blüht im April und May.

Quinquefolium folio argenteo. C. Bauh.

Potentilla (*argentea*) foliis quinatis cuneiformibus incisis subtus tomentosis, caule erecto. Linn. 712.

Bey Dienz an steinichten Orten.

Potentilla foliis nouenis palmatis apice serratis. v. Haller.

Potentilla (*fragaroides*) foliis pinnatis ternatisque, extimis maioribus, flagellis reptantibus. Lin. 710.

Bey Erfurt.

Pentaphylloides argenteum, alatum, seu Potentilla Tournef.

Poten-

Digitized by Google

Potentilla (*anſerina*) foliis pinnatis ſerratis, caule repente. Linn. 710.

Gänſekraut. Blüht im May und Junio.

Pentaphylloides, rectum fruticoſum Eboracenſe. Moriſon.

Potentilla (*fruticoſa*) foliis pinnatis, caule fruticoſo. Linn. 709.

Im Geimſchen Garten.

Quinquefolium paluſtre, rubrum. C. Bauh.

Comarum *paluſtre*. Linn. 718.

Siebenfingerkraut. In den Teichen nach Mittelbölniz.

Fragaria vulgaris. C. Bauh.

Fragaria (*veſca ſylueſtris*) flagellis reptans. Linn. 709.

Erdbeere.

Fragaria fructu albo. C. Bauh.

Eine Varietät von iener. Brößlinge, Knolbeeren.

Fragaria fructu parui Pruni magnitudine. C. Bauh.

Fragaria *veſca pratenſis*. Linn. 709.

Fragaria ſterilis. C. Bauh.

Fragaria (*ſterilis*) caule decumbente repente. Linn. 709.

Blüht mit ienem im May. Am Haynberge über dem Erdfalle.

Caryophyllata vulgaris. C. Bauh.

Geum (*vrbanum*) floribus erectis, fructu globoſo villoſo, ariſtis vncinatis nudis, foliis lyratis. Linn. 716.

Caryophillata aquatica, nutante flore. C. Bauh.

Geum,

Digitized by Google

Geum (*rivale*) floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis. Linn. 717.

4.

Mit bedekten Saamen.

a) Mit einer einfächerigen Kapsel.

Alsine altissima nemorum. C. Bauh.

Stellaria (*nemorum*) foliis cordatis petiolatis paniculâ, pedunculis ramosis. Linn. 603.

Hühnerdarm. Am Fischhause der Elster, und bey der großen Brücke.

Alsine montana latifolia flore laciniatio. C. Bauh.

Stellaria *nemorum* β. Linn 603.

Bey Köstriz an der Elster.

Alsine pratensis gramineo folio, ampliore. Tournef. Caryophyllus aruensis, glaber, flore maior. I. Bauh.

Stellaria (*Holostea*) foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis. Lin. 603.

Blumen-Gras. In den Gründen hinter Päppeln.

Alsine pratensis, gramineo folio, anguſtiore, Tournefort. Caryophyllus aruensis, glaber, flore minore. C. Bauh.

Stellaria (*graminea*) foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. Linn. 604.

Auf Wiesen an der Elster. Blüht mit den vorhergehenden im Junio.

Alsine media. C. Bauh.

Alsine (*media*) petalis bipartitis, foliis ouato-cordatis. Lin. 389.

Alsine hirsuta, magno flore, vasculo corniculato. Rupp.

Digitized by Google

Rupp. Caryophyllus aruenſis hirſutus, flore maiore. C. Bauh.

Ceraſtium (*aruenſe*) foliis lineari lanceolatis obtuſis glabris, corollis calyce maioribus. Linn. 628.

An den Wegen.

Alſine incana, vaſculo longiori, alpina, repens. Rupp. Lychnis incana repens. C. Bauh. Myoſotis aruenſis polygoni folio. Vaillant. tab. 30. fig. 5.

Ceraſtium (*repens*) foliis lanceolatis, pedunculis ramoſis, capſulis ſubrotundis. Lin. 628.

Auf den Aeckern.

Arenaria paluſtris. Rupp.

Alſine nodoſa germanica. C. Bauh.

Spergula (*nodoſa*) foliis oppoſitis ſubulatis laeuibus, caulibus ſimplicibus. Linn. 630.

Blüht im Auguſt, bey Pforten auf den Wieſen.

Arenaria aruenſis vulgatior. Rupp. Alſine, ſpergula dicta maior. C. Bauh.

Spergula (*aruenſis*) foliis verticillatis, floribus decandris. Linn. 630.

Spurree. Bey Ernſee und Mühlsdorf, auf den ſandigten Aeckern. Blüht im Junio.

Arenaria teretifolia verna, flore albo, ſemine limbo foliaceo cincto. Rupp.

Spergula (*pentandra*) foliis verticillatis, floribus pentandris. Lin. 630.

Blüht im April und May nach Pforten zu.

Alſine Saxatilis et multiflora, capillaceo flore. Vaillant.

Arenaria (*ſaxatilis*) foliis ſubulatis, caulibus paniculatis, calycum foliolis ouatis. Linn. 607.

Am Felſen bey Roda, dem Hammer gegen über, an der Straße.

Arenaria multicaulis, ſerpillifolia. Rupp.

Digitized by Google

Arenaria (*ſerpyllifolia*) foliis ſubouatis acutis, ſeſſilibus corollis calyce breuioribus. Lin. 606.

An dem Mühlgraben.

Rorella vulgaris et officinarum. Rupp. Ros ſolis folio ſubrotundo. C. Bauh.

Droſera (*rotundifolia*) ſcapis radicatis, foliis orbiculatis. Lin. 402.

Sonnenthau. Blüht im Junio, in Martins-Grunde, und in der Gegend nach Grätz.

Parnaſſia Tournefortii et Riuini. Gramen Parnaſſi, albo ſimplici flore. C. Bauh.

Parnaſſia *paluſtris*. Linn. 391.

Auf der Wieſe hinter der Schmelzhütte. Blüht im April und September.

Lychnis hirſuta, flore coccineo, maior. C. Bauh.

Lychnis (*chalcedonica*) floribus faſciculatis faſtigiatis. Linn. 625.

Blüht im Junio und Julio, in den Gärten, auch mit weiſſer und fleiſchfarbener Blüthe.

Lychnis ſyluestris alba ſimplex. C. Bauh.

Lychnis (*dioica* β) floribus dioicis. Linn. 626.

In den Gärten und auf den Wieſen.

Lychnis alba multiplex. C. Bauh.

Lychnis *dioica* γ. Linn. Sp. ib.

Lychnis ſyluestris ſiue aquatica, purpurea ſimplex. C. Bauh.

Lychnis *dioica* α. Linn.

Am Mühlgraben und an der Elſter, am kleinen Wehre.

Lychnis pratenſis, flore laciniato ſimplici. Moriſon. Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, ſiue flos cuculi. C. Bauh.

Lychnis (*flos Cuculi*) petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. Linn. 625.

Gukuk-

Gukuks-Speichel. Auf den Wieſen der Schmelzhütte.

Lychnis coronaria, Dioſcoridis ſatiua, flore ruberrimo, diluto et albo. C. Bauh.

Agroſtemma (*coronaria*) tomentoſa, foliis ouato-lanceolatis, petalis integris coronatis. Linn. 625.

Blüht auch gefüllt im Geimſiſchen Garten.

Lychnis ſegetum maior. C. Bauh.

Agroſtemma (*Githago*) hirſuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. Linn. 624.

Unter dem Getraide.

Lychnis ſegetum rubra, foliis Perfoliatae. C. Bauh.

Saponaria (*Vaccaria*) calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ouatis acuminatis ſeſſilibus. Linn. 385.

Bey Wägmar. Blühet im Auguſt.

Saponaria maior laeuis. C. Bauh.

Saponaria (*officinalis*) calycibus cylindricis, foliis ouato-lanceolatis. Linn. 584.

Bey der Zugmühle und an der Elſter.

Lychnis ſeu Saponaria flore pleno. Tournef.

Eine Varietät von iener. Blüht im Auguſt.

Lychnis annua minima, flore carneo, lineis purpureis diſtincto. Tournef. Caryophyllus minimus muralis. C. Bauh.

Gypſophila (*muralis*) foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis. Linn. 583.

Im Steinbruche bey Schreibers Teiche. Man findet ſie auch mit rothen Punkten.

Tunica hortenſis varia, ſimplex et plena Rupp. Caryophyllus maximus ruber et variegatus. C. Bauh.

Dianthus (*Caryophyllus coronarius γ.*) floribus ſolita-

litariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, corollis crenatis. Linn. 587.

Garten-Nelken, ſind in Anſehung ihrer Größe und Farbe überaus mannigfaltig.

Tunica Sinenſis flore ſimplici pulcherrimo. Rupp.

Dianthus (*Chinenſis*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubulatis, patulis tubum aequantibus, corollis dentatis. Linn. 588.

Tunica montana altiſſima, flore tenuiſſime laciniato. Rupp. Caryophyllus ſylueſtris floribus lanuginoſis hirſutis. C. Bauh.

Dianthus (*plumarius*) floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, corollis multifidis fauce pubeſcentibus. Linn. 589.

Federnelke. Auf dem Haynberge.

Tunica latifolia floribus vmbellatis. Rupp.

Caryophyllus ſylueſtris, latifolius, vulgaris. C. Bauh.

Dianthus (*Carthuſianorum*) floribus ſubaggregatis, ſquamis calycinis ouatis ariſtatis tubum ſubaequantibus, foliis linearibus trineruiis. Linn. 586.

Cartheuſer-Nelken. Blüht im Auguſt in den Gärten.

Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. C. Bauh.

Dianthus (*deltoides*), floribus ſolitariis, ſquamis calycinis lanceolatis binis, corallis crenatis. Linn. 588.

Donner-Nelken. Bey Roſchiz und bey Peppelu. Blüht im May, Junio und Julio.

Helianthemum Serpilli folio, flore maiore, aureo, odorato. Tournefort. Chamaeciſtus repens ſerpilli folia lutea. C. Bauh.

Ciſtus (*ſerpillifolius*) ſuffruticoſus ſtipulatus, foliis oblongis, calycibus laeuibus. Linn. 743.

Kirſch-

Digitized by Google

Kirsch-Isop, Heyden-Isop. Bey Schippach auf den Anhöhen des Buschholzes.

Helianthemum vulgare flore luteo. I. Bauh. Chamaecistus vulgaris flore luteo. C. Bauh.

Cistus (*Helianthemum*) suffruticosus, procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis subpilosis. Linn. 744.

Blüht mit ienem im May und Junio, an den Rändern und Weinbergen, nach dem Gerichte.

Portulaca latifolia siue satiua. C. Bauh.

Portulaca (*oleracea* β.) foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. Linn. 638.

Portlak.

Portulaca spuria aquatica. Rupp. Alsine palustris minor serpillifolia. C. Bauh.

Peplis (*portulaca*) floribus apetalis. Linn. 474.

Bey Schippach und Röpsen, an sumpfigten Orten. Blüht im August und September.

Amaranthus maximus. C. Bauh.

Amaranthus (*caudatus*) racemis pentandris decompositis, cylindricis pendulis longissimis. Linn. 1406.

Fuchsschwanz. Blüht im Julio und August.

Amaranthus syluestris maximus nouae Angliae, spicis viridibus. Rai.

Amaranthus (*hybridus*) racemis pentandris decompositis congestis nudis, spiculis coniugatis. Lin. 1406.

In den Gärten.

Amaranthus foliis variegatis. Morison. C. Bauh.

Amaranthus (*tricolor*) glomerulis triandris axillaribus subrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolato-ouatis. Linn. 1403.

Digitized by Google

Amaranthus folio variegato. C. Bauh. Colore obſcuriori. ſ. mas. Tournef.

Amaranthus (*melancholicus*) glomerulis triandris axillaribus ſubrotundis ſeſſilibus, foliis lanceolatis acuminatis. Lin. 1403.

Blitum album minus. C. Bauh.

Amaranthus (*viridis*) glomerulis triandris: floribus maſculis trifidis, foliis emarginatis, caule erecto. Lin. 1405.

Mit ienen in den Gärten.

Amaranthus panicula incurua. C. Bauh.

Celoſia (*coccinea*) foliis ouatis ſtrictis inauriculatis caule ſulcato, ſpicis multiplicibus criſtatis. Lin. 297.

Hahnenkamm. In den Gärten.

b) Mit einer zweykämmerigen Saamen-Kapſel.

Geum rotundifolium maius. Tournefort. Sanicula montana, rotundifolia, maior. C. Bauh.

Saxifraga (*rotundifolia*) foliis caulinis reniformibus dentatis, caule paniculato. Linn. 576.

Jehova-Blümgen. Blüht im May und Junio.

Sanicula montana rotundifolia minor. C. Bauh.

Saxifraga (*Geum*) foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. Linn. 574.

Saxifraga rotundifolia alba. C. Bauh.

Saxifraga (*granulata*) foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo, radice granulata. Linn. 576.

In den Gärten. Weiſſer Steinbrech.

Saxifraga ſedi folio anguſtiore, ſerrato. Tournef. Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis. C. Bauh.

Saxifraga (*Cotyledon* ε.) foliis radicatis aggregatis lingu-

Digitized by Google

lingulatis, cartilagineo-ſerratis, caule paniculato. Linn. 570.

Gänſe-Zunge.

Staphyllodendron Matthioli.

Staphylea (*pinnata*) foliis pinnatis. Linn. 386.

Teutſche Pimpernüſſe, Klappernüſſe. Blühen im May und Junio.

c) Mit einer dreykämmerigen Saamen-Kapſel.

Hypericum vulgare C. Bauh.

Hypericum (*perfoliatum*) floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtuſis pellucido-punctatis. Linn. 1105.

Johanniskraut. Blüht im Junio am Hayn- und Pfortner Berge.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. C. Bauh. Hypericum humifuſum, foliis perforatis, punctis in margine nigris. v. Haller. helu.

Hypericum (*humifuſum*) floribus trigynis axillaribus ſolitariis, caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris. Linn. 1105.

An den Aeckern bey der Elſter. Blüht im Auguſt.

Hypericum Aſcyron dictum, caule quadrangulo. I. Bauh.

Hypericum (*quadrangulum*) floribus trigynis, caule quadrato herbaceo. Linn. 1104.

Auf den Wieſen.

Hypericum fruticoſum creticum foetidiſſimum ſtaminibus florum longiſſimis. Rupp.

Hypericum (*hircinum*) floribus trigynis, ſtaminibus corolla longioribus, caule fruticoſo ancipiti. Linn. 1103.

Bokskraut.

Digitized by Google

Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. I. Bauh.

Hypericum (*montanum*) floribus trigynis, calycibus ſerrulatis glandulosis, caule tereti erecto glabro, foliis ouatis. Lin. 1105.

Hypericum villoſum erectum, caule rotundo. Tournef.

Hypericum (*hirſutum*) floribus trigynis, calycibus ſerrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ouatis ſubpubeſcentibus. Lin. 1105.

Am Pfortner Berge.

Drymopogon Riuini. Barba caprae floribus oblongis. C. Bauh.

Spiraea (*Aruncus*) foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis. Linn. 702.

Muſcipula pratenſis veſicaria. Rupp. Lychnis ſylueſtris, quae Been album vulgo. C. Bauh.

Cucubalus (*Behen*) calycibus ſubgloboſis, glabris reticulato-venoſis, capſulis triloculariбns, corollis ſubnudis. Linn. 591.

Wiederſtoß, bey Muhlsdorf. Blüht *im* May und Junio.

Muſcipula montana hirſuta. Rupp. Lychnis montana, viſcoſa alba, latifolia. C. Bauh.

Silene (*nutans*) petalis bifidis, floribus lateralibus ſecundis cernuis, panicula nutante. Linn. 596.

Am Pfortner Berge.

Muſcipula hiſpanica, latifolia, caliculis turgidis, ſtriatis. Rupp.

Silene (*Conoidea*) calycibus fructus globoſis acuminatis, ſtriis triginta, foliis glabris, petalis integris. Linn. Spec. 598.

In den Gärten.

Digitized by Google

d) Mit einer fünfkämmerigen Saamen-Kapsel.

Viscaria Riuini. Lychnis syluestris, viscosa, rubra, anguſtifolia. C. Bauh.

Silene (*Muscipula*) petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus sessilibus, foliis glabris. Linn. 601.

Pech oder Kleb-Nelken. Bey Peppeln am Fußsteige des Martin-Grundes, ingleichen bey Pforten. Blüht im Julio und Junio.

Argemone Tournefortii et Riuini. Papauer Spinosum. C. Bauh.

Argemone (*Mexicana*) capsulis quinqueualuibus, foliis spinosis. Linn. 727.

Ciſtus folio Saluiae. Rupp.

Ciſtus (*Saluifolius*) arboreſcens exſtipulatus, foliis ouatis petiolatis, vtrinque hirſutis, Linn. 738.

Ciſtus rotundifolius, flore roſeo. Rupp. Ciſtus mas, folio rotundo, hirſuto. C. Bauh.

Ciſtus (*pilosus*) arboreſcens exſtipulatus, foliis ouatis, petiolatis hirtis. Lin. 736.

In den Gärten.

Ledum Roſmarini folio. Tabernaem. Ciſtus Ledon foliis Roſmarini ferrugineis. C. Bauh.

Ledum *paluſtre*. Linn. 561.

Wilder Roßmarin, Poſt, Kühn-Poſt. Im Ganseldorfiſchen Walde, bey der Lausniz.

Acetoſella vulgaris et officinarum. Rupp. Trifolium acetoſum, vulgare, flore albo et purpuraſcente. C. Bauh.

Oxalis (*Acetoſella*) ſcapo vniſloro, foliis ternatis, radice ſqamoſo-articulata. Linn. 620.

Sauerklee, Buchampfer. Am Haynberge bey dem Luſthauſe. Blühet im April und May.

Digitized by Google

Acetoſella flore luteo, capſula corniculata. Rupp. Trifolium acetoſum, corniculatum. I. Bauh.

Oxalis (*corniculata*) caule ramoſo diffuſo, pedunculis vmbelliferis. Linn. 623.

In den Gärten und an den Zäunen.

Sedum minus teretifolium album. C. Bauh.

Sedum (*album*) foliis oblongis obtuſis, teretiuſculis ſeſſilibus patentibus, cyma ramoſa. Linn. 619.

Mauer-Pfeffer. Blüht im Julio.

Sedum minus luteum, folio acuto. C. Bauh.

Sedum (*reflexum*) foliis ſubulatis ſparſis, baſi ſolutis, inferioribus recuruatis. Lin. 618.

In der Gegend nach Zeiz.

Sedum paruum acre, flore luteo. I. Bauh. Semperviuum minus vermiculoſum acre. C. Bauh.

Sedum (*acre*) foliis ſubouatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. Linn. 619.

Am Tieſchizer Steinbruche.

Sedum minimum, luteum, non acre. I. Bauh. Semperuiuum minus vermiculatum inſipidum. C. Bauh.

Sedum (*ſexangulare*) foliis ſubouatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis. Linn. 620.

Am Steinbruche, bey der Ziegelſcheune.

Sedum paluſtre, ſubhirſutum, purpureum. C. Bauh.

Sedum (*villoſum*) caule erecto, foliis planiuſculis, pedunculisque ſubpiloſis. Linn. 620.

Bey Burkersdorf, nach Schmelle. Blüht im Junio und Julio.

Fabaria officinarum. Rupp. Telephium vulgare. C. Bauh.

Sedum (*Telephium*) foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. Linn. 616.

Dons

Digitized by Google

Donnerkraut, Schmeerwurz.

Sedum foliis ouatis vix ſerratis, vmbellis ex alis foliorum prodeuntibus. v. Haller. Helu. Anacampſeros maxima. C. Bauh.

Sedum *Telephium maximum* ε. Linn. 616.

Bey Egger an der Stadtmauer.

Fabaria rotundifolia repens et ſemper virens. Rupp. Anacampſeros minor, rotundiore folio, ſemper virens. C. Bauh.

Sedum (*Anacampſerus*) foliis cuneiformibus integerrimis, caulibus decumbentibus, floribus corymboſis. Linn. 616.

Im Gräflichen und Geimſiſchen Garten.

Spiraea Salicis folio, Tournefortii. Frutex ſpicatus, foliis ſalignis ſerratis. C. Bauh.

Spiraea (*ſalicifolia*) foliis lanceolatis obtuſis ſerratis nudis, floribus duplicato-racemoſis. Linn. 700.

Blüht im Junio; Im Geimſiſchen Garten.

Spiraea hyperici folio non crenato. Tournefort. Pruno ſylueſtri affinis canadenſis. C. Bauh.

Spiraea (*hypericifolia*) foliis obouatis integerrimis, vmbellis feſſilibus. Linn. 701.

Blüht im May, in den Gärten.

Geranium batrachoides, folio Aconiti. C. Bauh.

Geranium (*ſyluaticum*) pedunculis bifloris, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, caule erecto, petalis emarginatis. Linn. 954.

Storchſchnabel. Bey der neuen Schenke, ohnweit Roda, und bey Naumburg.

Geranium ſanguineum, maximo flore. C. Bauh.

Geranium (*ſanguineum*) pedunculis vnifloris, foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis. Linn. 958.

Bey Pappeln, auf Schmiedels Wieſe.

Gera-

Digitized by Google

Geranium romanum verſicolor ſ. ſtriatum. Moris.

Geranium (*ſtriatum*) pedunculis biflori, altero breuiore, foliis quinquelobis, lobis medio dilatatis, petalis bilobis, venoſo reticulatis. Lin. 953.

Im Geimſiſchen Garten.

Geranium montanum fuſcum. C. Bauh. Geranium phaeum ſiue fuſcum, petalis reflexis. Moriſon.

Geranium (*phaeum*) pedunculis biflori foliisque alternis, calycibus ſubcriſtatis, caule erecto, petalis vndulatis. Linn. 953.

Im Geimſiſchen Garten.

Geranium folio Maluae rotundo. C. Bauh.

Geranium (*rotundifolium*) pedunculis biflori, petalis integris obtuſiſſimis longitudine calycis, caule proſtrato, foliis reniformibus inciſis. Linn. 957.

Auf den Feldern.

Geranium Columbinum villoſum, petalis bifidis purpureis. Vaillant.

Geranium (*molle*) pedunculis biflori foliisque floralibus alternis, caule ramoſo erectiuſculo, calycibus muticis, arillis laeuibus. Linn. 955.

Geranium robertianum primum. C. Bauh.

Geranium (*robertianum*) pedunculis biflori, calycibus piloſis decem angulatis. Lin. 955.

Ruprechtskraut. Blüht im May und Junio, nach Rubig zu, an den Rändern.

Geranium lucidum ſaxatile. C. Bauh.

Geranium (*lucidum*) pedunculis biflori calycibus pyramidatis, angulatis, eleuato-rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis. Lin. 955.

In den Gärten.

Geranium Cicutae folio moſchatum. C. Bauh.

Geranium (*moſchatum*) pedunculis multifloris, floribus

Digitized by Google

bus pentandris, foliis pinnatis incisis, cotyledonibus pinnatifidis. Lin. 951.

In den Gärten.

Geranium batrachioides, folio Aconiti. C. Bauh.

Geranium (*Syluaticum*) pedunculis bifloris, foliis subpeltatis quinquelobis inciso-ferratis, caule erecto, petalis emarginatis. Lin. 954.

Hinter Päppeln.

Geranium triste. Riu.

Geranium (*triste*) calycibus monophyllis sessilibus, scapis bifidis monophyllis. Lin. 950.

Geranium africanum maximum. Riu.

Geranium (*cucullatum*) calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis, caule fruticoso. Lin. 946.

In den Gärten, im Junio und Auguſt.

*) Mit einer zehnfächerigen Saamen-Kapſel.

Linum ſatiuum. C. Bauh.

Linum (*vſitatiſſimum* β.) calycibus capſulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario. Linn. 397.

Flachs, Lein.

Linum ſylueſtre coeruleum, perenne erectius, flore et capitulo maiore. Rai.

Linum (*perenne*) calycibus capſulisque obtuſiuſculis, foliis alternis lanceolatis integerrimis. Linn. 397.

In den Gärten.

Linum pratenſe floſculoſis exiguis. C. Bauh.

Linum (*catharticum*) foliis oppoſitis quato-lanceolatis,

Digitized by Google

latis, caule dichotomo, corollis acutis. Linn. 401.

An den Wiesen bey dem Haynberge.

f) Mit einer vielkämmerigen Samen-Kapsel.

Caltha paluſtris flore ſimplici. C. Bauh.

Caltha *paluſtris*. Linn. 784.

Caltha flore pleno. C. Bauh.

Caltha *paluſtris* γ. Linn. 784.

Wieſenblume, Dotterblume. Auf dem Haynberge, und nach dem Unterhauſe zu.

5.

Mit einer Frucht oder Beere.

a) Mit einer einkernigen Frucht.

Prunus ſatiua vulgaris. Rupp. Pruna magna, craſſa ſubacida. C. Bauh.

Prunus (*domeſtica hungarica*) pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolato-ouatis conuolutis, ramis muticis. Linn. 680.

Pflaumen, Quetſchen.

Pruna magna dulcia atrocoerulea. C. Bauh.

Prunus *domeſtica Damaſcena* β. Linn. ib.

Pruna magna, rubra rotunda. C. Bauh.

Prunus *domeſtica Acinaria* η. Linn. ib.

Pruna rotunda, flaua, dulcia, mali magnitudine. C. Bauh.

Prunus *domeſtica maliformis* δ. Linn. ib.

Mirabellen.

Pruna

Pruna coloris cerae ex candido in luteum pallescentis. C. Bauh.

Prunus *domestica cerea* ζ. Linn. Sp. ib.

Spillinge.

Pruna Augusto maturescentia, minora et austeriora. C. Bauh.

Prunus *domestica Augustana* ι. Linn. ib.

Pruna parua praecocia. C. Bauh.

Prunus *domestica praecox* κ. Linn. ib.

Haberpflaumen.

Prunus fructu rotundo minore, nigro purpureo, dulci. C. Bauh.

Prunus *domestica myrabolana.* ξ. Linn. ib.

Mirabellen.

Prunus sylvestris. C. Bauh.

Prunus (*Spinosa*) pedunculis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. Linn. 681.

Schwarzdorn, Schlehen.

Pruna sylvestria, praecocia. C. Bauh.

Prunus (*insititia*) pedunculis geminis, foliis ouatis subtus villosis conuolutis, ramis spinescentibus. Lin. 680.

Haberschlehen.

Armeniaca fructu maiore, nucleo amaro. Tournef. Mala armeniaca maiora. C. Bauh.

Prunus (*Armeniaca*) floribus sessilibus, foliis subcordatis. Linn. 679.

Apricosen.

Persica molli carne et vulgaris, viridis et alba. C. Bauh.

Amygdalus (*persica*) foliorum serraturis omnibus acutis, floribus sessilibus solitariis. Linn. 676.

Pfirschen.

Nuci-

Digitized by Google

Nuciperſica, quae nucum iuglandium faciem repraeſentat. C. Bauh.

Amygdalus *perſica* β. Linn. ib.

Kleine glatte Nußpfirſche.

Amygdalus ſatiua. C. Bauh.

Amygdalus (*communis*) foliis, ſerraturis infimis glandulosis, floribus ſeſſilibus geminis. Linn. 677.

Mandelbaum. In Mindings Garten.

Amygdalus (*nana*) foliis petiolatis, baſi attenuatis. Linn. Spec. 677.

Im Freißlebiſchen Garten. Blüht mit vorhergehenden im April und May.

Ceraſa ſatiua, rotunda, rubra et acida. C. Bauh.

Prunus (*ceraſus caproniana* α.) floribus ſubſeſſilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis glabris. Linn. 679.

Saure rothe Kirſchen.

Ceraſus hortenſis flore pleno. C. Bauh.

Prunus *ceraſus plena* γ. Lin.

Ceraſa ſatiua maiora. C. Bauh.

Prunus *ceraſus bigarella* ν. Linn. ib.

Weichſel-Kirſchen.

Ceraſa acidiſſima, ſanguineo ſucco. C. Bauh.

Prunus *ceraſus auſtera* η. Linn. ib.

Amerellen.

Ceraſa carne tenera et aquoſa. C. Bauh.

Prunus *ceraſus Iuliana* ε. Linn. ib.

Ammern.

Ceraſa alba dulcia. C. Bauh.

Prunus *ceraſus dulcis.* δ. Linn. ib.

Weiße ſüſſe Herzkirſchen.

Digitized by Google

Cerasus maior et sylvestris, fructu subdulci, nigro inficiente. C. Bauh.

Prunus (*avium*) umbellis sessilibus, foliis ouato-lanceolatis conduplicatis subtus pubescentibus. Lin. 680.

Süsse schwarze Kirschen.

Padus germanica folio deciduo. Rupp. Cerasus racemosa, sylvestris, fructu non eduli. C. Bauh.

Prunus (*Padus*) floribus racemosis, foliis deciduis basi subtus biglandulosis. Linn. 677.

Teutscher Kirschlorbeer-Baum, Traubel-Kirschen. Am Bache nach Scheiben, Großdorf und Nextenitz, wie auch im Grunde nach Schmelle.

Padus exotica, folio amplo, crasso, semperuirente Rupp. Cerasus folio laurino. C. Bauh.

Prunus (*Laurocerasus*) floribus racemosis, foliis semperuirentibus, dorso biglandulosis. Linn. 678.

Kirsch-Lorbeerbaum. In den Gärten.

Sumach Arabum et officinarum. Rupp. Rhus folio Vlmi. C. Bauh.

Rhus (*coriaria*) foliis pinnatis obtusiusculè serratis, oualibus subtus villosis. Linn. 379.

Färber-Baum, Hirschhorn-Baum. Blüht im May.

b) Mit einer zweykernigen Frucht.

Crataegus folio laciniato. Tournefort. Mespilus Apii folio, sylvestris non spinosa, siue Sorbus torminalis. C. Bauh.

Crataegus (*torminalis*) foliis cordatis septangulis, lobis infimis diuaricatis, Linn. 681.

Wilder Sperberbaum, Arlsbeeren. Blüht im May und Junio.

Digitized by Google

c) Mit einer dreikernigen Frucht.

Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo. C. Bauh.

Rhamnus (*Paliurus*) aculeis geminatis, inferiore reflexo, floribus trigynis. Linn. 281.

Chriſtdorn. Blüht im May, in den Gärten.

Oxyacantha vulgaris. Rupp. Meſpilus Apii folio laciniato. C. Bauh.

Crataegus (*Oxyacantha*) foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. Linn. 683.

Weißdorn, Mehldorn, Mehlfeiſtgen. Blüht im May.

Cotoneaſter folio rotundo non ſerrato. C. Bauh.

Meſpilus (*Cotoneaſter*) inermis, foliis ouatis integerrimis. Linn. 686.

Bey Arnſtadt.

d) Mit einer vierkernigen Frucht.

Vitis vinifera. C. Bauh.

Vitis (*vinifera*) foliis lobatis ſinuatis nudis. Linn. ib.

Wein.

Vitis folio Apii. I. Bauh.

Vitis (*laciniosa*) foliis quinatis, foliolis multifidis. Linn. 293.

Peterſilien-Wein. Blüht im Junio und Julio.

Vitis apiana. C. Bauh.

Muskateller-Trauben.

Vitis ſubhirſuta. C. Bauh.

Gutedel. Varietäten.

Meſpilus germanica, folio laurino, non ſerrato, ſiue Meſpilus ſylueſtris. C. Bauh.

Meſpilus (*germanica*) inermis, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, floribus ſeſſilibus ſolitariis. Linn. 684.

Miſpeln. Blühn im May.

Meſpi-

Digitized by Google

Mespilus alpina, folio vlni lanato maior. Rupp.

Mespilus (*Amelanchier*) inermis, foliis oualibus serratis, cauliculis hirsutis. Linn. 685.

Wilder Mispel. Bey Ronneburg, und Gotha auf dem Enselsberge.

e) Mit einer vielkernigen Frucht.

Rosa rubra simplex s. saturatius rubens. C. Bauh.

Rosa (*gallica*) germinibus ouatis pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. Linn. 704.

Essigrosen, Zuckerrosen. Blühn im May und Junio.

Rosa maxima multiplex. C. Bauh.

Rosa (*centifolia*) germinibus ouatis pedunculisque hispidis, caule hispido aculeato, petiolis inermibus. Linn. 704.

Centifolien-Rose.

Rosa alba vulgaris maior. C. Bauh.

Rosa (*alba*) germinibus ouatis glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. Linn. 705.

Ist auch gefüllt.

Rosa rubello flore, paruo simplici non spinosa. I. Bauh.

Rosa (*Alpina*) germinibus globosis, pedunculis subhispidis, caule inermi. Lin. 703.

Kleine Zuckerrosen, an Schreibers Garten.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato. C. Bauh.

Rosa (*canina*) germinibus ouatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis. Linn. 704.

Gemeine wilde Rose, Hecken-Rose.

Rosa sylvestris, foliis odoratis. C. Bauh.

Rosa (*Eglanteria*) germinibus globosis pedunculisque

que glabris, caule aculeis ſparſis rectis, petiolis ſcabris, foliolis acutis. Lin. 703.

Weinroſe.

Roſa campeſtris ſpinoſiſſima, flore albo odorato. C. Bauh.

Roſa (*ſpinoſiſſima*) germinibus ouatis glabris, pedunculis caule petiolisque aculeatiſſimis. Linn. 705.

Erd-Feld- oder Haber-Roſen.

Roſa ſylueſtris pomifera maior. C. Bauh.

Roſa (*villoſa*) germinibus globoſis aculeatis, pedunculis hiſpidis, caule aculeis ſparſis, petiolis aculeatis, foliis tomentoſis. Linn. 704.

Roſe mit großen Hahnbutten.

Roſa lutea ſimplex. C. Bauh.

Roſa lutea multiplex. C. Bauh.

Roſa (*lutea*) caule aculeato, foliis pinnatis, foliolis ouatis ſerratis vtrinque glabris, pedunculis breuiſſimis. Miller.

Gelbe Roſen.

Roſa ſanguiſorbae maioris folio, fructu longe pendulo. Dillenius.

Roſa (*pendulina*) germinibus ouatis glabris, pedunculis cauleque hiſpidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. Linn. Spec. 705.

Die hangende Roſe aus Neu-England. Blühet im May und Junio.

Sorbus ſatiua. C. Bauh.

Sorbus (*domeſtica*) foliis pinnatis ſubtus villoſis. Linn. 684.

Spierling, Sperberbaum. In den Gärten.

Sorbus aucuparia. I. Bauh.

Sorbus

Digitized by Google

Sorbus (*aucuparia*) foliis pinnatis vtrinque glabris. Linn. 683.

Quitschbeeren. Blüht im May und Junio.

Cydonia fructu breuiore et rotundiore. Tournefort.

Pyrus (*Cydonia*) foliis integerrimis, floribus solitariis. Linn. 687.

Quittenbäume. Bey Langenberg, auf dem Hausberge. Blühn im May und Junio.

Pyrus Sylueſtris. C. Bauh.

Pyrus (*communis Pyraſter*) foliis ſerratis, pedunculis corymboſis. Linn. 686.

Wilder Birnbaum.

Pyrus Bergamotta Gallis. I. Bauh.

Pyrus *communis ſalerna*. Linn. ib.

Bergamotte.

Pyrus boni Chriſtiani. I. Bauh.

Pyrus communis Pompeiana. Linn. ib.

Bon Chretien.

Pyrus carne rubente. v. Munchhauſen.

La Sanguinole. Duhamel.

Blutbirn, mit einem rothen Marke.

Von mehrern Varietäten ſehe man den dritten Theil des Hausvaters. S. 258.

Mala ſylueſtris. C. Bauh.

Pyrus (*Malus ſylueſtris*) foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus. Linn. 686.

Holzäpfel-Baum.

Malus pumila, quae potius frutex, quam arbor. C. Bauh.

Pyrus Malus paradiſiaca. Linn. 686.

Johannis-Aepfel.

Mala ſatiua fructu magno intenſe rubente, violae odorae. Tournef.

Digitized by Google

Pyrus malus cauillea. Lin. 686.

Mehrere Varietäten ſ. Hausvaters dritten Theil S. 309.

Aurantia malus. I. Bauh. Malus Aurantia maior. C. Bauh.

Citrus (*Aurantium*) petiolis alatis. Linn. Spec. 1100.

Pomeranzen.

Malus aurantia cortice eduli. C. Bauh.

Citrus *Aurantium ſinenſis*. Linn. 1101.

Appelſinen.

Malus aurantia fructu rotundo maximo palleſcente, caput humanum excedente. Sloane.

Citrus *Aurantium* decumana. Linn. 1101.

Pumpelmus.

Citreum vulgare. Tournefort. Malus medica. C. Bauh.

Citrus (*medica*) petiolis linearibus. Linn. Spec. 1100.

Citronen-Baum.

Myrtus Boetica latifolia et anguſtifolia. C. Bauh.

Myrtus (*communis boetica*) floribus ſolitariis in volucro diphyllo. Linn. 673.

Myrten-Baum.

Myrtus minor vulgaris. C. Bauh.

Myrtus *communis tarentina*. Linn. ib.

Blüht auch oft gefüllt.

Myrtus foliis minimis et mucronatis. C. Bauh.

Myrtus *communis mucronata*. Linn. 674.

Myrtus folio argenteo.

Eine Spielart. Blühen im Julio und Auguſt.

Cucu-

Digitized by Google

Cucubalus. Tournefortii. Alſine ſcandens baccifera. C. Bauh.

Cucubalus (*bacciferus*) calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis diuarieatis. Linn. 591.

Groſſer Hühnerdarm mit Beeren.

Rubus vulgaris, ſiue Rubus fructu nigro. C. Bauh.

Rubus (*fruticoſus*) foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis. Linn. 707.

Brombeer-Staude, Krazbeere. Blühen im May und Junio.

Rubus vulgaris maior fructu albo. Rai.

Weiſſe Brombeere.

Rubus flore albo pleno. Magnol.

Gefüllte Brombeere. Varietäten der erſtern.

Rubus idaeus ſpinoſus. C. Bauh.

Rubus (*Idaeus*) foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. Linn. 706.

Gemeine Himbeeren.

Rubus idaeus fructu albo. C. Bauh.

Rubus *Idaeus* β. Linn. ib.

Weiſſe Himbeere.

Rubus idaeus laeuis. C. Bauh.

Rubus *Idaeus* γ. Linn. ib.

Himbeeren ohne Stacheln. Sind Varietäten.

Rubus alpinus humilis. I. Bauh. Chamaerubus ſaxatilis. C. Bauh.

Rubus (*Saxatilis*) foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus herbaceis. 708.

Steinbeere, Boksbeere. Bey Burkersdorf und Schmölle.

Rubus repens fructu Caeſio. C. Bauh.

Digitized by Google

Rubus (*caesius*) foliis ternatis subnudis, lateribus pilosis, caule tereti aculeato. Linn. 706.

Blaue Kraffelbeere, kriechende blaue Brombeere, Fuchsbeere. An der Ronneburger Höhe, und bey dem Steinbruche.

Phytolacca americana, maiore fructu. Tournefort.

Phytolacca (*decandra*) floribus decandris decagynis. Linn. 631.

Im Geinsischen Garten, im Juni und August.

Sechste Klasse.

Gewächse mit einer gleichförmigen sechsblätterigen Blume.

I.

Mit einer einfachen Saamen-Kapsel.

Gramen hirsutum capitulis Psyllii. C. Bauh.

Iuncus (*campestris*) foliis planis subpilosis, spicis sessilibus pedunculatisque. Linn. 468.

Feldkrötengras. Blüht im April, am Hayn berge.

Gramen hirsutum capitulo globoso. C. Bauh.

Iuncus campestris γ. Linn.

Im Walde bey Päppeln.

Gramen hirsutum angustifolium maius. C. Bauh.

Iuncus (*pilosus* ε.) foliis planis pilosis, corymbo ramoso. Linn. ib.

Haariges Krötengras.

Gra-

Digitized by Google

Gramen hirſutum latifolium minus. C. Bauh.

Iuncus *piloſus* ζ. Linn. ib.

Gramen hirſutum latifolium maximum iuncea ranicula. Moris.

Iuncus *piloſus* δ. Linn. ib.

Gramen nemoroſum, calyculis paleaceis, erectum. Scheuchzer.

Iuncus (*bufonius*) culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus. Linn. 466.

Kriechendes Kröten-Gras.

Gramen iunceum foliis et ſpica iunci. C. Bauh.

Iuncus (*Squarroſus*) culmo nudo foliis ſetaceis, capitulis glomeratis aphyllis. Lin. 465.

Schuppichtes Kröten-Gras.

Iuncus acutus panicula ſparſa. C. Bauh.

Iuncus (*filiformis* γ.) culmo nudo, apice membranaceo incuruo, panicula laterali. Linn. Sp. 464.

Nach Dieſchiz.

Iuncus laeuis, panicula ſparſa maior. C. Bauh.

Iuncus (*effuſus* β.) culmo nudo ſtricto, panicula laterali. Linn. 464.

Buſch Kröten-Gras.

Iuncus laeuis panicula non ſparſa. C. Bauh.

Iuncus (*conglomeratus*) culmo nudo ſtricto, capitulo laterali. Linn. 464.

Knopf-Krötengras.

Iuncus foliis articuloſis, floribus umbellatis. Tournefort.

Iuncus (*articulatus*) foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. Linn. 465.

Gegliedertes Krötengras.

2.

Mit einer zweikämmerigen Saamen-Kapsel.

Salicaria vulgaris, purpurea, foliis oblongis. Tournef.
Lysimachia spicata purpurea. C. Bauh.
Lythrum (*salicaria*) foliis oppositis cordato-lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. Linn. 640.
Rother Weiderich. Blüht im Julio und Augusi, am Mühlgraben und am Haynberge.

3.

Mit einer dreikämmerigen Saamen-Kapsel.

Lilium album flore erecto, vulgare. C. Bauh.
Lilium (*candidum*) foliis sparsis, corollis campanulatis, intus glabris. Linn. 433.
Weisse Lilie. Blüht im Julio, in den Gärten.
Lilium purpureo-croceum maius. C. Bauh.
Lilium (*bulbiferum*) foliis sparsis, corollis campanulatis erectis, intus scabris. Linn. ib.
Feuer-Lilien.
Martagon syluaticum. Rupp. Lilium floribus reflexis montanum, flore rubente. C. Bauh.
Lilium (*Martagon*) foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis reuolutis. Linn. 435.
Martagon, Türkischer Bund, Goldwurz. Man findet sie auch gefüllt, aber selten.
Martagon orientale, flore miniato. Rupp. Lilium Byzantinum, miniatum. C. Bauh.
Lilium (*Chalcedonicum*) foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis reuolutis. Linn. 434.
Im Geimsischen Garten.
Corona imperialis. Dodon. Fritilaria (*imperialis*) race-

Digitized by Google

racemo comoso inferne nudo, foliis integerrimis. Linn. 435.

Kaiser-Krone.

Corona imperialis folio vario. Tournef.

Corona imperialis flore pulchre luteo. Tournef.

Sind Varietäten.

Fritilaria praecox, purpurea, variegata. C. Bauh.

Fritilaria (*Meleagris*) caule subunifloro, foliis omnibus alternis. Linn. 436.

Blüht im April und May.

Tulipa praecox lutea. C. Bauh.

Tulipa (*gesneriana*) flore erecto, foliis ouato-lanceolatis. Linn. 438.

In den Gärten mit unzähligen Abänderungen von Farben.

Dens canis, latiore rotundioreque folio, flore ex purpureo rubente. C. Bauh.

Erythronium *Dens canis*. Linn. 437.

Blüht im April, in den Gärten.

Ornithogalum luteum minus. C. Bauh.

Ornithogalum (*minimum*) scapo angulato diphyllo, pedunculis vmbellatis ramosis. Linn. 440.

Ackerzwiebel. Auf den Feldern und in Weinbergen.

Ornithogalum medium, vmbellatum, angustifolium. C. Bauh.

Ornithogalum (*vmbellatum*) floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, filamentis emarginatis. Linn. 441.

In Grasgärten.

Ornithogalum angustifolium maius, floribus ex albo virescentibus. C. Bauh.

Ornithogalum (*pyrenaicum*) racemo longissimo, fila-

Digitized by Google

filamentis lanceolatis, pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis. Linn. Sp. 440.

In den Gärten.

Ornithogalum lusitanicum latifolium, flore coeruleo. Tournef. Hyacinthus indicus bulbosus stellatus. C. Bauh.

Scilla (*peruuiana*) corymbo conferto conico. Linn. 442.

Sternhyacinthe. Blüht mit jenem im May und Junio.

Scilla vulgaris radice rubra. C. Bauh.

Scilla (*maritima*) nudiflora, bracteis refractis. Linn. 442.

Meerzwiebel. In den Gärten.

Asphodelus luteus, flore et radice. C. Bauh.

Asphodelus (*luteus*) caule filoso, foliis triquetris striatis. Linn. 443.

Phalangium paruo flore, non ramosum. C. Bauh.

Anthericum (*Liliago*) foliis planis, scapo simplicissimo, corollis planis, pistillo declinato. Linn. 445.

Blüht im Junio, am Zutzberge ohnweit der Brücke.

Phalangium paruo flore, ramosum. C. Bauh.

Anthericum (*ramosum*) foliis planis, scapo ramoso, corollis planis, pistillo recto. Linn. ib.

Bey Arnstadt in den Weinbergen, und hier in den Gärten.

Leucoium bulbosum vulgare. C. Bauh.

Leucoium (*vernum*) spatha vniflora, stylo clauato. Linn. 414.

Schneeglökgen. Am Haynberge und im Buschholze nach Dieschit.

Leuco-

Digitized by Google

Leucoium ſerotinum multiflorum. Rupp. Leucoium bulboſum maius, ſeu multiflorum. C. Bauh.

Leucoium (*aeſtiuum*) ſpatha multiflora, ſtylo clauato. Lin. 414.

Blüht im May. In den Gärten.

Leucoium hortenſe minus. Rupp. Leucoium bulboſum, trifolium minus. C. Bauh.

Galanthus *niualis*. Linn. 413.

Blüht im Februar und Merz.

Allium latifolium liliflorum. Tournefort. Moly latifolium liliflorum. C. Bauh.

Allium (*magicum*) caule planifolio vmbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus. Linn. 424.

Blüht im May. In den Gärten.

Allium latifolium luteum. Tournef. Moly latifolium luteum odore allii. C. Bauh.

Allium (*Moly*) ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, vmbella faſtigiata. Linn. 432.

Allium ſylueſtre latifolium. C. Bauh.

Allium (*vrſinum*) ſcapo nudo ſemicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, vmbella faſtigiata. Linn. 431.

Im Walde am Haynberge.

Allium ſatiuum. C. Bauh.

Allium (*ſatiuum*) caule planifolio bulbifero, bulbo compoſito, ſtaminibus tricuſpidatis. Linn. 425.

Knoblauch. Blüht im Junio und Julio.

Allium ſatiuum alterum ſ. Alliopraſum caulis ſummo circumuoluto. C. Bauh.

Allium (*Scorodopraſum* β.) caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis, vaginis ancipitibus, ſtaminibus tricuſpidatis. Linn. 425.

Schlan-

Digitized by Google

Schlangen-Knoblauch, mit jenen in den Gärten.

Allium sylueſtre, campeſtre, purpuraſcens. C. Bauh.

Allium (*vineale*) caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuspidatis. Linn. 428.

Allium montanum bicorne anguſtifolium, flore dilute purpuraſcente. C. Bauh.

Allium (*carinatum*) caule planifolio bulbifero, ſtaminibus ſubulatis. Linn. 426.

In den Weinbergen.

Porrum ſectiuum iuncifolium. C. Bauh.

Allium (*Schoenopraſum*) ſcapo nudo folio adaequante, foliis teretibus, ſubulato-filiformibus. Linn. 432.

Schnittlauch. Blüht im Junio.

Cepa vulgaris floribus et tunicis purpuraſcentibus. C. Bauh.

Allium (*Cepa*) ſcapo nudo inferne ventricoſo, longiore, foliis ventricoſis. Linn. 431.

Zwiebel.

Cepa vulgaris, floribus et tunicis candidis. C. Bauh.

Eine Varietät.

Cepa oblonga. C. Bauh.

Allium (*fiſtuloſum*) ſcapo nudo folio adaequante, foliis teretibus ventricoſis. Linn. 432.

Winter-Zwiebeln.

Cepa aſcalonica, Matthioli. Moris.

Allium (*aſcalonicum*) ſcapo nudo tereti, foliis ſubulatis, vmbella globoſa, ſtaminibus triſcupidatis. Linn. 429.

Schalotten, Eſchlauch.

Veratrum flore ferragineo. Rupp. Helleborus albus flore atrorubente. C. Bauh.

Ve-

Digitized by Google

Veratrum (*nigrum*) racemo compoſito, corollis patentiſſimis. Linn. 1479.

Weißs Nießwurz. Blüht im Julio in den Gärten

Yucca foliis aloes. C. Bauh.

Yucca (*glorioſa*) foliis integerrimis. Linn. 456.

4.

Mit einer vielkämmerigen Saamen-Kapſel.

Butomus flore roſeo. Tournefort. Iuncus floridus maior. C. Bauh.

Butomus *vmbellatus*. Linn. 532.

Blüht im Julio und Auguſt, an ſumpfigen Oertern.

5.

Mit einer Beere.

Berberis officinarum. Rupp. Berberis dumetorum. C. Bauh.

Berberis (*vulgaris*) pedunculis racemoſis. Linn. 471.

Berberisbeere, Sauerdorn, Erbſelbeere. Bey Koldiz am Berge.

Aſparagus ſatiuus. C. Bauh.

Aſparagus (*officinalis altilis*) caule herbaceo erecto, foliis ſetaceis, ſtipulis duabus interioribus, vna exteriore. Linn. 448.

Spargel.

Laurus alexandrina, fructu folio inſidente. C. Bauh.

Ruſcus latifolius fructu folio innaſcente. Tournef.

Ruſcus (*Hypophyllum*) foliis ſubtus floriferis nudis. Lin. 1474.

In

Digitized by Google

In den Gärten.

Smilax aſpera fructu rubente. C. Bauh.

Smilax (*aſpera*) caule aculeato-angulato, foliis dentato-aculeatis cordatis nouemneruiis. Linn. 1458.

Stechende Winde. In den Gärten.

Hedera arborea. C. Bauh.

Hedera (*Helix*) foliis ouatis, lobatisque. Linn. 292.

Epheu. Am Steinbruche, und nach Köſtriz.

Siebente Klaſſe.

Gewächſe mit einer gleichförmigen vielblätterigen Blume.

I.

Mit unbedeckten Saamen.

Adonis montanus perennis, flore amplo, luteo. Rupp. Helleborus niger, tenuifolius Buphthalmi flore. C. Bauh.

Adonis (*vernalis*) flore dodecapetalo, fructu ouato. Linn. 771.

Blüht im May, im Freißlebiſchen Garten.

Adonis ſylueſtris, flore phoeniceo, eiusque foliis longioribus. C. Bauh.

Adonis (*aeſtiualis*) floribus pentapetalis, fructibus ouatis. Lin. 771.

Adonisrößlein, Teufelsaugen. Im Junio.

Adonis ſylueſtris, flore pallido, eiusque foliis longioribus. C. Bauh.

Eine

Digitized by Google

Eine Varietät von iener.

Ficaria vulgaris Rupp. Ranunculus vernus rotundifolius maior. Tournef.

Ranunculus (*Ficaria*) foliis cordatis angulatis, petiolatis. Linn. 774.

Scharbok, klein Schölkraut. Blüht im April. Man findet es in den Gärten auch gefüllt.

Hepatica flore simplici coeruleo. Rupp. Trifolium hepaticum, flore simplici et pleno. C. Bauh.

Anemone (*hepatica*) foliis trilobis integerrimis. Linn. 758.

Leberkraut, Güldenklee. Nach Dieschiz am Buschholze, und hinter dem Schlosse. Blüht im Merz und April. Man findet sie weiß, roth und auch gefüllt.

Anemone nemorosa, flore maiore. C. Bauh.

Anemone (*nemorosa*) seminibus acutis, foliolis incisis, caule vnifloro. Linn. 762.

Wilde Anemonen. Im Walde und Wiese über der Elster. Blüht im April.

Ranunculus nemorosus luteus. C. Bauh.

Anemone (*ranunculoides*) seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro. Linn. 762.

Bey dem Erdfalle am Wassergraben.

Anemone, geranii rotundo folio, purpurascens. C. Bauh.

Anemone (*hortensis*) foliis digitatis. Linn. 761.

In den Gärten, mit verschiedenen Farben.

Anemone tenuifolia, multiplex rubra. C. Bauh.

Anemone (*coronaria* β.) foliis radicalibus, ternato-decompositis, inuolucro folioso. Linn. Spec. 760.

Pulsatilla folio crassiore et maiore flore. C. Bauh.

Digitized by Google

Anemone (*pulsatilla*) pedunculo inuolucrato, petalis rectis. foliis bipinnatis. Linn. 759.

Küchenschelle, Osterblume. Bey Arnstadt und Schönkleine.

Filipendula vulgaris. C. Bauh.

Spiraea (*filipendula*) foliis pinnatis, foliolis vniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis. Linn. 702.

Rother Steinbrech. Bey Arnstadt.

Filipendula flore albo pleno.

Eine Varietät. Blüht mit iener im Junio und Julio.

2.

Mit bedekten Saamen.

a) Mit einer vielkämmerigen Kapsel.

Paeonia, folio nigricante splendido, quae mas. C. Bauh.

Paeonia (*officinalis mascula β.*) foliolis oblongis. Linn. 747.

Päonien, Gicht-Pfingstrose u.

Paeonia communis seu foemina. C. Bauh.

Paeonia foliis difformiter lobatis v. Haller. Helu.

Paeonia (*officinalis foemina α.* Linn. Sp. 747.

Blüht mit iener im May, in den Gärten.

Nymphaea alba maior. C. Bauh.

Nymphaea (*alba*) foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. Linn. 729.

Wasserlilien, Seerosen, Seeblumen. Im Junio und Julio, bey Frießnitz im großen Teiche.

Nymphaea lutea maior. C. Bauh.

Nymphaea (*lutea*) foliis cordatis integerrimis, calyce petalis maiore pentaphyllo. Linn. 729.

Trollius. Rupp.

Trol-

Digitized by Google

Trollius (*europaeus*) corollis conniuentibus, nectariis longitudine ſtaminum. Linn. 782.

Blüht im Junio und Julio.

Aconitum vnifolium luteum bulboſum. C. Bauh.

Helleborus (*hyemalis*) flore folio inſidente. Linn. 783.

Nießwurz. Im Merz.

Helleborus niger flore roſeo. C. Bauh.

Helleborus (*niger*) ſcapo ſub-vnifloro ſubnudo, foliis pedatis. Linn. ib.

Schwarze Nießwurz.

Helleborus niger hortenſis flore viridi. C. Bauh.

Helleborus (*viridis*) caule multifloro folioſo, foliis digitatis. Linn. 784.

Helleborus niger foetidus. C. Bauh.

Helleborus (*foetidus*) caule multifloro folioſo, foliis pedatis. Linn. ib.

Mit jenen in den Gärten, im Februar, Merz und April.

Nigella aruenſis cornuta. C. Bauh.

Nigella (*aruenſis*) piſtillis quinis, petalis integris, capſulis turbinatis. Linn. 753.

Blüht im Junio. Wilder Schwarzkümmel.

Nigella anguſtifolia flore maiore ſimplici coeruleo. C. Bauh. Nigella flore maiore, pleno, coeruleo, C. Bauh.

Nigella (*Damaſcena*) floribus inuolucro folioſo cinctis. Linn. 753.

Schwarzkümmel.

Nigella flore minore ſimplici candido. C. Bauh.

Nigella (*ſatiua*) piſtillis quinis, capſulis muricatis ſubrotundis, foliis ſubpilofis. Linn. ib.

Auf den Feldern.

Aquilegia ſylueſtris. C. Bauh.

Aquilegia (*vulgaris*) nectariis incuruis. Linn. Spec. 752.

An dem Hausberge bey Langenberg. Blüht im May und Junio.

Aquilegia hortenſis.

Aquilegia *vulgaris* β. γ. δ. ε. ζ. Linn. ib.

Akelei. In den Gärten.

Aquilegia praecox canadenſis, flore externo rubicundo, medio luteo. Moriſon.

Aquilegia (*canadenſis*) nectariis rectis, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. ib.

In den Gärten.

Semperuiuum arboreſcens. Rupp. Sedum maius arboreſcens floſculis candidis. C. Bauh.

Semperuiuum (*arboreum*) caule arboreſcente, lacui ramoſo. Linn. 664.

In den Gärten.

Semperuiuum tectorum maius. Rupp. Sedum maius vulgare. C. Bauh.

Semperuiuum (*tectorum*) foliis ciliatis, propaginibus patentibus. Linn. ib.

Blüht im Junio und Julio, bey Weida.

Semperuiuum alpinum, foliis tomentoſis filamentis obductis. Rupp. Sedum montanum tomentoſum. C. Bauh.

Semperuiuum (*arachnoideum*) foliis pilis intertextis, propaginibus globoſis. Linn. 665.

Blüht im Julio und Auguſt, in den Gärten.

Digitized by Google

3.

Mit einer weichen Frucht.

Malus punica, ſatiua ſeu ſylueſtris. C. Bauh.

Punica (*Granatum*) foliis lanceolatis, caule arboreo. Linn. 676.

Blüht im Junio und Julio in den Gärten. Granat-Aepfelbaum.

Punica flore pleno maiore. C. Bauh.

Punica Granatum β. Linn. ib.

Ficus indica, folio ſpinoſo, fructu maiore. C. Bauh.

Cactus (*Opuntia*) articulato-prolifer laxus articulis ouatis, ſpinis ſetaceis. Linn. 669.

Indianiſche Feigen.

Melocactus indiae occidentalis. C. Bauh. Echino-Melocactus Cluſii.

Cactus (*Melocactus*) ſubrotundus quatuordecim angularis. Linn. 666.

Im Geimſiſchen Garten.

Granadilla Rupp. Clematis trifolia flore roſeo elauato. C. Bauh.

Paſſiflora (*incarnata*) foliis trilobis ſerratis. Linn. 1360.

Paſſions-Blume.

Granadilla folio tricuſpidi, flore paruo, flaueſcente. Tournef.

Paſſiflora (*lutea*) foliis trilobis cordatis aequalibus obtuſis glabris integerrimis. Linn. 1358.

Mit iener im Gräflichen Garten.

Digitized by Google

Achte Klasse

Gewächse mit einer gleichförmigen zusammengesezten Blume.

I.

Mit röhrigten und geschweiften Blüthgen.

a) Mit Saamen ohne Haarkrone.

Helenium indicum maximum. C. Bauh. Corona Solis. Tabern.

Helianthus (*annuus*) foliis omnibus cordatis; trineruatis, floribus cernuis. Linn. 1276.

Sonnenblume.

Helenium indicum ramosum. C. Bauh.

Helianthus (*multiflorus*) foliis inferioribus cordatis trineruatis, superioribus ouatis. Linn. 1277.

Blüht mit jenen im August in den Gärten.

Helenium indicum tuberosum. C. Bauh.

Helianthus (*tuberosus*) foliis ouato-cordatis, triplineruiis. Linn. 1277.

Erdapfel, Erdbirn. Blüht im Oktober.

Corona solis altissima, virgae aureae foliis. Tournef.

Buphthalmum (*Helianthoides*) calycibus foliosis, foliis ouatis serratis triplineruiis, caule herbaceo. Linn. 1275.

Blüht im August, in den Gärten.

Asteriscus foliis ad florem rigidis. Tournef.

Buphthalmum (*spinosum*) calycibus acute foliosis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis, caule herbaceo. Linn. 1274.

Blüht

Digitized by Google

Blüht im May und Junio in den Gärten.

Corona ſolis foliis anguſtioribus laciniatis. Tournef.

Rudbeckia (*laciniata*) foliis compoſitis laciniatis. Linn. 1279.

Blüht im Auguſt und September in den Gärten.

Verbeſina foliis tripartito diuiſis. Rupp.

Bidens (*tripartita*) foliis trifidis, calycibus ſubfoliosis, ſeminibus erectis. Linn. 1165.

Blüht im Julio und Auguſt, am Waſſergraben der Gräflichen Wieſe.

Verbeſina, ſemine bi-vel tridentato, folio integro Rupp.

Bidens (*cernua*) foliis lanceolatis amplexi-caulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. Lin. 1165.

In den Gräben.

Verbeſina Curaſſauica, Hieracii folio, caule alato. Rupp.

Verbeſina (*alata*) foliis alternis decurrentibus vndulatis, obtuſis. Linn. 1270.

In den Gärten.

Chryſanthemum foliis Matricariae. C. Bauh.

Chryſanthemum (*coronarium*) foliis pinnatifidis inciſis extrorſum latioribus. Linn. 1254.

Goldblume. Man findet ſie ſowohl gelb, als weiß und auch gefüllt, in den Gärten.

Chryſanthemum aruenſe, folio glauco dentato. Rupp. Bellis lutea foliis profunde inciſis maior. C. Bauh.

Chryſanthemum (*ſegetum*) foliis amplexicaulibus, ſuperne laciniatis, inferne dentato ſerratis. Linn. Spec. 1254.

Blüht im Julio, bey Nordhauſen und Heringen.

Leucanthemum vulgare. Tournef. Bellis ſyluestris caule folioſo maior. C. Bauh.

Digitized by Google

Chryſanthemum (*Leucanthemum*) foliis amplexicaulibus oblongis, ſuperne ſerratis, inferne dentatis. Linn. 1251.

Blühet im Junio und Julio, auf den Wieſen.

Leucanthemum ſyluaticum, Tanaceti folio, ſemine vmbilicato, flore maiore. Rupp. Tanacetum montanum inodorum, flore maiore. C. Bauh.

Chryſanthemum (*corymboſum β.*) foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro. Linn. 1251.

Bey Pforten am Berge.

Leucanthemum ſyluaticum, Tanaceti folio, ſem. vmbilicoto, fl. minore. Rupp.

Chryſanthemum *corymboſum α.* Linn.

Buphthalmum Tanaceti minoris folio. C. Bauh.

Anthemis (*tinctoria*) foliis bipinnatis ſerratis, ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. Linn. 1263.

Ochſen-Auge, Rinds-Auge. Bey hieſigen Kalkbrüchen, bey Roſchiz an der hohen Fahrſtraſſe. Blüht im Julio und Auguſt.

Pyrethrum flore bellidis. C. Bauh.

Anthemis (*Pyrethrum*) caulibus ſymplicibus vnifloris decumbentibus, foliis pinnato multifidis. Linn. 1262.

Bertramwurz, Zahnwurz. Blüht hier in den Gärten.

Calendula officinalis Tragi. Caltha vulgaris. C. Bauh.

Calendula (*officinalis*) feminibus corymbiformibus muricatis incuruatis omnibus. Linn. 1308.

Ringelblumen.

Calendula prolifera. Tabernaem.

Calendula officinalis δ. Linn. ib.

Calendula minor aruenſis. Rupp. Caltha aruenſis. C. Bauh.

Calendula (*aruenſis*) feminibus cymbiformibus muricatis.

Digitized by Google

ficatis, incuruatis, extimis erectis protenſis. Linn. 1303.

In den Gärten.

Calendula africana, flore intus albo, foris violaceo. Tournefort.

Calendula (*pluuialis*) foliis lanceolatis ſinuato-denticulatis, caule folioſo, pedunculis filiformibus. Linn. Spec. 1304.

In den Gärten. Blüht mit jenen im Junio, Julio und Auguſt.

Bellis ſylueſtris minor. C. Bauh.

Bellis (*perennis*) ſcapo nudo. Linn. Spec. 1248.

Gänſeblümgen. Man findet ſie mit weiſſen und rothen Blümgen.

Bellis hortenſis flore pleno. C. Bauh.

Bellis hortenſis prolifera. C. Bauh.

Bellis *perennis hortenſis*. β. ε. Linn.

Blühen in den Gärten.

Bellis hortenſis rubra, flore multiplici fiſtuloſo. Tournefort.

Bellis *perennis hortenſis* δ. Linn.

Matricaria vulgaris ſeu ſatiua. C. Bauh.

Matricaria (*Parthenium*) foliis compoſitis planis, foliolis ouatis inciſis, pedunculis ramoſis. Linn. 1255.

Mutter-Kraut. Blüht im Julio und Auguſt.

Matricaria flore pleno. C. Bauh.

Eine Varietät.

Chamaemelum vulgare ſeu Leucanthemum Dioſcoridis. C. Bauh.

Matricaria (*Chamomilla*) receptaculis conicis, radiis patentibus, feminibus nudis, ſqamis calycinis margine aequalibus. Linn. 1256.

Digitized by Google

Chamillen. Blühen im Junio und Julio.

Chaemaemelum nobile seu Leucanthemum odoratius. C. Bauh.

Anthemis (*nobilis*) foliis pinnato-compositis linearibus acutis subuillosis. Linn. 1260.

Römische Chamillen. Blühen auch gefüllt.

Chamaemelum inodorum. C. Bauh.

Anthemis (*aruensis*) receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. Linn. Spec. 1261.

Chamaemelum foetidum. C. Bauh.

Anthemis (*cotula*) receptaculis conicis, paleis setaceis, seminibus coronato-marginatis. Lin. 1261.

Auf den Aeckern.

Millefolium vulgare album. C. Bauh.

Achillea (*millefolium*) foliis bipinnatis nudis, lacinis linearibus dentatis, caulibus sulcatis, Linn. 1267.

Schaafgarbe. Blüht im Julio und Augusi.

Millefolium purpureum maius. C. Bauh.

Achillea *millefolium* β. Linn.

In den Gärten.

Millefolium tomentosum luteum. C. Bauh.

Acillea (*tomentosa*) foliis pinnatis hirsutis, pinnis linearibus dentatis. Linn. 1264.

Millefolium orientale, foliis tanaceti incanis, radiis pallide luteis. Boerhaaue.

Achillea (*pubescens*) foliis pinnatis, foliolis lanceolatis incisis-serratis subtus lanigeris. Linn. 1264.

In den Gärten.

Millefolium nobile Tragi.

Achillea (*nobilis*) foliis bipinnatis, inferioribus nudis planis, superioribus obtusis tomentosis, corymbis conuexis confertissimis. Linn. 1268.

Bey Nordhausen und Eckartsberge sehr häufig.

Ptar-

Digitized by Google

Ptarmica vulgaris, folio longo ſerrato, flore albo. I. Bauh.

Achillea (*Ptarmica*) foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis. Linn. 1266.

Weiſſer Dorand. Am Haynberge.

Ptarmica vulgaris, flore pleno. Cluſii.

Achillea *Ptarmica* β. Linn.

Ptarmica lutea ſuaueolens, Tournefort. Ageratum foliis ſerratis. C. Bauh.

Achillea (*ageratum*) foliis lanceolatis obtuſis, acute ſerratis. Linn. 1264.

In den Gärten,

b) Mit Saamen mit Federkronen.

Helenium vulgare. C. Bauh.

Inula (*Helenium*) foliis amplexicaulibus ouatis rugoſis, ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ouatis. Lin. 236.

Alant. Blühet im Auguſt.

Doronicum officinarum. Rupp. Doronicum radice ſcorpii. C. Bauh.

Doronicum (*pardalianches* β.) foliis cordatis obtuſis denticulatis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. Lin. 1247.

Gemſenwurz.

Arnica Schroederi. Rupp. Doronicum plantaginis folio alterum. C. Bauh.

Arnica (*montana*) foliis ouatis integris, caulinis geminis oppoſitis. Linn. 1245.

Johannisblume, Johanniskraut, Mutterwurz, Wollverley. Bey Oberpölnitz, und groſſen Ebersdorf. Blüht im Junio und Julio.

Tuſſilago vulgaris. C. Bauh.

Tuſſilago (*Farfara*) ſcapo imbricato vaifloro, foliis

liis ſubcordatis angulatis denticulatis. Linn. 1214.

Huflattich. Im Martins-Grunde, Steinbruche und Haynberge Blüht im Merz und April.

Iacobaea vulgaris laciniata. C. Bauh.

Senecio (*Iacobaea*) corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. Linn. 1219.

Kröten-Kraut. Blüht im Junio und Julio.

Iacobaea paluſtris, altiſſima, foliis ſerratis. Tournef.

Senecio (*paludoſus*) corollis radiantibus, foliis enſiformibus acuteſerratis, ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. Linn. 1220.

Bey Roſchitz.

Iacobaea ſenecionis folio incano, perennis, Raii. Rupp. tab. 4.

Senecio (*ſylvaticus*) corollis reuolutis, foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. Linn. 1217.

Iacobaea viſcoſa et hirſuta. Rupp. Senecio incanus pinguis. C. Bauh.

Senecio (*viſcoſus*) corollis reuolutis, foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calycinis laxis longitudine perianthii. Linn. 1217.

In den Weinbergen und ungebauten Orten.

Iacobaea africana fruteſcens, flore amplo purpureo elegantiſſimo, ſenecionis folio. Volkammer.

Senecio (*elegans*) corollis radiantibus, foliis pinnatifidis aequalibus patentiſſimis, rachi inferne anguſtata. Linn. 1218.

In den Gärten.

Iacobaea maritima. C. Bauh.

Cineraria (*maritima*) floribus paniculatis, foliis pinna-

Digitized by Google

pinnatifidis tomentoſis, laciniis ſinuatis, caule fruteſcente. Linn. 1244.

Im Gräflichen und Geimſiſchen Garten.

After atticus coeruleus vulgaris. C. Bauh.

After (*Amellus*) foliis lanceolatis obtuſis ſcabris trineruiis integris, pedunculis nudiuſculis corymboſis, ſquamis calycinis obtuſis. Linn. 1226.

Aſter. Blüht im Auguſt und September, bey Schönkleine.

After nouae Angliae altiſſimus hirſutus, floribus omnium maximis, purpureo-violaceis. Tournefort.

After (*nouae Angliae*) foliis lanceolatis alternis integerrimis ſemi-amplexicaulibus, floribus terminalibus, caule hiſpido. Linn. 1229.

Im Geimſiſchen und andern Gärten.

After annuus ramoſus albus latifoliis canadenſis. Moriſon.

After (*annuus*) foliis ouatis inferioribus crenatis, caule corymboſo, pedunculis nudis, calycibus haemiſphaericis. Linn. 1229.

In den Gärten.

After aruenſis coeruleus acris. Rupp. Ruga Wedelii. Conyza coerulea acris. C. Bauh.

Erigeron (*acre*) pedunculis alternis vniſloris. Linn. 1211.

An den Mauren.

After virginianus ramoſiſſimus ſerotinus paruis floribus albis tradeſcanti. Moriſon.

After (*Tradeſcanti*) foliis lanceolato-linearibus medio ſerratis. pedunculis folioſis, caule racemoſo, calycibus erectis. Linn. 1230.

In den Gärten.

After luteus, hirſuto ſalicis folio. C. Bauh.

Inula (*hirta*) foliis ſeſſilibus lanceolatis recuruatis ſub-

Digitized by Google

ſubſerrato ſcabris, floribus inferioribus altioribus, caule teretiuſculo ſubpiloſo. Lin. 1239.

Am Gräflichen Garten und bey Köſtritz.

Aſter montanus, luteus, ſalicis glabro folio. C. Bauh.

Inula (*Salicina*) foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſerrato-ſcabris, floribus inferioribus altioribus, ramis ſubangulatis glabris. Linn. 1238.

Am Rande des hohen Fahrweges.

Aſter pratenſis autumnalis, Conyzae folio. Tournef.

Inula (*dyſenterica*) foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, ſubtomentoſis, caule villoſo paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis. Linn. 1237.

An der Elſter.

Aſter paluſtris paruo flore globoſo. Tournefort.

Inula (*pulicaria*) foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis. Linn. Sp. 1238.

Bey Klein-Ebersdorf.

Virga aurea latifolia ſerrata. C. Bauh.

Solidago (*Virga aurea*) caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis, confertis. Linn. 1235.

Gülden-Wundkraut. Blüht im Auguſt und September, am Pförtner- und Haynberge.

Virgo aurea canadenſis, hirſuta floribus exiguis, copioſiſſimis. Rupp.

Solidago (*altiſſima*) paniculato-corymboſa, racemis recurvis, floribus adſcendentibus, floribus enervibus ſerratis. Linn. Spec. 1233.

In den Gärten.

Cyanus orientalis maior, moſchatus flore purpureo et albo. Moriſon.

Centaurea (*moſchata*) calycibus inermibus ſubrotundis glabris, ſquamis ouatis, foliis lyrato-dentatis. Linn. 1286.

Viel

Bieſamknopf, ausländiſche Kornblume. Blüht im Julio und Auguſt, in den Gärten.

Cyanus montanus, latifolius, vel Verbaſculum cyanoides. C. Bauh.

Centaurea (*montana*) calycibus ſerratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule ſimpliciſſimo. Linn. 1289.

Cyanus ſegetum. C. Bauh.

Centaurea (*Cyanus*) calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. Linn. 1289.

Blaue Kornblume.

Iacea nigra pratenſis latifolia. C. Bauh.

Centaurea (*Iacea*) calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. Linn. 1293.

Flokblume.

Iacea latifolia, capite hirſuto. C. Bauh.

Centaurea (*phrygia*) calycibus recuruato-plumoſis, foliis indiuiſis. Linn. Spec. 1287.

Auf den Wieſen nach dem Geraiſchen Schloſſe.

Iacea vulgaris, laciniata, flore purpureo. Tournef. Scabioſa maior, ſquamatis capitulis. C. Bauh.

Centaurea (*ſcabioſa*) calycibus margine ciliatis, foliis pinnatifidis, pinnis lanceolatis. Linn. 1291.

Scabioſe. Auf den Aeckern.

Iacea lutea, capite ſpinoſo maiori. C. Bauh.

Calcitrapa ſiue ſolſtitialis flore luteo, caule alato. Rupp.

Centaurea (*collina*) calycibus ciliatis, foliis bipinnatifidis, pinnis lanceolatis. Linn. 1298.

In den Gärten.

Digitized by Google

2.

Mit bloſſen röhrigten Blüthgen.

a) Der Saamen mit Haarkronen.

Carduus lanceolatus, latifolius. C. Bauh.

Carduus (*lanceolatus*) foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis; laciniis diuaricatis, calycibus quatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. Linn. 1149.

Sperr-Diſtel. Am Fahrwege nach Dienz. Blüht im Junio und Julio.

Carduus caule criſpo. I. Bauh.

Carduus (*criſpus*) foliis decurrentibus ſinuatis, margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus inermibus. Linn. 1150.

Bey Milden Pfort, nach Weyde, man findet ſie mit gelber Blüthe, ſonſt aber auch roth, weiß und fleiſchfarben.

Carduus nutans. I. Bauh.

Carduus (*nutans*) foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis, ſquamis calycinis ſuperne patentibus. Linn. 1150.

Carduus acanthoides. I. Bauh.

Carduus (*acanthoides*) foliis decurrentibus ſinuatis, margine ſpinoſis, calycibus pedunculatis ſolitariis erectis villoſis. Linn. 1150.

An der Elſter unter den Weiden.

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. C. Bauh.
Carduus mariae officinarum. Dalech.

Carduus (*marianus*) foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. Linn. 1153.

Mariendiſtel.

Cirſium ſingularibus capitulis paruis. C. Bauh.

Car-

Digitized by Google

Carduus (*defloratus*) foliis decurrentibus lanceolatis ſerratis, ſubſpinoſo-ciliatis nudis, pedunculis longiſſimis, lanuginoſis vnifloris. Lin. 1152.

Auf dem Haynberge.

Cirſium pratenſe, Aſphodeli radice, latifolium. Tournef.

Carduus (*tuberoſus*) foliis petiolatis ſubdecurrentibus, ſubpinnatifidis ſpinoſis, caule inermi, floribus ſolitariis. Linn. 1154.

Cirſium pratenſe polycephalum vulgare. Tournefort.

Carduus (*paluſtris*) foliis decurrentibus dentatis, margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. Linn. 1155.

Cirſium acaulos, flore purpureo. Tournef.

Carduus (*acaulis*) calyce glabro. Lin. 1156.

Blühen im Junio, Julio und Auguſt.

Carduus tomentoſus, Acanthi folio, vulgaris. Tournefort.

Onopordum (*acanthium*) calycibus ſquarroſis, ſpinis ſubulatis, foliis ouato-oblongis ſinuatis. Linn. 1158.

An den Wegen.

Cinara hortenſis, foliis non aculeatis. C. Bauh.

Cynara (*Scolymus γ.*) foliis ſubſpinoſis pinnatis indiuiſisque, calycinis ſquamis ouatis. Linn. 1159.

Artiſchoken.

Cinara hortenſis aculeata. C. Bauh.

Cynara (*Scolymus β.*) Linn. ib.

Centaureum maius folio in lacinias plures diuiſo. C. Bauh.

Centaurea (*centaurium*) calycibus inermibus, ſquamis ouatis, foliis pinnatis, foliolis decurrentibus glabris. Linn. 1287.

Digitized by Google

Großes Tausendgüldenkraut; Blüht im August.

Cnicus sylvestris hirsutior, siue *Carduus benedictus*. C. Bauh.

Centaurea (*benedicta*) calycibus duplicato-spinosis, lanatis inuolucratis, foliis semidecurrentibus, denticulato-spinosis. Lin. 1296.

Cardobenedictenkraut. Blüht im August.

Serratula syluatica. Rupp.

Serratula (*tinctoria*) foliis lyrato-pinnatifidis, pinna terminali maxima, floſculis conformibus. Linn. 1144.

Schartenkraut, Färberröthe.

Lappa et Bardana officinarum. Rupp.

Arctium (*Lappa*) foliis cordatis inermibus petiolatis. Linn. 1143.

Klette. Blüht im August.

Lappa maior montana, capitulis tomentosis. C. Bauh.

Arctium (*Lappa* β.) Linn.

Cnicus pratensis, Acanthi folio, flore flauescente. Tournef.

Cnicus (*Oleraceus*) foliis pinnatifidis carinatis nudis, bracteis subcoloratis integris concauis. Lin. 1156.

Wiesenkohl. Bey Dienz, und auf den Wiesen der Schmelzhütte.

Cnicus pratensis, Acanthi folio, flore purpureo. C. Bauh.

Eine Varietät.

Atractylis lutea. C. Bauh.

Carthamus (*lanatus*) caule pilosō, superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis. Linn. 1163.

In den Gärten.

Petal.

Digitized by Google

Petasites maior et vulgaris. C. Bauh.

Tussilago (*petasites*) thyrso ouato, flosculis omnibus hermaphroditis. Linn. 1215.

Pestilenzwurz, grosser Huflattig. Bey Dienz; Blühn im May und Junio.

Petasites flore minore elatior. Rupp. Petasites floribus spicatis flosculis pauciflimis androgynis. v. Haller, Heluet.

Tussilago (*hybrida*) thyrso oblongo, flosculis femineis nudis plurimis. Lin. 1214.

Ebendaselbst.

Senecio minor, vulgaris. C. Bauh.

Senecio (*vulgaris*) corollis nudis, foliis pinnatosinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. Linn. 1216.

Kreutzwurz.

Eupatorium cannabinum. C. Bauh.

Eupatorium (*cannabinum*) foliis digitatis. Linn. 1173.

Kunigundkraut. Blüht im Junio, bey Scheiben Großdorf.

Eupatorium noüae Angliae, verticae foliis, floribus purpurascentibus, caule maculato. Morison.

Eupatorium (*maculatum*) foliis quinis subtomentosis, lanceolatis aequaliter serratis, venosis petiolatis. Lin. 1174.

In den Gärten.

Conyza maior, vulgaris. C. Bauh.

Conyza (*Squarrosa*) foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboso. Linn. 1205.

Dörrwurz. Am Pfortner Berge.

Conyza africana frutescens, foliis saluiae, odore camphore. Tournef.

Tarchonanthus (*camphoratus*). Linn. 1179.

Digitized by Google

Blüht im Julio, in den Gärten

Conyza linariae, folio. Tournefort.

Chryſocoma (*Linoſyris*) herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis. Linn. 1178.

Bey Weiſſenfels und Naumburg.

Elichryſum ſeu ſtoechas citrina, anguſtifolia. C. Bauh.

Gnaphalium (*Stoechas*) fruticoſum, foliis linearibus, ramis virgatis, corymbo compoſito. Linn. 1193.

In den Gärten.

Elichryſum ſeu Stoechas citrina latifolia. C. Bauh.

Gnaphalium (*arenarium*) herbaceum, foliis lanceolatis, inferioribus obtuſis, caule ſimpliciſſimo corymbo compoſito. Linn. 1195.

Blüht im Junio und Julio. Mattenkraut, Reinblume. Nach Köſtriz zu.

Elichryſum orientale. C. Bauh.

Gnaphalium (*orientale*) ſubherbaceum, foliis lineari lanceolatis, ſeſſilibus; corymbo compoſito, pedunculis elongatis. Linn. 1195.

In den Gärten.

Elichryſum americanum, latifolium, perianthco argenteo. Rupp.

Gnaphalium (*margaritaceum*) herbaceum, foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule ſuperne ramoſo, corymbis faſtigiatis. Linn. 1198.

Im Schreiberiſchen Garten.

Elichryſum ſpicatum. Tournefort. Gnaphalium maius, anguſto, oblongo folio, alterum. C. Bauh.

Gnaphalium (*ſyluaticum*) caule ſimpliciſſimo, floribus ſparſis. Linn. 1200.

Am Pfortner Berge.

Gnaphalium montanum flore rotundiore. C. Bauh.

Gnaphalium (*dioicum mas*) ſarmentis procumbentibus

bus caule simplicissimo, corymbo simplici terminali, floribus dioicis. Linn. 1199.

Katzenpfötgen. Blühen im May, am Haynberge.

Gnaphalium montanum, longiore et folio et flore. C. Bauh.

Gnaphalium *dioicum foemina*. Linn. ib.

Gnaphalium maius, lato oblongo folio. C. Bauh.

Gnaphalium (*luteo-album*) herbaceum, foliis semiamplexicaulibus ensiformibus, repandis obtusis, vtrinque pubescentibus, floribus conglomeratis. Linn. 1196.

Am Graizer Wege, ohnweit der neuen Schenke. Blüht im Junio und Julio.

Filago seu herba impia. Dodon. Gnaphalium vulgare maius. C. Bauh.

Filago (*germanica*) panicula dichotoma, floribus rotundatis, axillaribus hirsutis, foliis acutis. Lin. 1311.

Feldkätzgen, Engelblumen, Ruhrkraut. Blüht im Julio und August. Hinter dem Schlosse, im Buschholze.

Filago incana tomentosa erecta. Vaill. Gnaphalium maius angusto oblongo folio. C. Bauh.

Filago (*arvensis*) floribus conicis lateralibus, caule paniculato. Lin. 1312.

Am Mühlgraben, auf dem ausgeschlagenen Schlamme.

Filago minor. Ger. Emacul. Gnaphalium minus repens. C. Bauh.

Filago (*montana*) caule erecto diuiso, floribus conicis lateralibus axillaribus. Lin. 1311.

Auf den Aeckern und Holzschlägen des Stadtholzes.

Digitized by Google

b) Mit Saamen ohne Haarkronen.

Tanacetum vulgare luteum. C. Bauh.

Tanacetum (*vulgare*) foliis bipinnatis incisis serratis. Linn. 1184.

Reinfaren, Wurmfaren. Blüht im Julio und Auguſt, an der Elſter nach dem kleinen Wehre.

Tanacetum foliis criſpis. C. Bauh.

Tanacetum *vulgare criſpum*. Linn. ib.

Tanacetum hortenſe, foliis et odore Menthae. Hort. L. Bat.

Tanacetum (*balſamita*) foliis ouatis integris ſerratis. Linn. 1184.

Marienmünze. Blüht im Auguſt und September, in den Gärten.

Santolina foliis teretibus incanis. Tournefort. Abrotanum-foemina, foliis teretibus. C. Bauh.

Santalina (*Chamae Cypariſſus*) pedunculis vnifloris, foliis quadrifariam dentatis. Linn. 1179.

Santalina foliis obſcuro virentibus, flore ſulphurei coloris. Tournefort. Abrotanum foemina viridis. C. Bauh.

Santalina (*Roſmarinifolia*) pedunculis vnifloris, foliis linearibus, margine tuberculatis. Linn. Spec. 1180.

Im Geimſiſchen Garten.

Abrotanum mas anguſtifolium maius. C. Bauh.

Artemiſia (*Abrotanum*) foliis ramoſiſſimis ſetaceis, caule erecto ſuffruticoſo. Linn. Sp. 1185.

Stabwurz, Citronenkraut. In den Gärten.

Abrotanum campeſtre cauliculis albicantibus. C. Bauh.

Artemiſia (*campeſtris*) foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. Linn. ib.

Zwi-

Digitized by Google

Zwischen Zeitz und Begau an der Poststrasse. Blüht im Julio, Augusť und September.

Abrotanum lini folio acriore et odorato. Tournef.

Artemisia (*Dracunculus*) foliis lanceolatis glabris integerrimis. Linn. 1189.

Dragun, Keysers-Salat. In den Gärten.

Absinthium Ponticum seu romanum officinarum, siue Dioscoridis. C. Bauh.

Artemisia (*Absinthium*) foliis compositis multifidis, floribus subglobosis pendulis, receptaculo villoso. Linn. 1188.

Gemeiner Wermuth. Am Haynberge.

Absinthium Ponticum tenuifolium incanum. C. Bauh.

Artemisia (*pontica*) foliis multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo. Linn. 1187.

In den Gärten.

Absinthium arborescens, Lobelii.

Artemisia (*arborescens*) foliis compositis multifidis linearibus, floribus subglobosis, caule frutescente. Lin. 1188.

In den Gärten.

Artemisia vulgaris maior. C. Bauh.

Artemisia (*vulgaris*) foliis pinnatifidis planis incisis, subtus tomentosis, racemis simplicibus, floribus ouatis, radio quinquefloro. Linn. 1188.

Beyfuß. Man findet ihn von verschiedenen Farben.

Carduus sphaerocephalus latifolius vulgaris. C. Bauh.

Echinops (*Sphaerocephalus*) capitulis globosis, foliis pubescentibus. Linn. 1314.

Sperrdistel. Blüht im Julio und Augusť.

Carduus sphaerocephalus coeruleus minor. C. Bauh.

Digitized by Google

Echinops (*Ritro*) capitulo globoso, foliis supra glabris. Lin. 1314.

In den Gärten.

Carthamus officinarum, flore roseo. Tournefort.

Carthamus (*tinctorius*) foliis ouatis integris serrato aculeatis. Linn. 1162.

Saflor. Wird bey Erfurth häufig gebaut. Blüht im Julio und Auguſt.

Stoebe Riu. Iacea oleae folio, capitulis simplicibus. C. Bauh.

Xeranthemum (*annuum*) herbaceum, foliis lanceolatis patentibus, caule herbaceo. Lin. 1201.

Papierblume. In den Gärten.

Carlina acaulos magno flore albo. C. Bauh.

Carlina (*acaulis*) caule vnifloro, flore breuiore. Lin. 1160.

Eberwurz. Auf der Ronneburger Anhöhe an Zauffens Graben, und am Fußſteige nach Schippach.

Carlina sylueſtris vulgaris. Clus. Cnicus ſylueſtris ſpinoſior. C. Bauh.

Carlina (*vulgaris*) caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycibus radio albis. Lin. 1161.

Auf dem alten Markte. Blüht mit jenem im Auguſt.

3.

Zuſammengeſezte Blumen, aus bloſſen geſchweiſten Blümgen.

a) Wo der Saamen mit Haarkronen verſehen.

Dens leonis latiore folio. C. Bauh. Taraxacon officinarum.

Leonto-

Digitized by Google

Leontodon (*taraxacum*) calyce inferne reflexo, foliis runcinatis denticulatis laeuibus. Linn. 1122.

Löwenzahn. Blüht im April und May.

Dens leonis angustiore folio. C. Bauh.

Leontodon taraxacum β. L.

Auf der gräflichen Wiese, an der Elster.

Hieracium dentis Leonis folio hirsutie asperum magis laciniatum. C. Bauh.

Leontodon (*hirtum*) calyce toto erecto hispido, foliis dentatis hirtis, pilis simplicissimis. Lin. 1123.

Auf den Wiesen.

Hieracium, chondrillae folio glabro, radice succisa maius et minus. C. Bauh.

Leontodon (*autumnale*) caule ramoso, pedunculis squamosis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. Linn. 1123.

An grasigten Rändern.

Hieracium chondrillae folio hirsutum. C. Bauh.

Crepis (*tectorum*) foliis lanceolato runcinatis sessilibus laeuibus, inferioribus dentatis, caule glabro. Linn. 1135.

Groß Habichtkraut.

Hieracium Dentis leonis folio, flore suauerubente. C. Bauh.

Crepis (*rubra*) foliis amplexicaulibus lyrato runcinatis. Linn. 1132.

In den Gärten. Blüht im Junio.

Hieracium luteum, cichorei sylvestris folio, amygdalas amaras olens. Morison.

Crepis (*foetida*) foliis runcinato-pinnatis hirtis, petiolis dentatis. Linn. 1133.

An bergigten dürren Orten.

Digitized by Google

Hieracium aſperum maiore flore. I. Bauh. Cichorium pratenſe luteum, hirſutie aſperum. C. Bauh.

Picris (*Hieracioides*) perianthiis laxis, foliis integris. Linn. 1115.

Auf den Aeckern.

Hieracium echioides, capitulis Cardui benedicti. C. Bauh.

Picris (*echioides*) perianthiis exterioribus pentaphyllis, interiore ariſtato maioribus. Linn. 1114.

In den Gärten. Blühen alle im Junio, Julio und Auguſt.

Hieracium murorum, laciniatum minus piloſum. C. Bauh.

Hieracium (*murorum ſyluaticum*) caule ramoſo; foliis radicalibus ouatis dentatis; caulino minori. Linn. 1128.

Am Haynberge und Steinbruche.

Hieracium murorum, folio piloſiſſimo. C. Bauh.

Hieracium *murorum piloſiſſimum* Linn. ib.

Am Steinbruche und Brunnenhauſe.

Hieracium fruticoſum, anguſtifolium maius. C. Bauh.

Hieracium (*vmbellatum*) foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. Linn. 1131.

Bey Unterbundersdorf und Schmelle, auch am Haynberge.

Hieracium fruticoſum, latifolium, hirſutum. C. Bauh.

Hieracium (*Sabaudum*) caule erecto multifloro, foliis ouato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. Linn. 1131.

Am Haynberge.

Piloſella montana hiſpida paruo flore. C. Bauh.

Hieracium (*cymoſum*) foliis lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo, baſi piloſo, floribus ſubumbellatis. Lin. 1126.

Im

Digitized by Google

Im Mintingiſchen Hopfenberge, nach der Waſſerkunſt zu.

Piloſella peregrina flore ſaturate croceo. Rupp.

Hieracium (*Aurantium*) foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. Linn. 1126.

In den Gärten.

Piloſella repens maior hirſuta. C. Bauh. Piloſella officinarum. Rupp.

Hieracium (*Piloſella*) foliis integerrimis ouatis, ſubtus tomentoſis, caule repente ſcapo vnifloro. Linn. 1125.

Mausöhrgen, Nagelkraut.

Piloſella maior regens, minus hirſuta. C. Bauh.

Hieracium (*dubium*) foliis integris ouato-oblongis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro. Linn. 1125.

Blühen im Junio und Julio.

Hieracium alpinum, latifolium, maculatum, hirſutie incanum, flore magno. C. Bauh.

Hypochaeris (*maculata*). caule ſubnudo, ramo ſolitario, foliis ouato oblongis, integris dentatis. Linn. 1140.

In Buſchhölzern und Anhöhen.

Sonchus aſper laciniatus et non laciniatus. C. Bauh.

Sonchus (*oleraceus aſper*) pedunculis tomentoſis, calycibus glabris. Linn. 1117.

Gänſedieſtel, Saudieſtel. Im Rathsholze, nach Winſchen, Bernsdorf.

Sonchus laeuis, laciniatus latifolius. C. Bauh.

Sonchus *oleraceus laeuis* α. Linn. 1117.

Sonchus repens, multis Hieracium maius. I. Bauh.

Sonchus (*aruenſis*) pedunculis calycibusque hiſpidis,

Digitized by Google

dis, ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. Linn. 1116.

Auf den Aeckern.

Chondrilla coerulea altera, cichorii ſylueſtris folio. C. Bauh.

Lactuca (*perennis*) foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis ſurſum dentatis. Linn. 1120.

Blüht im Junio und Julio.

Chondrilla iuncea, viſcoſa, aruenſis. C. Bauh.

Chondrilla *iuncea*. Linn. 1120.

Lactuca ſylueſtris, coſta ſpinoſa. C. Bauh.

Lactuca (*ſcariola*) foliis verticalibus, carina aculeatis. Lin. 1119.

Hinter Pforten auf ſteinigten Aeckern.

Lactuca ſylueſtris altera, anguſto ſaligno folio, coſta albicante. Rupp. t. 4.

Lactuca (*ſaligna*) foliis haſtato linearibus, ſeſſilibus carina aculeatis. Linn. 1119.

Im Steinbruche ohnweit dem Bornhauſe. Blühen zuſammen im Junio und Julio.

Lactuca ſatiua. C. Bauh.

Lactuca (*ſatiua*) foliis rotundatis, caule corymboſo. Linn. 1118.

Salat, Forellen-Salat. Man hat verſchiedene Spielarten davon.

Scorzonera latifolia ſinuata. C. Bauh.

Scorzonera (*biſpanica*) caule ramoſo, foliis amplexicaulibus integris ſerratulis. Linn. 1112.

Scorzonerwurz, Schlangenmord.

Scorzonera latifolia humilis, neruoſa. C. Bauh.

Scorzonera (*humilis*) caule ſubnudo vnifloro, foliis neruoſis planis. Linn. ib.

Scorzonera foliis laciniatis. Tournefort.

Scorzonera (*laciniata*) foliis linearibus dentatis acutis,

Digitized by Google

acutis, caule erecto, squamis calycinis patulo-mucronatis. Linn. 1114.

Am Steinbruche bey der Ziegelscheune. Blühen im August.

Tragopogon pratense luteum, maius. C. Bauh.

Tragopogon (*pratense*) calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis. Linn. 1109.

Bokesbart. Blüht im Julio, auf den Wiesen und in Grasgärten.

Tragopogon purpureo-coeruleum, Porri folio, quod Artesi vulgo. C. Bauh.

Trapogon (*porrifolium*) calycibus corollae radio sesquilongioribus, foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis. Linn. 1110.

In den Gärten.

b) Mit Saamen ohne Haarkronen.

Cichorium sylvestre siue officinarum. C. Bauh.

Cichorium (*intybus*) floribus geminis sessilibus, foliis runcinatis. Linn. 1142.

Hindläufte, Wegwart. Man findet es sowohl mit blauer, weisser, als auch fleischfarbener Blüthe.

Cichorium satiuum. C. Bauh.

Ist blos eine Spielart, und unterscheidet sich wenig von iener.

Cichorium latifolium siue Endiuia vulgaris. C. Bauh. Tournef.

Cichorium (*Endiuia*) floribus solitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. Linn. ib.

Cichorium crispum. Tournefort. Endiuia crispa. C. Bauh.

Cichorium *Endiuia* β. Linn.

Endivien. Blüht mit ienem im Junio.

Lamps-

Digitized by Google

Lampſana. Dodon.

Lapſana (*communis*) calycibus fructu angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. Linn. 1141.

Haaſenkohl. Blüht im Julio und Auguſt.

Hieracium ſiliqua falcata. C. Bauh.

Lapſana (*ſtellata*) calycibus fructus vndique patentibus, radiis ſubulatis, foliis caulinis lanceolatis indiuiſis. Linn. 1141.

In den Gärten.

Hyoſeris latifolia. Rupp. Hieracium minus folio ſubrotundo. C. Bauh.

Hyoſeris (*minima*) caule diuiſo nudo, pedunculis incraſſatis. Linn. 1138.

Hinter dem Unterhauſe.

Scolymus Chryſanthemos. C. Bauh.

Scolymus (*hiſpanicus*) foliis margine incraſſatis. Linn. 1143.

Blüht im Auguſt, in den Gärten.

Oculus Chriſti, vulgo Hortulanorum. Rupp.

Inula (*Oculus Chriſti*) foliis amplexicaulibus oblongis, integris hirſutis, caule piloſo corymboſo, Linn. Sp. 1237.

Blüht im Julio.

Tagetes maximus rectus, flore ſimplici ex luteo pallido. I. Bauh.

Tagetes (*erecta α.*) caule ſimplici erecto, pedunculis nudis vnifloris. Linn. 1249.

Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato. I. Bauh.

Tagetes *erecta β.* Linn. 1250.

Studentenblume, Sammtblume.

Tagetes indicus, flore fiſtuloſo ſimplici. Hort. L. Bat.

Tage-

Digitized by Google

Tagetes *erecta* γ. Linn. ib.
Tagetes indicus minor, multiplicato flore. Tournef.
Tagetes (*patula* β.) caule ſubdiuiſo patulo. Linn. 1249.

Neunte Klaſſe.

Gewächſe mit einer vollkommenen ungleichförmigen einblätterigen Blüthe.

I.

Mit einem einzigen unbedeckten Saamen.

Valeriana maior, odorata radice. I. Bauh. Valeriana hortenſis. C. Bauh.
Valeriana (*Phu*) floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiuiſis. Linn. 45.
Baldrian, Katzenwurzel. Blüht im Junio und Julio.
Valeriana ſyluestris maior. C. Bauh.
Valeriana (*officinalis*) floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. Linn. ib.
Bey Stein Sare.
Valeriana paluſtris ſ. alpina minor. C. Bauh.
Valeriana (*dioica*) floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. Linn. Spec. 44.
Blüht im May und Junio. Bey Pforten.
Valeriana foliis calcitrapae. C. Bauh.
Valeriana (*calcitrapa*) floribus monandris, foliis pinnatifidis. Linn. ib.

In

In den Gärten.

Valeriana rubra. C. Bauh.

Valeriana (*rubra*) floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. Linn. 44.

Im Gräflichen und Kutschenbachischen Garten.

Valeriana campestris inodora, maior. C. Bauh. Locusta Riu.

Valeriana (*locusta olitoria*) floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. Linn. 47. α.

Rapünzgen, kleiner Baldrian.

Valerianella cornucopioides. Riuini. Valeriana peregrina purpurea, albaue. C. Bauh.

Valeriana (*cornucopiae*) floribus diandris ringentibus, foliis ouatis sessilibus. Linn. 44.

In den Gärten.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officinarum. C. Bauh.

Scabiosa (*aruensis*) corollulis quadrifidis radiantibus caule hispido, foliis pinnatifidis, lobis distantibus. Linn. 143.

Skabiosen. Man findet sie sowohl mit blauer, weisser, als gefüllter Blüthe. Am Pfortner Berge und bey Köldiz.

Scabiosa multifido folio, flore flauescente. C. Bauh.

Scabiosa (*ochroleuca*) corollulis quinquefidis radiantibus, foliis linearibus pinnatis; radicalibus bipinnatis, petiolis perfoliatis. Linn. 146.

Bey Koschwiz unter Köstriz, an der Fahrstraße.

Scabiosa capitulo globoso maior. C. Bauh.

Scabiosa (*columbaria*) corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Linn. 143.

Im Stadtholze.

Scabiosa stellata folio laciniato, maior. C. Bauh.

Scabiosa (*stellata*) corollulis quinquefidis, foliis dissectis,

Digitized by Google

dissectis, receptaculis florum subotundis. Linn. 144.

In den Gärten.

Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo. C. Bauh.

Scabiosa (*atropurpurea*) corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculis florum subulatis. Linn. 144.

In den Gärten.

Succisa glabra. C. Bauh. Succisa s. Morsus Diaboli. Camer.

Scabiosa (*succisa* β.) corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis integerrimis. Lin. 142.

Succisa hirsuta. C. Bauh.

Scabiosa succisa β. Lin.

Blüht mit vorhergehenden im August und September. Bey Päppeln und auf den Wiesen bey Frankenthal.

Globularia caule folioso, foliis ouatis integerrimis. v. Haller. Helv.

Bellis coerulea, caule folioso. C. Bauh.

Globularia (*vulgaris*) caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. Linn. 139.

Blaue Gänseblumen. Am Fahrwege, bey Päppeln. Blühen im August.

Dipsacus sativus. C. Bauh.

Dipsacus (*fullonum* β.) foliis sessilibus serratis. Lin. 140.

Karthen-Dieftel.

Dipsacus folio laciniato. C. Bauh.

Dipsacus (*laciniatus*) foliis connatis sinuatis. Linn. 141.

An der Fahrstraße, nach dem Unterhäuser Garten. Blüht im Julio und August.

Digitized by Google

Dipſacus ſylueſtris, capitulo minore, vel Virga paſtoris minor. C. Bauh.

Dipſacus (*piloſus*) foliis petiolatis, appendiculatis. Linn. 141.

Am Steinbruche nach Dieſchiz.

2.

Mit vier unbedekten Saamen.

Echium vulgare. C. Bauh.

Echium (*vulgare*) caule tuberculato-hiſpido, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus. Linn. 200.

Wilde Ochſenzunge. Am Kalchbruche bey der Ziegelſcheune, blüht weiß und roth.

Echioides flore coeruleo. Riuini. Buglossum minus ſylueſtre. C. Bauh.

Lycopſis (*aruenſis*) foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. Linn. 199.

Auf unbebauten Oertern. Blühen zuſammen im Junio, Julio und Auguſt.

Echioides flore pullo. Riuini.

Lycopſis (*veſicaria*) foliis integerrimis, caule proſtrato, calycibus fructeſcentibus inflatis pendulis. Linn. 198.

Bey Schönkleine. Blüht im Junio und Julio.

Lithoſpermum aruenſe radice rubra. C. Bauh. Echioides flore albo. Riuini.

Lithoſpermum (*aruenſe*) ſeminibus rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. Linn. 190.

Schminkwurz. Blüht im April und May.

Teucrium peregrinum, folio ſinuoſo. C. Bauh.

Teucrium (*fruticans*) foliis integerrimis oblongo-

ouatis

Digitized by Google

ouatis petiolatis, supra glabris, subtus tomentosis, pedunculis vnifloris. Linn. 787.

Blüht im Junio und Julio, in den Gärten.

Chamaedrys minor repens. C. Bauh.

Teucrium (*Chamaedrys* β.) foliis cuneiformi-ouatis incisis crenatis petiolatis, floribus subuerticillatis ternis petiolatis. Linn. 790.

Gamanderlein, Bergscordien. Bey Bürgel und Schönkleine.

Scordium C. Bauh.

Teucrium (*Scordium*) foliis oblongis sessilibus, dentato-serratis, floribus geminis lateralibus pedunculatis, caule diffuso. Linn. 790.

Scordien, Lachenknoblauch. Auf feuchten Wiesen und in Geims Garten.

Marum Cortusi. I. Bauh.

Teucrium (*marum*) foliis integerrimis ouatis subtus tomentosis, vtrinque acutis, racemis secundis calycibus villosis. Linn. 788.

Marum verum. In den Gärten.

Chamaepitys lutea vulgaris, seu folio trifido. C. Bauh.

Teucrium (*Chamaepitys*) foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis, caule diffuso. Linn. 787.

Schlagkraut, Erdkieser, Feldcypreß.

Aiuga folio integro. Riuini. Polium Lauendulae folio. C. Bauh.

Teucrium (*montanum*) corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis. Linn. Sp. 791.

Wilder Rosmarin, wilder Lavendel. Am Pfortner Berge und Steinbruche.

Iua moschata folio multifido. Riu. Botrys chamaedryoides. C. Bauh.

Digitized by Google

Teuerium (*Botrys*) foliis multifidis, pedunculis axillaribus ternis. Lin. 786.

Blüht im Junio und Julio am Pfortner Berge.

Ocymum latifolium maculatum et crispum. C. Bauh.

Ocymum (*Basilicum* γ.) foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis. Linn. 833.

Basilienkraut. Blüht mit jenen im Julio und Auguſt.

Ocymum minimum. C. Bauh.

Ocymum (*minimum*) foliis ouatis integerrimis. Linn. ib.

Horminum ſatiuum. C. Bauh.

Saluia (*horminum*) foliis obtuſis crenatis, bracteis ſummis ſterilibus, maioribus coloratis. Linn. 34.

Salbei. In den Gärten. Man findet es mit abwechſelnden Farben.

Horminum Sclarea dictum. C. Bauh.

Saluia (*Sclarea*) foliis rugoſis cordatis oblongis villoſis ſerratis, bracteis floralibus calyce longioribus concauis acuminatis. Linn. 38.

Muskatellerkraut, Scharlachkraut. In Geims Garten.

Horminum flore luteo. Riuini. Horminum luteum glutinoſum. C. Bauh.

Saluia (*glutinoſa*) foliis cordato-ſagittatis ſerratis acutis. Linn. 37.

In den Gärten.

Horminum pratenſe, foliis ſerratis. C. Bauh.

Saluia (*pratenſis*) foliis cordato-oblongis, ſummis amplexicaulibus, verticillis ſubnudis, corollis galea glutinoſis. Linn. 35.

Wilde Salbei. Am Haynberge, an dem Wege nach dem Unterhauſe, auch an der Roſchizer und Nonneburger Anhöhe. Blüht im Julio.

Saluia

Digitized by Google

Saluia maior. C. Bauh.

Saluia (*officinalis*) foliis lanceolato-ouatis integris, crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. Linn. 34.

Salbei. In den Gärten.

Phlomis Tournef. et Riuini. Verbaſcum anguſtis ſalniae foliis. C. Bauh.

Phlomis (*lychnitis*) foliis lanceolatis tomentoſis, floralibus ouatis, inuolucris ſetaceis lanatis. Linn. 819.

In den Gärten.

Caſſida paluſtris vulgatior, flore coeruleo. Tournef. Lyſimachia coerulea galericulata ſeu Gratiola coerulea. C. Bauh.

Scutellaria (*galericulata*) foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. Linn. 835.

Am Mühlgraben nach der Hausmühle, auch am Haynberge. Blüht im Julio und Auguſt.

Scutellaria latifolia flore minore. Riuini. Lamium peregrinum ſeu ſcutellaria. C. Bauh.

Scutellaria (*peregrina*) foliis ſubcordatis ſerratis, ſpicis elongatis ſecundis. Linn. 836.

In den Gärten.

Brunella maior folio non diſſecto. C. Bauh.

Prunella (*vulgaris*) foliis omnibus ouato oblongis petiolatis. Linn. 837.

Prunelle. Blüht im Julio, am Haynberge und in dem Grunde bey Päppeln.

Brunella coeruleo magno flore. C. Bauh.

Prunella vulgaris grandiflora β. Linn.

Am Unterhäuſer Berge und an der Straſſe nach Roſchiz.

Brunella folio laciniato. C. Bauh.

Digitized by Google

Prunella (*laciniata*) foliis ouato-oblongis petiolatis, ſupremis quatuor lanceolatis dentatis. Linn. ib.

Auf den Unterhäuſer Wieſen.

Galeopſis minor. Riuini. Lamium purpureum foetidum, folio ſubrotundo. C. Bauh.

Lamium (*purpureum*) foliis cordatis obtuſis petiolatis. Lin. 809.

Taube Neſſel. Auf den Feldern.

Galeopſis Riuini. Lamium purpureum non foetens, folio oblongo. C. Bauh.

Lamium (*laeuigatum*) foliis cordatis rugoſis, caule laeui, calycibus glabris, longitudine corollae. Lin. 808.

Blüht im May und Junio, am Kalkbruche bey der Ziegelſcheune.

Lamium album non foetens, folio oblongo. C. Bauh.

Lamium (*album*) foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis viginti floris. Linn. 809.

An graſigten Rändern.

Lamium, folio caulem ambiente, maius et minus. C. Bauh.

Lamium (*amplexicaule*) foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis. Linn. 809.

Auf den Aeckern und Wieſen.

Cedronella Riuini. Meliſſa peregrina folio oblongo. C. Bauh.

Dracocephalum (*Moldauica*) floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, ſerraturis capillaceis. Linn. 830.

Türkiſche Meliſſe. Blüht im Julio und Auguſt.

Cedronella canarienſis trifoliata odore camphorae. Rupp.

Dracocephalum (*canarienſe*) floribus ſpicatis, foliis compoſitis. Linn. 829.

In

In den Gärten.

Marrubium nigrum foetidum. C. Bauh. Ballote. Matthioli.

Ballota (*nigra*) foliis cordatis indiuiſis ſerratis, calycibus acuminatis. Linn. 814.

Schwarzer Andorn.

Cannabis ſpuria Riuin. Vrtica aculeata, foliis ſerratis. C. Bauh.

Galeopſis (*Tetrahit*) internodiis caulinis ſuperne incraſſatis, verticillis ſummis ſubcontiguis. Linn. 810.

Am Pfortner Wege und am Haynberge.

Cannabis ſpuria, flore maiore. Riuini.

Galeopſis *Tetrahit* β. Linn.

Große Taubeneſſel mit gelber Blume und rothen Barte. Am Haynberge und Scheibengroßdorf.

Ladanum ſegetum folio latiore. Riuin. Sideritis aruenſis anguſtifolia rubra. C. Bauh.

Galeopſis (*Ladanum*) internodiis caulinis aequalibus, verticillis omnibus remotis. Linn. 810.

Auf den Feldern.

Galeopſis ſiue Vrtica iners, flore luteo. I. Bauh. Lamium folio oblongo luteum. C. Bauh.

Galeopſis (*Galeobdolon*) verticillis ſexfloris, inuolucro tetraphyllo. Linn. 810.

Am Haynberge. Blüht mit jenen im Junio, Julio und Auguſt.

Stachys paluſtris foetida. C. Bauh.

Stachys (*paluſtris*) verticillis ſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemiamplexicaulibus. Linn. 811.

Im Walde und am Haynberge.

Sideritis flore albo, barba luteola Riu. Sideritis aruenſis, latifolia glabra. C. Bauh.

Digitized by Google

Stachys (*annua*) verticillis sexfloris, foliis ouato-lanceolatis trineruiis laeuibus petiolatis. Lin. 813.

Bey Schönkleine.

Stachys syluatica. Riuini. Lamium maximum syluaticum foetidum. C. Bauh.

Stachys (*Syluatica*) verticillis sexfloris, foliis cordatis petiolatis. Linn. 811.

Am Pfortner Berge und Steinbruche.

Stachys aruensis minima. Riu.

Stachys (*aruensis*) verticillis sexfloris, caule debili, foliis obtusis nudiusculis, corollis calyce vix longioribus. Lin. 814.

Stachys maior germanica. C. Bauh.

Stachys (*Germanica*) verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lanato. Linn. 812.

Am Haynberge.

Marrubium Cardiaca dictum. C. Bauh. Cardiaca. I. Bauh.

Leonurus (*Cardiaca*) foliis caulinis lanceolatis trilobis. Linn. 817.

Herzgespann, Wolfsfuß.

Leonurus perennis, africanus, sideritidis flore phoeniceo maiore. Breynii.

Phlomis (*Leonurus*) foliis lanceolatis serratis, involucris linearibus nudis, calycibus decagonis decemdentatis. Linn. 820.

In den Gärten.

Molucca Riuini. Melissa moluccana odorata. C. Bauh.

Moluccella (*laeuis*) calycibus campaniformibus subquinquedentatis, denticulis aequalibus. Linn. 821.

In den Gärten.

Marrubium album vulgare. C. Bauh.

Marrubium (*vulgare*) dentibus calycinis setaceis vncinatis. Lin. 816.

Weisser

Digitized by Google

Weiſſer Andorn. Bey den Kalkbrüchen und bey Pforten im Dorfe.

Pſeudodictamnus verticillatus inodorus. C. Bauh.

Marrubium (*Pſeudo-Dictamnus*) calycum limbis planis villoſis, foliis cordatis concauis, caule fruticoſo. Linn. 817.

Im Geimſiſchen Garten. Blüht mit jenen im Julio und Auguſt.

Mentha ſylueſtris, rotundiore folio. C. Bauh.

Mentha (*rotundifolia*) ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus. Linn. 805.

Bey dem Buchwerke.

Mentha ſylueſtris, folio longiore. C. Bauh.

Mentha (*ſylueſtris*) ſpicis oblongis tomentoſis, ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. Lin. 804.

Im Graben nach Cuba und Dientz.

Mentha aruenſis verticillata hirſuta. I. Bauh.

Mentha (*aruenſis*) floribus verticillatis, foliis ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam aequantibus. Linn. 806.

Auf hieſigen Feldern.

Mentha rotundifolia, criſpa, ſpicata. C. Bauh.

Mentha (*criſpa*) ſpicis capitatis, foliis cordatis dentatis vndulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corollam aequantibus. Linn. 805.

Krauſemünze. In den Gärten.

Mentha rotundifolia, paluſtris ſeu aquatica maior. C. Bauh.

Mentha (*aquatica*) ſpicis capitatis, foliis ouatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. Linn. 805.

Blühen alle im Julio und Auguſt.

Pulegium latifolium. C. Bauh.

Digitized by Google

Mentha (*Pulegium*) floribus verticillatis, foliis ouatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus. Linn. 807.

Poley.

Pulegium angustifolium. C. Bauh.

Mentha (*ceruina*) floribus verticillatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus. Linn. Sp. 807.

Blüht im Julio und Augusto.

Nepeta Riuini. Mentha cataria vulgaris et maior. C. Bauh.

Nepeta (*Cataria*) floribus spicatis, verticillis subpedicellatis, foliis petiolatis cordatis, dentato-serratis. Linn. 796.

Katzenmünze.

Lycopus. Hort. Cliffort. Marrubium palustre glabrum. C. Bauh.

Lycopus (*europaeus*) foliis sinuato serratis. Lin. 30.

In Wassergräben. Blüht im Julio und Augusto.

Betonica purpurea. C. Bauh.

Betonica (*officinalis*) spica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata. Linn. 819.

Betonien. Man findet sie auch weiß und rosenfarbig blühend. Bey Pappeln im Buschholze, auch im Genselischen und Geimsischen Garten.

Sideritis pratensis vulgatissima, sideritis foliis hirsutis profundo crenatis. C. Bauh.

Sideritis (*Scordioides*) foliis lanceolatis acutis dentatis, bracteis ouatis dentato-spinosis, calycibus aequalibus, spicis ouatis. Lin. 803.

Zeisgenkraut, Beruffkraut.

Bugula Dodon. Consolida media, pratensis coerulea. C. Bauh.

Aiuga

Digitized by Google

Aiuga (*reptans*) ſtolonibus reptantibus. Linn. 785.

Günzel. Bey Päppeln im Buſchholze. Blüht im May.

Bugula montana. Riuini. Bugula foliis anguloſe dentatis, caule ſimplici. v. Haller. Helu.

Aiuga (*pyramidalis*) tetragono-pyramidalis. Linn. Spec. ib.

Am Pfortner Berge.

Meliſſa hortenſis. C. Bauh. Meliſſa vulgaris odore Citri. I. Bauh.

Meliſſa (*officinalis*) racemis axillaribus verticillatis, pedicellis ſimplicibus. Linn. 827.

Meliſſe, Citronen-Meliſſe.

Calamintha vulgaris et officinarum Germaniae. C. Bauh.

Meliſſa (*Calamintha*) pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. Linn. 827.

Bergmünze, wilder Pokey.

Calamintha Pulegii odore, ſiue Nepeta. C. Bauh.

Meliſſa (*Nepeta*) pedunculis axillaribus dichotomis, folio longioribus, caule decumbente. Linn. 828.

Mit ienen in den Gärten.

Calamintha incana, Ocymi folio. C. Bauh.

Meliſſa (*cretica*) racemis terminalibus, pedunculis ſolitariis breuiſſimis. Linn. 828.

Blühen im Julio und Auguſt.

Meliſſophyllum. Riuini.

Lamium montanum, meliſſae folio. C. Bauh.

Melittis *meliſſophyllum* Linn. 832.

In den Gärten.

Clinopodium aruenſe, ocymi facie. C. Bauh.

Thymus (*acinos*) verticillis ſexfloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. Linn. 826.

Blüht

Digitized by Google

Blüht im Julio auf dem Steinersberge und der Nonneburger Anhöhe.

Thymus vulgaris folio latiore. C. Bauh.

Thymus (*vulgaris* β.) erectus, foliis reuolutis ouatis, floribus verticillato-ſpicatis. Linn. 825.

Thymian. In den Gärten.

Serpillum vulgare minus. C. Bauh.

Thymus (*Serpyllum*) floribus capitatis, caulibus decumbentibus, foliis planis obtuſis, baſi ciliatis. Linn. 825.

Quendel, Feldkümmel. Am Wege nach dem Martinsgrunde. Blüht im Junio und Julio.

Serpillum vulgare maius. C. Bauh.

Thymus *Serpyllum* β. Linn.

Serpillum foliis citri odore. C. Bauh.

Thymus *Serpyllum* ε. Linn.

Serpillum anguſtifolium hirſutum. C. Bauh.

Thymus *Serpyllum* δ. Linn.

Hedera terreſtris vulgaris. C. Bauh.

Glecoma (*hederacea*) foliis reniformibus crenatis. Linn. 807.

Gundermann, Donnerreben. Blüht im April und May, bey dem Fiſchhauſe und an den Zäunen.

Clinopodium Origano ſimile, elatius. C. Bauh.

Clinopodium (*vulgare*) capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. Linn. 821.

Wirbeldoſten. Bey Päppeln im Buſchholze. Blüht im Junio und Julio.

Roſmarinus hortenſis anguſtiore folio. C. Bauh.

Roſmarinus *officinalis*. Linn. 33.

Rosmarin. In den Gärten.

Satureia hortenſis. C. Bauh.

Satu-

Digitized by Google

Satureia (*hortenſis*) pedunculis bifloris. Linn. 795.
Satury.

Satureia montana. C. Bauh. Satureia perennis. Riu.
Satureia (*montana*) pedunculis dichotomis, lateralibus ſolitariis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis. Linn. 794.
In den Gärten.

Lauandula latifolia. C. Bauh.
Lauandula (*Spica β.*) foliis lanceolatis integerrimis, ſpicis nudis. Linn. 800.
Spike.

Lauandula anguſtifolia. C. Bauh.
Lauandula *Spica α.* Linn.
Lavendel.

Lauandula folio diſſecto. C. Bauh.
Lauandula (*multifida*) foliis duplicato-pinnatifidis. Linn. 800.

Stoechas folio ſerrato. C. Bauh.
Lauandula (*denſata*) foliis pinnato-dentatis. Linn. ib.

Stoechas purpurea. C. Bauh.
Lauandula (*Stoechas*) foliis lanceolato-linearibus, ſpica ramoſo. Linn. ib.
Mit vorhergehenden, in den Gärten.

Maiorana vulgaris. C. Bauh.
Origanum (*Maiorana*) foliis oualibus obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. Linn. 825.
Maioran. Blüht im Auguſt, in den Gärten.

Origanum ſylueſtre. C. Bauh.
Origanum (*vulgare*) ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis. Linn. 824.
Orant.

Origanum minus, folio variegato. Riu.

Verbena communis flore cœruleo. C. Bauh.

Verbe-

Digitized by Google

Verbena (*officinalis*) tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido laciniatis, caule ſolitario. Linn. 29.

Am Kalkbruche, und nach dem Unterhauſe zu. Blüht im Auguſt.

Hyſſopus officinarum coerulea ſ. ſpicata. C. Bauh.

Hyſſopus (*officinalis*) ſpicis ſecundis. Linn. Sp. 796.

Yſop mit blauen Blumen. Man findet ihn ſowohl weiß, als roth blühend.

3.

Mit bedekten Saamen.

und zwar

a) Mit einer einfachen Saamen-Kapſel.

Pinguicula. Geſneri. Cluſ.

Sanicula montana, flore calcari donato. C. Bauh.

Puinguicula (*vulgaris*) nectario cylindraceo, longitudine petali. Linn. 25.

Bey Arnſtadt nach der Käffenburg. Blüht im April und May.

Lentibularia Riuini. Millefolium aquaticum lenticulatum. C. Bauh.

Vtricularia (*vulgaris*) nectario conico, ſcapo pauciſloro. Linn. 26.

In ſtehenden Waſſern, als bey Schmiedels Teiche, im Graben nach dem Unterhäuſer Garten, wie auch bey Pforten. Blüht im Julio.

Orobanche maior, caryophyllum olens. C. Bauh.

Orobanche (*maior*) caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. Linn. 882.

Auf der Wieſe nach dem kleinen Wehre, an der Elſter. Blüht im May und Junio.

Oro-

Digitized by Google

Orobanche ramoſa. C. Bauh.

Orobanche (*ramoſa*) caule ramoſo, corollis quinquefidis. Linn. ib.

Bey Roda auf den ſandigten Aeckern, unter dem Hirſen.

Squamaria Riuini. Orobanche, radice dentata maior. C. Bauh. Dentaria maior. Matth.

Lathraea (*ſquamaria*) caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido. Linn. 844.

St. Georgenwurz, Schuppenwurz. Am Hayn-berge. Blüht im April.

b) Mit einer zweykämmerigen Saamen-Kapſel.

Melampyrum purpuraſcente coma. C. Bauh.

Melampyrum (*aruenſe*) ſpicis conicis laxis, bracteis dentato-ſetaceis. Linn. Sp. 842.

Wachtelweizen. Bey Rubitz, Gorkig und Oberpölnitz, auf den Aeckern. Blüht im Junio, Julio und Auguſt.

Melampyrum coma coerulea. C. Bauh.

Melampyrum (*nemoroſum*) floribus ſecundis lateralibus, bracteis dentatatis cordato-lanceolatis, ſummis coloratis ſterilibus, calycibus lanatis. Linn. 843.

Melampyrum luteum latifolium. C. Bauh.

Melampyrum (*pratenſe*) floribus ſecundis lateralibus coniugationibus remotis, corollis clauſis. Linn. Spec. ib.

Melampyrum luteum anguſtifolium. C. Bauh.

Melampyrum (*criſtatum*) ſpicis quadrangularibus, bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. Linn. 842.

Auf den Wieſen und in Wäldern.

Euphra-

Euphrasia pratensis rubra. C. Bauh.

Euphrasia (*odontites*) foliis linearibus, omnibus serratis. Linn. Sp. 841.

Blüht im Julio und August, auf den Aeckern nach Deschwiz.

Euphrasia officinarum. C. Bauh.

Euphrasia (*officinalis*) foliis ouatis argute dentatis. Linn. ib.

Augentrost. Auf den Wiesen nach der Wasserkunst, und dem Buchwerke.

Crista galli maior et elatior, calice floris hirsuto, rictus limbo violaceo. Rupp.

Rhinanthus (*crista-Galli γ.*) corollarum labio superiore compresso breuiore. Linn. 840.

Hahnenkamm. Blüht im August.

Crista galli pratensis humilior, coma fusca, calyce glabro. Rupp.

Rhinanthus crista galli *α.* Linn.

Pedicularis pratensis rubra elatior. Rai.

Pedicularis (*palustris*) caule ramoso, calycibus calloso-punctatis, corollis labio obliquis. Linn. 845.

Pedicularis humilior. Rupp. Pedicularis pratensis purpurea. C. Bauh.

Pedicularis (*syluatica*) caule ramoso, calycibus oblongis angulatis laeuibus, corollis labio cordato. Linn. ib.

Blühen im August, bey Pforten und Päppeln.

Scrophularia nodosa foetida. C. Bauh.

Scrophularia (*nodosa*) foliis cordatis trineruatis, caule acutangulo. Linn. 863.

Schwarzer Nachtschatten, Knotenkraut. Am Mühlgraben und der Elster.

Scro-

Digitized by Google

Scrophularia sambuci folio, flore magno et speciosо. Rupp. Scophularia foliis laciniatis. C. Bauh.

Scrophularia (*Sambucifolia*) foliis interrupte pinnatis cordatis inaequalibus, racemo terminali, pedunculis axillaribus geminis dichotomis. Linn. 865.

Im Geimfischen Garten.

Scrophularia folio vrticae. C. Bauh.

Scrophularia (*peregrina*) foliis cordatis, superioribus alternis, pedunculis axillaribus bifloris. Linn. 866.

In den Gärten.

Scrophularia aquatica maior. C. Bauh.

Scrophularia (*aquatica*) foliis cordatis petiolatis decurrentibus obtusis, caule membranis angulato, racemis terminalibus. Lin. 864.

Blüht mit jenen im May, Junio und Julio, an Bächen.

Acanthus sativus seu mollis Virgilii. C. Bauh.

Acanthus (*mollis*) foliis sinuatis inermibus. Linn. Sp. 891.

Acanthus aculeatus. C. Bauh.

Acanthus (*spinosus*) foliis pinnatifidis spinosis. Linn. Sp. ib.

Adhatoda Zeylanensium. Herman. Ecbolium Riu.

Iustitia (*Adhatoda*) arborea, foliis lanceolato-ouatis, bracteis ouatis persistentibus, corollarum galea concaua. Linn. 20.

Im Gräflichen und Steidelischen Garten.

Antirrhinum vulgare. I. Bauh.

Antirrhinum (*maius* β.) corollis ecaudatis, calycibus rotundatis. Linn. 859.

In den Gärten.

Antirrhinum aruense maius. Riuini.

Antirrhinum (*Orontium*) corollis ecaudatis, floribus ſubſpicatis, calycibus digitatis corolla longioribus. Linn. 860.

Kalbsnaſen, Löwenmaul. Auf den Feldern.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore. C. Bauh.

Antirrhinum (*linaria*) foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. Linn. 858.

Leinkraut, Flachskraut. Auf den Feldern und Wieſen.

Linaria triphylla coerulea. C. Bauh.

Antirrhinum (*triphyllum* β.) foliis ternis ouatis. Linn. 852.

Auf den Aeckern.

Linaria pumila, vulgatior, aruenſis. Tournef.

Antirrhinum (*minus*) foliis plerisque alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. Linn. 852.

Bey der großen Brücke. Blühen zuſammen im Julio und Auguſt.

Cymbalaria. C. Bauh.

Antirrhinum (*cymbalaria*) foliis cordatis quinquelobis alternis, caulibus procumbentibus. Linn. 851.

Cymbelkraut. Im Geimſiſchen Garten, an den Mauren.

Elatine folio ſubrotundo. C. Bauh.

Antirrhinum (*ſpurium*) foliis ouatis alternis, caulibus procumbentibus. Lin. 851.

Digitalis purpurea, folio aſpero. C. Bauh.

Digitalis (*purpurea*) calycinis foliolis ouatis acutis, corollis obtuſis, labio ſuperiore integro. Linn. 866.

Fingerhutskraut. Blüht im Junio, in den Gärten.

Digitalis maior lutea, ſeu pallida paruo flore. C. Bauh.

Digi-

Digitized by Google

Digitalis (*lutea*) calycinis foliolis lanceolatis, corollis acutis, labio ſuperiore bifido. Linn. 867.

Bey Weida an Felſen.

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo. C. Bauh.

Digitalis (*ferruginea*) calycinis foliatis ouatis obtuſis, corollae labio inferiore longitudine floris. Linn. 867.

Im Geimſiſchen Garten.

Gratiola Riuini.

Gratiola (*officinalis*) floribus pedunculatis, foliis lanceolatis ſerratis. Linn. 24.

Veronica mas ſupina et vulgatiſſima. C. Bauh. Officinarum. Rupp.

Veronica (*officinalis*) ſpicis lateralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. Linn. 14.

Ehrenpreiß. Blüht im Junio und Julio in den Wäldern.

Veronica ſupina Teucrii folio. Tournefort.

Veronica (*montana*) racemis lateralibus paucifloris, calycibus hirſutis, foliis ouatis rugoſis crenatis petiolatis, caule debili. Lin. 17.

Bey Ronneburg.

Veronica foliis Cymbalariae Tournefort. Alſine Hedecalae folio. C. Bauh.

Veronica (*hederifolia*) floribus ſolitariis, foliis cordatis planis, quinquelobis. Linn. 19.

Blüht im April.

Veronica foliis Rutae. Riuini. Alſine triphyllos coerulea. C. Bauh.

Veronica (*triphyllos*) floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculo breuioribus. Linn. 19.

Hündleinkraut. Mit lenen auf den Feldern.

Veronica ſpicata minor. C. Bauh.

Veronica (*ſpicata*) ſpica terminali, foliis oppoſitis

Digitized by Google

crenatis obtusis, caule adscendente simplicissimo. Linn. 14.

Veronica anguſtifolia ſcutellata. C. Bauh.

Veronica (*ſcutellata*) racemis lateralibus, pedicellis pendulis, foliis linearibus integerrimis. Linn. 16.

Nach Wünſchen Bernsdorf.

Veronica ſpicata latifolia. C. Bauh.

Veronica (*longifolia*) ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis. Linn. Sp. 13.

In den Gärten.

Veronica pratenſis latifolia. Riu. Chamaedrys ſpuria minor rotundifolia. C. Bauh.

Veronica (*Chamaedrys*) racemis lateralibus, foliis ouatis rugoſis dentatis, caule debili. Linn. Sp. 17.

Blühn im Junio und Julio, auf den Wieſen.

Veronica (*incana*) ſpicis terminalibus, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule erecto tomentoſo. Linn. Sp. 14.

Im Geimſiſchen Garten.

Veronica aquatica maior, folio ſubrotundo. I. R. H. Beccabunga Riuin. et officinarum.

Veronica (*Beccabunga*) racemis lateralibus, foliis ouatis planis, caule repente. Lin. Sp. 16.

Bachbungen. Blüht im May. Bey dem Kornhauſe, und im Graben des Rathsteiches.

Veronica aquatica maior, folio oblongo. Moriſ.

Veronica (*Anagallis aquatica*) racemis lateralibus, foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. Linn. 16.

In Gräben, an Bächen.

Verbaſcum mas latifolium luteum. C. Bauh.

Verbaſcum (*Thapſus*) foliis decurrentibus vtrinque tomentoſis. Linn. 252.

Wollkraut, Königskerze. An dem Hausberge und Gottesacker.

Digitized by Google

Verbaſcum mas anguſtioribus foliis, floribus pallidis. C. Bauh.

Verbaſcum (*Lychnitis*) foliis cuneiformibus oblongis. Linn. 253.

An der Elſter.

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente. C. Bauh.

Verbaſcum (*nigrum*) foliis oblongis cordatis petiolatis. Linn. ib.

Im Walde am Haynberge.

Blattaria lutea, folio oblongo, laciniato. C. Bauh.

Verbaſcum (*Blattaria*) foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis ſolitariis. Linn. 254.

Schabenkraut. Bey der Schmelzhütte. Blüht im Julio und Auguſt.

Hyoſcyamus vulgaris vel niger. C. Bauh.

Hyoſcyamus (*niger*) foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. Linn. Sp. 257.

Hyoſcyamus albus maior. C. Bauh.

Hyoſcyamus (*albus*) foliis petiolatis ſinuatis obtuſis, floribus ſubſeſſilibus. Linn. Sp. ib.

Bilſamkraut. Blüht im Junio und Julio, am Kalchbruche und bey dem Fiſchhauſe.

c) Mit einer dreykämmerigen Saamenkapſel.

Rapunculus ſpicatus coeruleus. C. Bauh.

Phyteuma (*ſpicata*) ſpica oblonga, capſulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. Linn. Sq. 242.

Blüht im May, am Haynberge

Rapunculus folio oblongo, ſpica orbiculari. C. Bauh.

Phyteuma (*orbicularis*) capitulo ſubrotundo, foliis ſerratis, radicalibus cordatis. Linn. ib.

Digitized by Google

Am Pfortner Berge.

Rapunculus galeatus virginianus flore violaceo maiore. Morif.

Lobelia (*Siphilitica*) caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum finubus reflexis. Lin. 1320.

Im Gräflichen Garten. Blühen im Auguſt.

Trachelium Tournef. vulgo flos cardinalis.

Lobelia (*Cardinalis*) caule erecto, foliis lanceolatis ſerratis, ſpica terminali. Lin. 1320.

Gladiolus Riu.

Gladiolus (*communis*) foliis enſiformibus, floribus diſtantibus. Linn. 52.

Blüht im Junio und Julio, in den Gärten.

Canna (*Indica*) foliis ouatis vtrinque acuminatis neruoſis. Linn. Sp. 1.

In Geimſiſchen Garten.

Aloe vulgaris. C. Bauh.

Aloe (*perfoliata vera*) floribus pedunculatis cernuis, corymboſis ſubcylindricis. Lin. 457.

Aloe.

Aloe africana, breuiſſimo craſſiſſimoque folio, flore viridi. Commel.

Aloe (*retuſa*) floribus ſeſſilibus triquetris bilabiatis, labio inferiore reuoluto. Lin. 459.

In verſchiedenen Gärten.

Aloe africana erecta triangularis et triangulari folio viſcoſo. Comm.

Aloe (*viſcoſa*) floribus ſeſſilibus infundibuliformibus bilabiatis, laciniis quinque reuolutis, ſumma erecta. Lin. 460.

Aloe africana folio in ſummitate triangulari, margaritifera, flore ſubuiridi. Comm.

Aloe (*pumila margaritifera*) floribus ſeſſilibus bilabia-

Digitized by Google

labiatis, labio ſuperiore erectiore, inferiore recuruato. Lin. 460.

In einigen Gärten.

d) Mit einer vierkämmerigen Kapſel.

Vitex Riuini.

Vitex (*agnus caſtus*) foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. Linn. 890.

Keuſchlamm, Mönchspfeffer.

Seſamum veterum. C. Bauh.

Seſamum (*orientale*) foliis ouato-oblongis integris. Linn. 883.

Mit ienen in hieſigen Gärten.

e) Mit einer ſechskämmerigen Kapſel.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpureo nigro. C. Bauh.

Ariſtolochia (*rotunda*) foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis. Linn. 1364.

Ariſtolochia cretica. Riu.

Ariſtolochia (*ſemperuirens*) foliis cordato-oblongis vndatis, caule infirmo, floribus ſolitariis. Linn. 1363.

Blühen im Junio, Julio und Auguſt. In den Gärten.

4.

Mit einer fleiſchichten Frucht.

und zwar

a) Mit einer vielkernigen.

Periclymenum vulgare germanicum. Rupp.

Digitized by Google

Lonicera (*periclymenum*) capitulis ouatis imbricatis terminalibus, foliis omnibus distinctis. Linn. 247.

Je länger ie lieber. Blüht im May, Junio und Julio, nach Grätz an den Zäunen.

Periclymenum perfoliatum, serotinum speciosius. Hort. reg. Par.

Lonicera periclymenum β. L.

Im Geimsischen Garten.

Periclymenum perfoliatum. C. Bauh.

Lonicera (*Caprifolium*) floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis. Linn. 246.

Spehlilien, Geisblatt.

Periclymenum virginianum. Riu.

Lonicera (*sempervirens*) spicis nudis verticillatis terminalibus, foliis summis connato-perfoliatis. Linn. 247.

Mit ienen im Geimsischen und andern Gärten.

Xylosteum Riu. Dod.

Lonicera (*Xylosteum*) pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis pubescentibus. Linn. Sp. 248.

In dem Walde hinter Saalfeld.

Xylosteum alpinum, foliis Alni. Riu. Chamaecerasus alpina, fructu nigro gemino. C. Bauh.

Lonicera (*nigra*) pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis ellipticis integerrimis. Linn. 247.

Bey Arnstadt.

Arum vulgare non maculatum. C. Bauh.

Arum (*maculatum*) acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clauato. Linn. 1370.

Aron, deutscher Ingber. Hinter dem Schlosse. Blüht im May.

Arum

Digitized by Google

Arum polyphyllum Riu.

Arum (*Dracunculus*) foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis aequantibus ſpatham ſpadice longiorem. Linn. 1367.

In den Gärten.

Ariſarum. Riuini.

Calla (*paluſtris*) foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice vndique hermaphrodito. Linn. 1373.

An der Straße nach Gräitz. Blüht im Junio und Julio.

Belladonna maioribus foliis et floribus Tournef. Solanum melanoceraſus. C. Bauh.

Atropa (*Belladonna*) caule herbaceo, foliis ouatis integris. Linn. 260.

Tollbeeren. Blühen im May und Junio bey Weida.

Zehnte Klaſſe.

Gewächſe mit einer regulären dreyblätterigen Blume.

Polygala maior. C. Bauh.

Polygala (*vulgaris*) floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. Linn. 986.

Auf der Wieſe am Haynberge. Blüht im May und Junio.

Polygala foliis imis ſubrotundis, ſuperioribus anguſtis acutis. v. Haller. Helu. Polygala vulgaris. C. Bauh. Polyga *vulgaris* β. Lin. 986.

Digitized by Google

Elfte Klasse

Gewächse mit einer regulären vierblätterigen Blume.

I.

Mit bedekten Saamen.

und zwar

a) Mit einer einfachen Kapsel.

Onobrychis foliis Viciae, fructu echinato, maior. C. Bauh.

Hedysarum (*Onobrychis*) foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce breuioribus, caule elongato. Linn. 1059.

Hahnenkamm. Bey Arnstadt und nach Naumburg.

Onobrychis orientalis maior foliis villosis Rupp.

Ist eine Varietät von iener, mit *etwas blässern* Blumen, die man unter den Namen von Esparcette häufig anbauet.

Onobrychis semine clypeato aspero, maior. C. Bauh.

Hedysarum (*coronarium*) foliis pinnatis, leguminibus articulatis nudis rectis, caule diffuso. Lin. 1058.

Blüht im August, in den Gärten.

Trifolium flore albo. Riu.

Trifolium (*hybridum* β.) capitulis vmbellaribus; leguminibus tetraspermis, caule adscendente. Linn. 1079.

Trifolium folio longiore, flore albo Riu. Trifolium montanum album. C. Bauh.

Tri-

Digitized by Google

Trifolium (*montanum*) ſpicis ſubimbricatis ſubtribus, vexillis ſubulatis emarceſcentibus, calycibus nudis, caule erecto. Linn. 1087.

Bey dem Buchwerke und dem Unterhauſe.

Trifolium repens. Riu. Trifolium pratenſe album. C. Bauh.

Trifolium (*repens*) capitulis vmbellaribus, legumi-nibus tetraſpermis, caule repente. Linn. 1080.

Wieſenklee.

Trifolium fragiferum friſicum. C. Bauh.

Trifolium (*fragiferum*) capitulis ſubrotundis, calycibus inflatis bidentatis reflexis, caulibus repentibus. Linn. 1086.

Trifolium pratenſe, purpureum. C. Bauh.

Trifolium (*pratenſe*) ſpicis ſubuilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis. Linn. Sp. 1082.

Wieſenklee.

Trifolium folio longo, flore purpureo. Riu. montanum purpureum maius. C. Bauh.

Trifolium (*alpeſtre*) ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus ſeſſilibus, caule erecto, foliis lanceolatis ſerrulatis. Linn. 1082.

Hinter Päppeln.

Trifolium aruenſe humile ſpicatum ſeu Lagopus. C. Bauh.

Trifolium (*aruenſe*) ſpicis villoſis oualibus, dentibus calycinis ſetaceis aequalibus. Linn. 1083.

Katzenklee, Haaſenpfödgen.

Lagopus capitulis rubris. Rupp.

Iſt eine Varietät. An dem Berge des Unterhauſes.

Trifolium montanum ſpica longiſſima rubente. C. Bauh.

Trifolium (*rubens*) ſpicis villoſis longis, corollis mono-

monopetalis, caule erecto, foliis ſerrulatis. Linn. 1081.

Trifolium pratenſe luteum, capitulo lupuli ſeu agrarium. C. Bauh.

Trifolium (*agrarium*) ſpicis oualibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto. Linn. 1087.

Hopfenklee.

Trifolium montanum lupulinum. C. Bauh.

Trifolium (*Spadiceum*) ſpicis oualibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto. Lin. 1087.

Schwarzbrauner Hopfenklee. Bey Lohne und Neptenitz.

Melilotus officinarum Germaniae. C. Bauh.

Trifolium (*Melilotus officinalis*) leguminibus racemoſis, nudis diſpermis, rugoſis acutis, caule erecto. Linn. 1078.

Meliloten, Steinklee. Nach Koſchwitz und an der Elſter. Man findet ihn ſowohl weiß, als gelb.

Melilotus flore coeruleo. Riu.

Trifolium (*Melilotus coerulea*) ſpicis oblongis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto. Linn. 1077.

Schabziegerkraut. Hier in den Gärten.

Anthyllis Riuini. Vulneraria Tournef.

Anthyllis (*Vulneraria*) herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato. Linn. Sp. 1012.

Auf den Wieſen nach dem kleinen Wehre. Blüht im Junio und Julio.

Pſeudo-Acacia vulgaris. Riu.

Robinia (*Pſeudo-Acacia*) racemis pedicellis vnifloris, foliis impari pinnatis, ſtipulis ſpinoſis. Linn. 1043.

Bau-

Digitized by Google

Wunderbaum. Im Gräflichen Garten. Blüht im May und Junio.

Laburnum Riu. Anagyris non foetida maior alpina. C. Bauh.

Cytisus (*Laburnum*) racemis simplicibus pendulis, foliolis ouato oblongis. Linn. Sp. 1041.

Blüht im Auguſt. In den Gärten.

Cytisus glaber nigricans. C. Bauh.

Cytisus (*nigricans*) racemis simplicibus erectis, foliolis ouato-oblongis. Lin. 1041.

Im Gräflichen Garten.

Lens vulgaris. C. Bauh.

Eruum (*Lens*) pedunculis subbifloris, seminibus compressis conuexis. Linn. 1039.

Linsen.

Cracea minor. Riu.

Eruum (*hirsutum*) pedunculis multifloris, seminibus globosis binis. Lin. 1039.

Auf den Feldern.

Orobus syluaticus purpureus, vernus. C. Bauh.

Orobus (*vernus*) foliis pinnatis ouatis, stipulis semisagittatis, integerrimis, caule simplici. Linn. 1028.

Faſanenkraut. Blüht im May, am Haynberge

Orobus syluaticus, foliis oblongis, glabris. Tournef. Orobus radice tuberosa. Riu.

Orobus (*tuberosus*) foliis pinnatis lanceolatis, stipulis semisagittatis integerrimis, caule simplici. Linn. 1028.

Im Martinsgrunde. Blüht im Junio und Julio.

Pisum pulchrum folio anguloso. I. Bauh.

Pisum (*aruense*) petiolis tetraphyllis, stipulis crenatis, pedunculis vnifloris. Lin. 1027.

Pisum

Digitized by Google

Piſum aruenſe. C. Bauh.

Piſum (*Satiuum*) petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. Linn. 1027.

Erbſen.

Piſum hortenſe maius. C. Bauh.

Piſum *ſatiuum β.* Linn. ib.

Gartenerbſen.

Piſum maius quadratum. C. Bauh.

Piſum *ſatiuum quadratum.* Linn. ib.

Zuckererbſen.

Lathyrus ſatiuus, flore fructuque albo. C. Bauh.

Lathyrus (*ſatiuus β.*) pedunculis vnifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ouatis compreſſis, dorſo bimarginatis. Linn. 1030.

Kichern.

Lathyrus ſylueſtris maior. C. Bauh.

Lathyrus (*ſylueſtris*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. Linn. 1033.

Am Haynberge.

Lathyrus latifolius. C. Bauh.

Lathyrus (*latifolius*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. Linn. ib.

Bey Schönkleine.

Lathyrus ſiculus. Rupp.

Lathyrus (*odoratus Siculus*) pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliis ouato-oblongis, leguminibus hirſutis. Linn. 1032.

Im Geimſiſchen Garten.

Lathyrus aruenſis repens tuberoſus. C. Bauh.

Lathyrus (*tuberoſus*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyl-

Digitized by Google

diphyllis, foliolis oualibus, internodiis nudis. Linn. 1033.

Erdfeigen, Erdnüſſe. Nach dem Weinberg.

Lathyrus ſylueſtris luteus, foliis Viciae. C. Bauh.

Lathyrus (*pratenſis*) pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliis lanceolatis. Linn. ib.

Lathyrus paluſtris, flore orobi nemorenſis verni. Rupp.

Lathyrus (*paluſtris*) pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipulis lanceolatis. Linn. Sp. 1034.

Aphaca Lobel.

Lathyrus (*Aphaca*) pedunculis vnifloris, cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato cordatis. Linn. 1029.

Lathyrus ſylueſtris minor. C. Bauh.

Lathyrus (*Niſſolia*) pedunculis vnifloris, foliis ſimplicibus, ſtipulis ſubulatis. Linn. Sp. 1029.

In den Gärten.

Vicia ſatiua vulgaris ſemine nigro. C. Bauh.

Vicia (*ſatiua*) leguminibus ſeſſilibus, ſubbinatis erectis, foliis retuſis, ſtipulis notatis. Linn. 1037.

Wicken.

Vicia Sepium. Riu.

Vicia (*Sepium*) leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ouatis integerrimis, exterioribus decreſcentibus. Linn. 1038.

Vogelwicken. Blühn im May und Junio.

Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus, lineis coeruleis notatis. Plukener.

Vicia (*ſyluatica*) pedunculis multifloris, foliolis oualibus, ſtipulis denticulatis. Linn. 1035.

Am Haynberge.

Cracca Riu. Vicia multiflora. C. Bauh.

Vicia (*Cracca*) pedunculis multifloris, floribus imbrica-

Digitized by Google

bricatis, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris. Linn. 1035.

Faba flore albo, lituris nigris conspicuo. C. Bauh. Faba. Riu.

Vicia (*Faba*) caule erecto, petiolis absque cirrhis. Linn. 1039.

Saubohnen.

Faba minor fructu nigro. C. Bauh.

Eine Varietät.

Lupinus flore albo Riuini.

Lupinus (*albus*) calycibus alternis inappendiculatis, labio superiore integro, inferiore tridentato. Linn. 1015.

Lupinen, Feigbohnen.

Lupinus flore coeruleo. Riu.

Lupinus (*varius*) calycibus semiverticillatis appendiculatis, labio superiore bifido, inferiore subtridentato. Linn. 1015.

Lupinus flore luteo. Riuini.

Lupinus (*luteus*) calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato. Linn. 1015.

Türkische Veilgen. Mit ienem in den Gärten.

Phaseolus Riuini.

Phaseolus (*vulgaris*) volubilis, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. Linn. Sp. 1016.

Bohnen, Schminkbohnen, Feuerbohnen.

Phaseolus aegyptiacus, nigro semine. C. Bauh.

Dolichas (*Lablab*) volubilis leguminibus ouato-acinaciformibus, seminibus ouatis, hilo arcuato versus alteram extremitatem. Linn. 1019.

Im Geimsischen Garten.

Foenum graecum satiuum. C. Bauh.

Digitized by Google

Trigonella (*Foenum graecum*) leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. Linn. 1090.

Bokshorn. Wird bey Erfurt häufig gebaut.

Falcata Riuini. Trifolium ſyluestre luteum, ſiliqua cornuta. C. Bauh.

Medicago (*falcata*) pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. Linn. 1096.

Sichelklee, Schwediſcher Heuſaamen, Schwediſche Luzerne.

Falcata ſatiua flore caeruleo. Rupp.

Medicago (*ſatiua*) pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro. Linn. ib.

Luzerne. Foin de Bourgogne. Blüht im Junio und Julio.

Cochleata echinata, minima. Riu.

Medicago (*polymorpha minima*) leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. Linn. 1099.

Blüht im May und Junio, am Pfortner Berge.

Glycyrrhiza officinarum Rupp. ſiliquoſa vel Germanica. C. Bauh.

Glycyrrhiza (*glabra*) leguminibus glabris, ſtipulis nullis. Linn. 1046.

Im Gräflichen Garten.

Galega vulgaris, floribus coeruleis et albis. C. Bauh.

Galega (*officinalis*) leguminibus ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtrictis nudis. Linn. 1062.

Geißraute. Im Steideliſchen Garten. Blüht im Auguſt.

Ononis ſpinoſa, flore purpureo et albo. C. Bauh.

Ononis (*ſpinoſa β.*) floribus racemoſis geminis, foliis ternatis, ſuperioribus ſolitariis, ramis inermibus ſubuilloſis. Linn. 1006.

Digitized by Google

Stachelkraut, Heuhechel. Blüht im Julio und Auguſt, bey Dieſchitz und den Alabaſter Brüchen.

Ononis ſpinis carens purpurea. C. Bauh.

Ononis ſpinoſa mitis. Lin. 1006.

An bergigten Orten.

Colutea veſicaria. C. Bauh.

Colutea (*arboreſcens*) foliis obcordatis. Linn. 1045.

Linſenbaum, Blaſenbaum.

Colutea Aethiopica. Riu.

Colutea (*fruteſcens*) foliolis ouato-oblongis. Linn. ib.

Colutea africana, veſicaria, veſiculis floribus atro-rubentibus. Volkam.

Colutea (*herbacea*) foliis linearibus. Linn. *ib.*

Blühen zuſammen im Junio und Julio im Gräflichen und Geimſiſchen Garten.

Geniſta anguloſa et ſcoparia. C. Bauh.

Spartium (*Scoparium*) foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis. Linn. Sp. 996.

Bey Oberpölniz und Neuſtadt.

Geniſta hiſpanica. Riu.

Spartium (*Iunceum*) ramis oppoſitis teretibus, apice floriferis, foliis lanceolatis. Linn. 995.

Blüht im May und Junio.

Geniſta tinctoria germanica. C. Bauh.

Geniſta (*tinctoria*) foliis lanceolatis, ramis ſtriatis teretibus erectis. Linn. 998.

Geniſte. Im Walde nach Pforten.

Geniſta ſpinoſa minor germanica. C. Bauh.

Geniſta (*germanica*) ſpinis compoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis. Linn. 999.

Am Haynberge.

Securidaea lutea maior. C. Bauh.

Coronilla (*Securidaca*) herbacea, leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. Linn. 1048.

Digitized by Google

In den Gärten.

Coronilla flore vario Riu.

Coronilla (*varia*) herbacea, leguminibus erectis teretibus torosis numerosis, foliolis plurimis glabris. Linn. 1048.

Coronilla maior. Riu.

Coronilla (*Emerus*) fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum vnguibus calyce triplo longioribus, caule angulato. Linn. 1046.

In einigen Gärten.

Ferrum equinum comosum. Riu. s. germanicum, siliquis in summitate. C. Bauh.

Hippocrepis (*comosa*) leguminibus pedunculatis confertis, margine exteriore repandis. Linn. 1050.

Blüht im May an Bergen.

Ferrum equinum siliqua singulari. C. Bauh.

Hippocrepis (*vnisiliquosa*) leguminibus sessilibus, solitariis. Linn. 1049.

In den Gärten.

Lotus pentaphyllos, flore maiore, luteo, splendente. C. Bauh.

Lotus (*corniculatus* β) capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis patentibus. Linn. 1092.

Bey Ronneburg.

Lotus tetragonolobus, flore rubro. Riu.

Lotus (*tetragonolobus*) leguminibus solitariis, membranaceo-quadrangulatis, bracteis ouatis. Linn. 1089.

Spargelerbsen. In den Gärten.

Ornithopodium maius. C. Bauh.

Ornithopus (*perpusillus* β) foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis. Linn. 1049.

Hinter Päppeln im Grunde nach Fense.

Digitized by Google

Fumaria officinarum et Dioſcoridis. C. Bauh.

Fumaria (*officinalis*) pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. Lin. 984.

Erdrauch, Taubenkropf. Blüht im Sommer und Herbſt.

Fumaria bulboſa, radice caua, maior, flore rubro et albo. C. Bauh.

Fumaria (*bulboſa caua α.*) caule ſimplici, bracteis longitudine florum. Linn. 983.

Hohlwurz. Blüht im April und May, am Hayn berge nach Dieſchitz und bey der Eisgrube.

Fumaria lutea. C. Bauh.

Fumaria (*capnoides*) ſiliquis linearibus tetragonis; caulibus diffuſis acutangulis. Linn. 984.

In verſchiedenen Gärten.

Capnoides. Tournef. Fumaria ſiliquoſa ſemperuiuens. Moriſ.

Fumaria (*ſemperuiuens*) ſiliquis linearibus panicul latis, caule erecto. Lin. 984.

In den Gärten.

Capnoides Riu. Fumaria ſpuria africana veſicaria Volk.

Fumaria (*veſicaria*) ſiliquis globoſis inflatis. L. 985.

Impatiens Riu. Balſamina lutea ſ. Noli me tangere. C. Bauh.

Impatiens (*noli tangere*) pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus. Linn. 1329.

Springkraut. Blüht im Junio und Julio, bey dem Unterhauſe, nach Fenſee und an der Mühle.

Balſamina femina. C. Bauh.

Impatiens (*balſamina*) pedunculis vnifloris ſubaggregat

Digitized by Google

gregatis, foliis lanceolatis ſuperioribus alternis, nectariis floré breuioribus. Linn. 1328.

Balſaminen.

b) Mit einer zweikämmerigen Kapſel.

Aſtragalus luteus, perennis, procumbens, vulgaris. Moriſ.

Aſtragalus (*Glyzyphyllos*) cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, foliis ouatis pedunculo longioribus. Linn. 1067.

Wild Süßholz. Blüht im Auguſt, am Haynberge.

Glaux Riuini. Cicer ſylueſtre, foliis oblongis hiſpidis maius. C. Bauh.

Aſtragalus (*Cicer*) cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis. L. 1067.

c) Mit einer dreikämmerigen Kapſel.

Eſula Riu. et officinarum. Tithymalus cypariſſius. C. Bauh.

Euphorbia (*Cypariſſius*) vmbella multifida dichotoma, inuolucellis ſubcordatis, ramis ſterilibus, foliis ſetaceis, caulinis lanceolatis. Linn. 661.

Eſelsmilch.

Eſula ſoliſequa. Rupp. Tithymalus heliocopius. C. Bauh.

Euphorbia (*Helioſcopia α.*) vmbella quinquefida, trifida, dichotoma, inuolucellis obouatis, foliis cuneiformibus ferratis. Linn. 658.

Mit iener auf den Feldern.

Eſula rotundifolia non crenata. Rupp. Peplus ſ. Eſula rotunda. C. Bauh.

Euphorbia (*Peplus*) vmbella trifida, dichotoma,

Digitized by Google

inuolucellis ouatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis. Linn. 653.

In den Gärten.

Esula tenuifolia siue exigua Tragi. Tithymalus seu Esula exigua. C. Bauh.

Euphorbia (*exigua acuta*) vmbella trifida, dichotoma, inuolucellis lanceolatis, foliis linearibus. Linn. 654.

Auf den Feldern und Wiesen.

Esula maior Riu. Lathyris maior. C. Bauh.

Euphorbia (*Lathyris*) vmbella quadrifida dichotoma, foliis oppositis integerrimis. Linn. 655.

Springkörner. In verschiedenen Gärten.

Esula paluſtris. Riu. Tithymalus paluſtris fruticosus. C. Bauh.

Euphorbia (*paluſtris*) vmbella multifida subtrifida bifida, inuolucellis ouatis, foliis lanceolatis, ramis sterilibus. Linn. 662.

Auf den Oberdorfischen Wiesen.

Esula folio amygdali angusto. Rupp. Tithymalus maritimo affinis, linariae folio. C. *Bauh.*

Euphorbia (*segetalis*) vmbella quinquefida dichotoma, inuolucellis cordatis acutis, foliis lineari lanceolatis, ramis floriferis. Linn. 657.

Vor dem Baderthore.

Esula caule crasso. Riu. Tithymalus dendroides. Cam.

Euphorbia (*Dendroides*) vmbella dichotoma, inuolucellis subcordatis, primariis triphyllis, caule arboreo. Linn. 662.

Im Gräflichen Garten. Blühen zusammen im April, May, Junio und Julio.

Zwölfte

Digitized by Google

Zwölfte Klasse.

Gewächse mit einer ungleichförmigen fünfblätterigen Blume.

I.

Mit doppelten unbedekten Saamen.

Tordylium Riu.

Tordylium (*maximum*) vmbellis confertis radiatis, foliolis lanceolatis inciso-ferratis. L. 345.

Tordylium apulum minimum. Column.

Tordylium (*Apulum*) vmbellis remotis, foliis pinnatis, pinnis subrotundis laciniatis. Lin. 345.

Beide in den Gärten. Blühen im Junio und Julio.

Caucalis aruensis echinata latifolia. C. Bauh.

Tordylium (*latifolium*) vmbellis confertis nudiusculis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis inciso-ferratis. Linn. ib.

In den Gärten.

Caucalis semine aspero, flore rubente. C. Bauh.

Tordylium (*Anthriscus*) vmbellis confertis, foliolis ouato-lanceolatis pinnatifidis. Lin. 346.

An den Zäunen.

Ceruaria Riu.

Athamanta (*Ceruaria*) foliolis pinnatis decussatis, inciso-angulatis, seminibus nudis. Lin. 352.

Schwarzer Enzian. Bey Schönkleine.

Pastinaca satiua latifolia. C. Bauh.

Pastinaca (*satiua* β.) foliis simpliciter pinnatis. Lin. 376.

Digitized by Google

Paſtinat. In den Gärten und auf den Feldern.

Paſtinaca ſylueſtris latifolia. C. Bauh.

Paſtinaca *ſatiua α*. Linn. ib.

Am Mühlgraben und bey der großen Brücke.

Sphondylium vulgare hirſutum. C. Bauh. Seu Branca vrſina.

Heracleum (*ſphondylium*) foliis pinnatifidis. L. 358.

Bärenklee. Blüht im Auguſt und September, auf den Wieſen.

Eryngium vulgare. C. Bauh.

Eryngium (*campeſtre*) foliis amplexicaulibus pinnato-laciniatis. Lin. 337.

Mannstreue. Nach Naumburg.

Eryngium latifolium planum. C. Bauh.

Eryngium (*planum*) foliis radicalibus ouatibus, planis crenatis, capitulis pedunculatis. Lin. 336.

In den Gärten.

Peucedanum germanicum. C. Bauh.

Peucedanum (*officinale*) foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. Linn. 353.

Saufenchel, Schwefelwurz. In der Gegend nach Roſchitz.

Imperatoria maior. C. Bauh.

Imperatoria oſtruthium. Lin. 371.

Meiſterwurz.

Thyſſelinum Riu. Thyſſelinum Plinii. Moriſ.

Selinum (*ſylueſtre*) radice fuſiforme multiplici. Lin. 350.

Nach Altenburg.

Anethum hortenſe. C. Bauh.

Anethum (*graueolens*) fructibus compreſſis. Lin. 377.

Dille.

Digitized by Google

Foeniculum vulgare germanicum. C. Bauh.

Anethum (*Foeniculum β.*) fructibus ouatis. Lin. 377.

Fenchel.

Angelica satiua. C. Bauh.

Angelica (*Archangelica*) foliorum impari lobato. Linn. 360.

Brustwurz. In den Gärten.

Angelica syluestris maior. C. Bauh.

Angelica (*syluestris*) foliis aequalibus ouato-lanceolatis serratis. Lin. 361.

Im Martinsgrunde und an der Elster.

Laserpitium Riu. Libanotis latifolia maior. C. Bauh.

Laserpitium (*latifolium*) foliolis cordatis incisoserratis. Lin. 356.

Weisser Enzian. Am Haynberge.

Scandix semine rostrato vulgaris. C. Bauh.

Scandix (*pecten veneris*) seminibus laeuibus, rostro longissimo. Lin. 368.

Nadelkörbel. Am Pfortner Berge.

Echinophara flore magno Riu.

Caucalis (*grandiflora*) inuolucris pentaphyllis, foliolo vnico duplo maiore. Lin. 346.

Auf den Feldern nach Naumburg zu.

Daucus satiuus radice lutea aurantii coloris, et alba. Tournef.

Daucus (*carota β.*) seminibus hispidis, petiolis subtus neruosis. Linn. 348.

Mohrrüben, Gelbemöhren.

Daucus vulgaris. Clusii.

Daucus *carota α.* Linn. ib.

Wilder Möhrensaamen.

Meum foliis Anethi. C. Bauh.

Digitized by Google

Athamanta (*Meum*) foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis. Lin. 353.

In einigen Gärten.

Oreoselinum officinarum. Riu.

Athamanta (*Oreoselinum*) foliis diuarsatis. Lin. 352.

Blüht im Julio nach Pappeln zu.

Oenanthe aquatica. C. Bauh.

Oenanthe (*fistulosa*) stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. Lin. 365.

An sumpfigten Gegenden.

Sanicula officinarum. C. Bauh.

Sanicula (*europaea*) foliis radicalibus simplicibus, floscvlis omnibus sessilibus. Lin. 339.

Blüht im May, bey Pforten.

Falcaria Riu. Eryngium aruense foliis serratis. C. Bauh.

Sium (*Falcaria*) foliis linearibus decurrentibus connatis. Linn. 362.

Bey der großen Brücke, und der Nemeburger Anhöhe.

Podagraria Riu. Angelica syluestris minor *s. erratica.* C. Bauh.

Aegopodium (*Podagraria*) foliis caulinis summis ternatis. Lin. 379.

Geißfuß. Blüht im Junio.

Leuisticum Riu. Ligusticum vulgare. C. Bauh.

Ligusticum (*Leuisticum*) foliis multiplicibus, foliolis superne incisis. Lin. 359.

In verschiedenen Gärten.

Seseli pratense. C. Bauh.

Peucedanum (*Silaus*) foliis pinnatifidis, laciniis oppositis, inuolucro vniuersali diphyllo. Lin. 354.

Auf den Wiesen.

Astran-

Aſtrantia. Riu.

Aſtrantia (*maior*) foliis quinquelobis, lobis trifidis. Lin. 339.

In den Gärten.

Bupleurum folio rigido. C. Bauh.

Bupleurum (*rigidum*) caule dichotomo ſubnudo, inuolucris minimis acutis. Lin. 342.

Haſenöhrgen. Bey Arnſtadt.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum. Tournef.

Perfoliata vulgatiſſima aruenſis. C. Bauh.

Bupleurum (*rotundifolium*) inuolucris vniuerſalibus nullis, foliis perfoliatis. Lin. 340.

Auf den Aeckern bey Rubitz.

Carum pratenſe, Carui officinarum. C. Bauh.

Carum *Carui*. Linn. 378.

Wieſenkümmel. Auf den Wieſen.

Cicutaria paluſtris tenuifolia. C. Bauh. Phellandrium Dodon. Riu.

Phellandrium (*aquaticum*) foliorum ramificationibus diuaricatis. Lin. 366.

Am Haynberge im Graben.

Myrrhis maior vel Cicutaria odorata. C. Bauh.

Scandix (*odorata*) ſeminibus ſulcatis angulatis. Lin. 368.

In einigen Gärten.

Cerefolium Riu. Chaerophyllum ſatiuum. C. Bauh.

Scandix (*Cerefolium*) feminibus nitidis ouato-ſubulatis, vmbellis ſeſſilibus lateralibus. Lin. 368.

Kerbel.

Myrrhis annua ſemine ſtriato laeui. Moriſon. Chaerophyllum ſylueſtre. C. Bauh.

Chaerophyllum (*temulum*) caule ſcabro, geniculis tumidis. Lin. 370.

Blüht

Blüht im May, an den Zäunen.

Myrrhis perennis, alba, minor foliis hirſutis, ſemine aureo. Morif. Rupp. tab. V.

Chaerophyllum (*aureum*) caule aequali, foliolis inciſis, ſeminibus coloratis ſtriatis. Lin. 370.

Bey Rubitz auf den Wieſen und bey Naulitz am Fuße des Heidelberges.

Myrrhis foetens. Riu.

Chaerophyllum (*bulboſum*) caule laeui, geniculis tumidis. Lin. 370.

Myrrhis latifolia alba et rubra. Tournef. paluſtris Riu. Cicutaria paluſtris latifolia alba. C. Bauh.

Chaerophyllum (*birſutum*) caule aequali, foliolis inciſis acutis, ſeminibus ſubulatis. Lin. 371.

Myrrhis ſylueſtris ſeminibus laeuibus. C. Bauh. Cerefolium ſylueſtre. Riu.

Chaerophyllum (*ſylueſtre*) caule ſtriato, geniculis tumidiuſculis. Lin. 369.

Kälberkropf. Auf den Wieſen.

Siſarum germanorum. C. Bauh.

Sium (*Siſarum*) foliis pinnatis, floralibus *ternatis*. Linn. 361.

Zuckerwurzel. In den Gärten.

Cynapium Riu. Cicuta minor petroſelino ſimilis. C. Bauh.

Aethuſa *Cynapium*. Lin. 367.

Hundspeterſilie. Auf den Aeckern.

Cicuta maior. C. Bauh.

Conium (*maculatum*) ſeminibus ſtriatis. Linn. 349.

Schierling, an der Elſter und an dem Fiſchhauſe.

Cicuta aquatica Wepfferi. Cicutaria. Riu.

Cicuta (*viroſa*) vmbellis oppoſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. Lin. 366.

An Gräben.

Ani-

Digitized by Google

Anisum vulgare. Clusii.

Pimpinella (*Anisum*) foliis radicalibus trifidis incisis. Lin. 379.

Aniß. In den Gärten.

Apium palustre seu Apium officinarum. C. Bauh.

Apium (*graueolens*) foliis caulinis cuneiformibus, vmbellis sessilibus. Lin. 379.

Selleri. In den Gärten und Gräben.

Apium hortense siue Petroselinum vulgo. C. Bauh.

Apium (*petroselinum*) foliolis caulinis linearibus, inuolucellis minutis. Lin. 379.

Peterſilie.

Apium s. petroselinum crispum. C. Bauh.

Apium *petroselinum* β. Linn. ib.

Krauſe Peterſilie. Mit iener in den Gärten.

Coriandrum maius. C. Bauh.

Coriandrum (*sativum*) fructibus globosis. Lin. 367.

Coriander, Schwindelkörner.

Sium s. Apium palustre foliis oblongis. C. Bauh.

Sium (*latifolium* β.) foliis pinnatis, vmbellis terminalibus. Linn. 361.

Eppich, Waſſermark. Im Waſſergraben, bey Cuba und Pforten.

Pimpinella saxifraga maior, vmbella candida. C. Bauh.

Pimpinella (*Saxifraga maior* γ.) foliis pinnatis, foliolis radicalibus subrotundis, summis linearibus. Linn. 378.

Am Haynberge. Pimpinelle.

Pimpinella saxifraga minor. C. Bauh.

Pimpinella saxifraga α. Linn. ib.

Kleine Pimpinelle.

Pimpinella saxifraga tenuifolia. C. Bauh.

Pimpinella saxifraga hircina ε. Linn. ib.

Bey Rauliz auf dem Heidelberge.

Digitized by Google

2.

Mit drey unbedekten Saamen.

Naſturtium indicum maius. C. Bauh. Cardamindum minus et vulgare. Tournef.

Tropaeolum (*minus*) foliis integris, petalis acuminato-ſetaceis. Lin. 490.

Indianiſche Kreſſe.

Cardamindum ampliori folio et maiore flore. Tournef.

Tropaeolum (*maius*) foliis ſubquinquelobis, petalis obtuſis. Linn. ib.

Mit iener in den Gärten.

3.

Mit bedekten Saamen.

und zwar

a) Mit einer einkämmerigen Saamen-Kapſel.

Arbor Iudae. Dodon. Siliqua ſylueſtris rotundifolia. C. Bauh.

Cereis (*Siliqueſtrum*) foliis cordato orbiculatis glabris. Lin. 334.

Johannisbrodt. Im Genſeliſchen Garten.

Viola martia purpurea flore ſimplici odoro. C. Bauh.

Viola (*odorata*) acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. Lin. 1324.

Blaue Merz-Viole.

Viola martia inodora ſylueſtris. C. Bauh.

Viola (*canina*) caule adultiore adſcendente, foliis oblongo-cordatis. Lin. 1324.

Hundsviolen.

Viola tricolor. Riu.

Vio-

Digitized by Google

Viola (*tricolor* β.) caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis dentatis. Lin. 1376.

Viola bicolor aruenſis. C. Bauh.

Viola tricolor *a*. Lin. ib.

In den Gärten. Blühn zuſammen im Merz, April und May.

Reſeda vulgaris. C. Bauh.

Reſeda (*lutea*) foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. Lin. 645.

An Rändern.

Luteola herba ſalicis folio. C. Bauh.

Reſeda (*Luteola*) foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis. Lin. 644.

Streichkraut. Am Wege nach Dienz, und bey dem Kalkbruche.

Reſeda maxima. C. Bauh.

Reſeda (*alba*) foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus ſexpartitis. Lin. 645.

In den Gärten.

Reſeda foliis integris floribus odoratis. v. Haller.

Reſeda (*odorata*) foliis integris trilobisque, calycibus florem aequantibus. Lin. 646.

In den Gärten.

4) Mit einer dreifächrichten Saamen-Kapſel.

Napellus flore minore. Riu. Aconitum coeruleum ſ. Napellus. C. Bauh.

Aconitum (*Napellus*) foliorum laciniis lineribus ſuperne latioribus linea exaratis. Lin. 751.

Eiſenhüthgen. In den Gärten.

Napellus flore luteo. Riu. Aconitum lycoctonum luteum. C. Bauh.

Aconi-

Aconitum (*lycoctonum*) foliis palmatis multifidis villoſis. Lin. 750.

Wolfswurz. Bey Nordhauſen an bergigten Gegenden, hier in den Gärten.

Aconitum ſalutiferum ſ. Anthora. C. Bauh.

Aconitum (*Anthora*) floribus pentagynis, foliorum laciniis linearibus. Lin. 751.

Im Gräflichen Garten.

Conſolida regalis aruenſis. C. Bauh.

Delphinium (*Conſolida*) nectariis monophyllis, caule ſubdiuiſo. Lin. 748.

Ritterſporen.

Conſolida regalis hortenſis flore maiore ſimplici et multiplici.

Delphinium (*Aiacis*) nectariis monophyllis, caule ſimplici. Lin. 748.

In den Gärten.

Staphiſagria. C. Bauh.

Delphinium (*Staphiſagria*) nectariis diphyllis petalo breuioribus, foliis palmatis, lobis obtuſis. Linn. 750.

Im Gräflichen Garten.

Hippocaſtanum Tournef. Caſtanea folio multifido. C. Bauh.

Aeſculus (*Hippocaſtanum*) floribus heptandris. L. 488.

Roßkaſtanien.

Dreizehente Klaſſe.

Gewächſe mit einer ungleichförmigen fünfblätterigen Blume.

Mit einer fünfkämmerigen Saamen-Kapſel.

Dictamnus albus vulgo Fraxinella. C. Bauh.

Dictamnus

Dictamnus *albus*. Lin. 548.
Weißer Diptam. In den Gärten.
Pyrola rotundifolia maior. C. Bauh.
Pyrola (*rotundifolia*) ſtaminibus adſcendentibus, piſtillo declinato. Lin. 567.
Wintergrün, Waldmangold. Blüht im May und Junio, im Grunde hinter dem Unterhauſe.
Pyrola minor. Riu.
Pyrola (*minor*) floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillisque rectis. Lin. 567.
Im Martinsgrunde.
Pyrola flore ſingulari. Riu. rotundifolia minor. C. Bauh.
Pyrola (*vniflora*) ſcapo vnifloro. Lin. 568.
Im Walde bey Hartmannsdorf unter den Tannen und Fichten, auch im Martinsgrunde.
Pyrola folio mucronato ſerrato. C. Bauh.
Pyrola (*Secunda*) racemo vnilaterali. Lin. 567.
Am Haynberge.
Pyrola fruteſcens Arbuti flore. C. Bauh.
Pyrola (*vmbellata*) pedunculis ſubumbellatis. Lin. ib.
Am Pfortner Berge.

Vierzehnte Klaſſe.

Gewächſe mit einer ungleichförmigen ſechsblätterigen Blume.

Calceolus. Riu.
Cypripedium (*Calceolus*) radicibus fibroſis, foliis ouato-lanceolatis caulinis. Lin. 1346.
Marienſchuh. Blüht im May und Junio in Wäldern.
Helleborine flore albo, vel Damaſonium montanum latifolium. C. Bauh.
Serapias (*longifolia* δ.) bulbis fibroſis, floribus erectis, bracteis longioribus. Lin. 1345.

Digitized by Google

Am Haynberge bey dem Lusthause.

Helleborine montana angustifolia, purpurascens. C. Bauh.

Serapias longifolia δ.

Bey Mühlsdorf.

Helleborine angustifolia paluſtris ſ. pratenſis. C. Bauh.

Serapias *longifolia* β. Lin. ib.

Bey Frankenthal und im Rathsholze, im Julius und Auguſt.

Helleborine barba rubra. Riu. Helleborine latifolia montana. C. Bauh.

Serapias (*latifolia* α.) bulbis fibroſis, floribus erectis bractea breuioribus. Lin. 1344.

Helleborine altera atrorubente flore. C. Bauh.

Eine Varietät. Blüht mit iener im Martinsgrunde.

Orchis militaris maior. Tournef.

Orchis (*militaris* δ.) bulbis indiuiſis, nectarii labio quinquefido punctis ſcabro, cornu obtuſo, petalis confluentibus. Lin. 1333.

In Wäldern.

Orchis militaris montana, ſpica rubente conglomerata. C. Bauh.

Orchis (*pyramidalis*) bulbis indiuiſis, nectarii labio trifido, aequali integerrimo, cornu longo, petalis ſublanceolatis. Lin. 1332.

Im Martinsgrunde.

Orchis morio femina. C. Bauh.

Orchis (*Morio*) bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrifido crenulato, cornu obtuſo, petalis omnibus conniuentibus. Lin. 1333.

Ebendaſelbſt.

Orchis morio mas, foliis non maculatis. C. Bauh.

Orchis (*maſcula*) bulbis indiuiſis, nectarii labio quadrilobo crenulato, cornu obtuſo, petalis dorſalibus reflexis. Lin. 1333.

Orchis bifolia latiſſima. C. Bauh. Satyrium Riu.

Orchis

Orchis (*bifolia* γ.) bulbis indiuiſis, nectarii labio lanceolato integerrimo, cornu longiſſimo, petalis patentibus. Lin. 1331.

Bey Pforten auf dem Anger und den Buchwerken.

Orchis palmata pratenſis maxima. C. Bauh.

Orchis (*conopſea* γ.) bulbis palmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore, labio trifido, petalis duobus patentiſſimis. Lin. 1336.

Auf der Wieſe bey der Schmelzhütte.

Ophris bifolia. C. Bauh.

Ophrys (*ouata*) bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido. Lin. 1340.

Orchis abortiua fuſca. C. Bauh. Nidus auis. Lob.

Ophrys (*Nidus auis*) bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido. Lin. 1339.

Im Tannen-Walde hinter dem Schloſſe.

Orchis muſcam referens maior. C. Bauh.

Ophrys (*inſectifera myodes* β.) bulbis ſubrotundis, ſcapo folioſo, nectarii labio ſubquinquelobo. Lin. 1343.

Im Walde.

Orchis ſpiralis alba odorata. I. Bauh.

Ophrys (*Spiralis*) bulbis aggregatis oblongis, caule ſubfolioſo, floribus ſecundis, nectarii labio indiuiſo crenato. Lin. 1340.

Hinter Päppeln und bey Wallersdorf.

Orchis barbata, odore hirci, breuiore latioreque folio. C. Bauh.

Satyrium (*hircinum*) bulbis indiuiſis, foliis lanceolatis, nectarii labio trifido, intermedia lineari elongata, obliqua praemorſa. Lin. 1337.

Im Martinsgrunde auf der kleinen Wieſe.

Funfzehente Klaſſe

Gräſer und grasähnliche Gewächſe.

Triticum hybernum ariſtis carens. C. Bauh.

Digitized by Google

Triticum (*hybernum*) calycibus quadrifloris ventricosis laeuibus, imbricatis submuticis. Lin. 126.
Winter-Weizen.

Triticum aestiuum. C. Bauh.
Triticum (*aestiuum*) calycibus quadrifloris ventricosis glabris, imbricatis aristatis. Lin. 126.
Sommer-Weitzen.

Gramen caninum aruense s. gramen Dioscoridis. C. Bauh.
Triticum (*repens*) calycibus subulatis quadrifloris acuminatis. Lin. 128.
Queckweitzen. Auf den Aeckern und in den Gärten.

Secale hybernum s. maius. C. Bauh.
Secale (*cereale hybernum*) glumarum ciliis scabris. Lin. 124.

Secale vernum s. minus. C. Bauh.
Secale *cereale vernum*. Lin. ib.
Roggen, Korn.

Gramen Secalinum maximum. Park.
Secale (*villosum*) glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. Lin. 124.
Haarigter Weitzen.

Hordeum polystichum vernum. C. Bauh.
Hordeum (*vulgare*) flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. Linn. 125.
Sommer-Gerste.

Hordeum polystichum hybernum. C. Bauh.
Winter-Gerste.

Gramen hordeacum minus et vulgare. C. Bauh.
Hordeum (*murinum*) flosculis lateralibus, masculis aristatis, inuolucris intermediis ciliatis. Lin. 126.
An Mauren. Mäusegerste.

Auena vulgaris s. alba. C. Bauh.
Auena (*Sativa* β.) paniculata, calycibus dispermis, seminibus laeuibus. Lin. 118.
Gemeiner Haser.

Auena

Digitized by Google

Auena nigra. C. Bauh.
Auena ſatiua α. Lin. ib.
Gramen auenaceum pratenſe elatius, panicula flaueſcente, locuſtis paruis. Scheuch.
Auena (*flaueſcens*) panicula laxa, calycibus trifloris breuibus, floſculis omnibus ariſtatis. Lin. 118.
Gelber Hafer. Auf den Wieſen.
Gramen auenaceum glabrum, ſ. potius hirſutum, panicula purpureo-argentea ſplendente. Rai. Scheuch.
Auena (*pratenſis*) ſpicata, calycibus quinquefloris, Lin. 119.
Wieſenhafer.
Gramen auenaceum, locuſtis lanugine flaueſcentibus. Scheuch.
Auena (*fatua*) paniculata, calycibus trifloris, floſculis omnibus baſi piloſis, ariſtis totis laeuibus, Lin. 118.
Wildhafer. Unter dem Getreide.
Gramen auenaceum elatius, iuba longa ſplendente. Scheuch.
Auena (*elatior*) paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato. Lin. 117.
Glatthafer. Auf den Wieſen.
Milium ſemine luteo et albo. C. Bauh.
Panicum (*miliaceum*) panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus. Lin. 86.
Hirſen.
Gramen panicum ſpica diuiſa. C. Bauh. Scheuch.
Panicum (*Crus-Galli*) ſpicis alternis coniugatisque, ſpiculis ſubdiuiſis, glumis ariſtatis hiſpidis, rachi quinquangulari. Lin. 83.
Grannigtes Hirſegras.
Gramen paniceum ſpica diuiſa, ariſtis longis armata. C. Bauh.
Panicum Crus Galli β. Lin. ib.
Gramen paniceum ſ. Panicum ſylueſtre ſpica ſimplici. C. Bauh. Scheuch.

Digitized by Google

Panicum (*viride*) ſpica tereti, inuolucellis biſloris faſciculato-piloſis, ſeminibus neruoſis. Lin. 83.

Grünes Hirſegras.

Gramen dactylon folio latiore, C. Bauh. Scheuch.

Panicum (*Sanguinale*) ſpicis digitatis, baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Lin. 84.

Blutiges Hirſegras.

Gramen ſyluaticum, panicula miliacea ſparſa. C. Bauh. Scheuch.

Milium (*effuſum*) floribus paniculatis diſpermis muticis. Lin. 90.

Straußigtes Fladergras. In Wäldern.

Gramen loliaceum ſpica longiore f. Lolium Dioſcoridis. C. Bauh. Scheuch.

Lolium (*temulentum*) ſpica ariſtata, ſpiculis compreſſis ariſtatis. Lin. 122.

Taumellůlch. Auf den Aeckern.

Gramen loliaceum anguſtiore folio et ſpica. C. Bauh. Scheuch.

Lolium (*perenne*) ſpica mutica, ſpiculis compreſſis multifloris. Lin. 122.

Perennirender Lůlch.

Gramen ſpicatum ariſtis pennatis. Tournef. Scheuch.

Gramen ſparteum pennatum. C. Bauh.

Stipa (*pennata*) ariſtis lanatis. Lin. 115.

Fedriges Pfriemengras. Auf den Bergen.

Gramen ſpicatum folio aſpero. C. Bauh. Scheuch.

Dactylis (*glomerata*) panicula ſecunda glomerata. Lin. 105.

Rauches Knaulgras. Auf den Wieſen, Aeckern und Rändern.

Gramen pratenſe ſpica flaueſcente. C. Bauh. Scheuch.

Gramen Anthoxanthum ſpicatum. I. Bauh.

Anthoxanthum (*odoratum*) ſpica ouato-oblonga, floſculis ſubpedunculatis ariſta longioribus. L. 40.

Gelbes Ruchgras. Auf den Wieſen.

Gra-

Digitized by Google

Gramen ſparteum iuncifolium. C. Bauh. Scheuch.
Nardus (*ſtricta*) ariſtis lanatis. Lin. 115.
Steifes Borſtgras. Auf dürren Anhöhen.
Gramen glumis variis. C. Bauh. Scheuch.
Cynoſurus (*coeruleus*) bracteis integris. Lin. 106.
Blaues Kammgras. Auf den Wieſen und Bergen.
Gramen pratenſe criſtatum ſ. ſpica criſtata laeui. C. Bauh. Scheuch.
Cynoſurus (*criſtatus*) bracteis pinnatifidis. Lin. 105.
Gefiedertes Kammgras. An der Elſter.
Gramen typhoides aſperum primum. C. Bauh. Scheuch.
Phalaris (*phleoides*) panicula cylindrica ſpiciformi. L. 80.
Fönichartiger Glanz, auf den Wieſen.
Gramen arundinaceum ſpicatum. C. Bauh. Gramen aquaticum paniculatum phalaridis ſemine. Scheuch.
Phalaris (*arundinacea*) panicula oblonga ventricoſa. Lin. 80.
Rohrglanz. An Teichen und der Elſter.
Gramen paniculatum folio variegato. C. Bauh.
Phalaris arundinacea picta. Lin.
In den Gärten.
Gramen ſpicatum ſemine miliaceo albo. Tournef.
Phalaris maior ſemine albo. C. Bauh.
Phalaris (*canarienſis*) panicula ſubouata ſpiciformi, glumis carinatis. Lin. 79.
Canarienſaamen. In den Gärten, bey Zeitz wild.
Gramen ſpicatum, ſpica cylindracea tenuiſſima longiore. Scheuch.
Alopecurus (*agreſtis*) culmo ſpicato erecto, glumis nudis. Lin. 89.
Fuchsſchwanz. Am Haynberge.
Gramen phalaroides maius ſ. italicum. C. Bauh.
Alopecurus (*pratenſis*) culmo ſpicato erecto, glumis villoſis. Lin. 89.
Wieſen-Fuchsſchwanz.
Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum. C. Bauh. Scheuch.

Digitized by Google

Alopecurus (*geniculatus*) culmo ſpicato infracto L. 89.
Knoten-Fuchsſchwanz. Auf den Wieſen und in Gräben.

Gramen typhoides maximum ſpica longiſſima. C. Bauh. Scheuch.
Phleum (*pratenſe*) ſpica cylindrica longiſſima, culmo recto. Lin. 87.

Gramen typhoides aſperum alterum. C. Bauh. Scheuch.
Phleum (*nodoſum*) ſpica cylindrica, baſi ſterili, culmo adſcendente, radice bulbifera. Lin. 87.
Knotiger Fönich.

Gramen dactylon ſpicis villoſis. C. Bauh. Scheuch.
Andropogon (*Iſchaemum*) ſpicis digitatis plurimis, floſculis feſſilibus, ariſtato muticoque, pedicellis lanatis. Lin. 1483.
Rauhes Flokgras. Bey Pforten.

Gramen murorum radice repente. C. Bauh. Gramen paniculatum radice repente, culmo compreſſo, locuſtis diſtichis pulchellis. Scheuch.
Poa (*compreſſa*) panicula ſecunda coarctata, culmo obliquo compreſſo. Lin. 101.
Berg-Viehgras. An Mauren.

Gramen pratenſe paniculatum maius (folio latiore.) C. Bauh. Scheuch.
Poa (*pratenſis*) panicula diffuſa, ſpiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. Lin. 99.
Fünfblüthiges Viehgras.

Gramen pratenſe paniculatum maius, anguſtiore folio. C. Bauh. Scheuch.
Poa (*anguſtifolia*) panicula diffuſa, ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti. Lin. 99.
Vierblüthiges Viehgras.

Gramen pratenſe paniculatum medium. C Bauh. Scheuch.
Poa (*triuialis*) panicula diffuſa, ſpiculis trifloris, baſi pubeſcentibus, culmo erecto tereti. Lin. 99.
Dreiblüthiges Viehgras.

Gramen pratenſe paniculatum minus. C. Bauh.

Poa

Digitized by Google

Poa (*annua*) panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. Lin. 99.
Sommer-Viehgras.

Gramen xerampelinum, miliacea, praetenui ramosaque sparsa panicula s. Xerampelino congener aruense aestiuum, gramen minutissimo semine. Lob. Scheuch.

Poa (*bulbosa α.*) panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris. Lin. 102.
Knolliges Viehgras. Nach Rubitz zu.

Gramen paniculatum angustifolium alpinum, locustis rarioribus et angustioribus non aristatis. Scheuch.

Poa (*nemoralis*) panicula attenuata, spiculis subbifloris mucronatis scabris, culmo incuruo. L. 102.
Wald-Viehgras.

Gramen palustre panieulatum altissimum. C. Bauh. Scheuch.

Poa (*aquatica*) panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. Lin. 98.
Wasser-Viehgras.

Gramen paniculatum elatius, spicis longis muticis. Vaill.

Festuca (*elatior*) panicula secunda erecta, spiculis subaridis exterioribus teretibus. Lin. 111.
Wiesenschwingel.

Gramen aquaticum fluitans multiplici spica. C. Bauh.

Festuca (*fluitans*) panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus, teretibus muticis. Lin. 111.
Manna, Schwingel. In Gräben.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore laxa spadicea, locustis maioribus. Scheuch.

Festuca (*rubra*) panicula secunda scabra, spiculis sexfloris aristatis, flosculo vltimo mutico, culmo semitereti. Lin. 109.
Rother Schwingel. Auf dürren Anhöhen.

Gramen foliis iunceis breuibus maius radice nigra. C. Bauh. Scheuch.

Festuca (*ouina*) panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. L. 108.

Digitized by Google

Schaafschwingel. An unbebauten sandigten und steinigten Orten.

Gramen pratense panicula duriore laxa vnam partem spectante. Scheuch.

Festuca (*duriuscula*) panicula secunda oblonga, spiculis sexfloris oblongis laeuibus, foliis setaceis. Lin. 108.

Harter Schwingel.

Gramen arundinaceum enode minus, syluaticum. C. Bauh. Scheuch.

Aira (*coerulea*) foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis conuoluto-subulatis. L. 95.

Blaue Schmielen. Auf feuchten Wiesen.

Gramen aquaticum miliaceum. Scheuch. Gramen caninum supinum paniculatum dulce. C. Bauh.

Aira (*aquatica*) foliis planis, panicula patente, floribus muticis laeuibus, calyce longioribus. L. 95.

Wasserschmielen.

Gramen segetum panicula arundinacea. C. Bauh. Scheuch.

Aira (*cespitosa*) foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque, arista recta breui. L. 96.

Auf den Wiesen.

Gramen nemorosum paniculis albis, capillaceo folio. C. Bauh. Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus, aristatis. Scheuch.

Aira (*flexuosa*) foliis setaceis culmis subnudis, panicula diuaricata, pedunculis flexuosis. Lin. 96.

Draatschmielen. An steinigten Gegenden.

Gramen paniculatum minimum molle. Scheuch.

Aira (*caryophyllea*) foliis setaceis, panicula diuaricata, floribus aristatis distantibus. Lin. 97.

Haferschmielen.

Gramen auenaceum capillaceum, minoribus glumis. C. Bauh. Gramen auenaceum paniculatum alpinum, foliis capillaceis breuibus, locustis purpureo-argenteis et aristatis. Scheuch.

Aira

Aira (*montana*) foliis ſetaceis, panicula anguſtata, floſculis baſi piloſis ariſtatis, ariſta tortili longiore. Lin. 96.

Bergſchmielen.

Gramen ſupinum caninum paniculatum, folio varians. C. Bauh.

Agroſtis (*canina*) calycibus coloratis, petalorum ariſta dorſali recurua, culmis proſtratis ſubramoſis. Lin. 92.

Braunes Straußgras. Auf den Wieſen.

Gramen ſegetum altiſſimum, panicula ſparſa. C. Bauh. Scheuch.

Agroſtis (*Spica venti*) petalo exteriore exſerente ariſtam rectam, ſtrictam longiſſimam. Lin. 91.

Acker-Strausgras.

Gramen montanum, panicula ſpadicea delicatiore. C. Bauh. Scheuch.

Agroſtis (*capillaris*) panicula capillari patente, calycibus ſubulatis aequalibus, hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. Lin. 93.

Haar-Strausgras. Auf den Wieſen.

Gramen pratenſe paniculatum molle. C. Bauh. Scheuch.

Holcus (*lanatus*) glumis bifloris villoſis, hermaphrodito mutico maſculo, ariſta recurua. Lin. 1485.

Wolligtes Darrgras.

Gramen tremulum maximum. C. Bauh. Scheuch.

Briza (*maxima*) ſpiculis cordatis, floſculis ſeptendecim. Lin. 103.

Großes Zittergras. In den Gärten.

Gramen tremulum minus, panicula parua. C. Bauh.

Briza (*minor*) ſpiculis triangulis, calyce floſculis longiore. Lin. 102.

Gramen tremulum maius. C. Bauh. Scheuch.

Briza (*media*) ſpiculis ouatis, calyce floſculis breuiore. Lin. 103.

Wieſen-Zittergras.

Gramen auenaceum montanum lanuginoſum. C. Bauh.

Melica

Melica (*ciliata*) floſculis inferioribus, petalo exteriore ciliato. Lin. 97.

Haariges Schöngras. An ſandigen Anhöhen.

Gramen montanum auenaceum, locuſtis rubris. C.Bauh.

Melica (*nutans*) petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici. Lin. 98.

Hangendes Schöngras.

Gramen ſyluaticum glabrum panicula recurua. Vaill.

Bromus (*giganteus*) panicula nutante, ſpiculis quadrifloris, ariſtis breuioribus. Lin. 114.

Großer Tresp. In Wäldern.

Gramen auenaceum panicula ſparſa, locuſtis maioribus et ariſtatis. Tournef. Scheuch.

Bromus (*ſterilis*) panicula patula, ſpiculis oblongis diſtichis, glumis ſubulato-ariſtatis. Lin. 113.

Wilder Tresp. Auf Aeckern.

Gramen ſpica brizae maius. C. Bauh. Gramen loliaceum corniculatum. Scheuch.

Bromus (*pinnatus*) ſpiculis alternis ſubſeſſilibus teretibus, culmo indiuiſo. Lin. 115.

Zittertresp.

Gramen auenaceum locuſtis villoſis anguſtis candicantibus et ariſtatis. Scheuch.

Bromus (*mollis*) panicula erectiuſcula, ſpicis ouatis, ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. Lin. 112.

Haarigter Tresp.

Feſtuca graminea, iuba effuſa. C. Bauh. Scheuch.

Bromus (*aruenſis*) panicula nutante, ſpiculis ouato-oblongis. Lin. 113.

Ackertresp.

Feſtuca graminea glumis hirſutis. C. Bauh. Scheuch.

Bromus (*ſecalinus*) panicula patente, ſpiculis ouatis, ariſtis rectis. Lin. 112.

Rockentresp.

Gramen arundinaceum panicula molli ſpadicea maius. C. Bauh. Scheuch.

Arundo

Arundo (*Calamagroſtis*) calycibus vnifloris, culmo ramoſo. Lin. 121.

Wieſenſchilf.

Arundo vulgaris ſ. phragmitis Dioſcoridis. C. Bauh. Scheuch.

Arundo (*Phragmites*) calycibus quinquefloris, panicula laxa. Lin. 120.

Rohrſchilf.

Frumentum indicum Mays dictum. C. Bauh.

Zea Mays. Lin. 1378.

Türkiſch Korn. In den Gärten.

Cyperus minimus panicula ſparſa nigricante. Scheuch.

Cyperus (*fuſcus*) culmo triquetro nudo, vmbella trifida, pedunculis ſimplicibus inaequalibus, ſpicis confertis linearibus. Lin. 69.

Braunes Cypergras. Auf der Pfortner Wieſe.

Cyperus minimus panicula ſparſa flaueſcente. Scheuch.

Cyperus (*flaueſcens*) culmo triquetro nudo, vmbella triphylla, pedunculis ſimplicibus inaequalibus, ſpicis confertis lanceolatis. Lin. 68.

Gelbes Cypergras.

Iuncus alpinus, capitulo lanuginoſo ſ. Schoenolagurus. C. Bauh. Scheuch.

Eriophorum (*vaginatum*) culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa. Lin. 76.

Sumpfdungras.

Gramen pratenſe tomentoſum, panicula ſparſa. C. Bauh. Linagroſtis panicula ampliore. Scheuch.

Eriophorum (*polyſtachion*) culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis. Lin. 76.

Wieſen Dungras.

Scirpus equiſeti capitulo maiori. Scheuch. Iuncus capitulis equiſeti maior. C. Bauh.

Scirpus (*paluſtris*) culmo tereti nudo, ſpica ſubouata terminali. Lin. 70.

Sumpfbinſen.

Scir-

Digitized by Google

Scirpus paluſtris altiſſimus. Scheuch. Iuncus maximus ſ. ſcirpus maior. C. Bauh.

Scirpus (*lacuſtris*) culmo tereti nudo, ſpicis ouatis pluribus, pedunculatis terminalibus. Lin. 72.

Teichbinſen.

Cyperus rotundus inodorus germanicus. C. Bauh.

Scirpus (*maritimus*) culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, ſpicularum ſquamis trifidis, intermedia ſubulata. Lin. 74.

Seebinſen. Bey Pforten und Domſpital.

Gramen cyperoides miliaceum. C. Bauh. Carex polycephalus ſ. paniculatus griſeus. Rupp. Gramen arundinaceum foliis acutiſſimis, panicula multiplici, cyperi facie. Loeſ.

Scirpus (*ſyluaticus*) culmo triquetro folioſo, vmbella folioſa, pedunculis nudis ſupra decompoſitis, ſpicis confertis. Lin. 15.

Waldbinſen.

Scirpus omnium minimus capitulo breuiore. Tournef. Scheuch.

Scirpus (*ſetaceus*) culmo nudo ſetaceo, ſpicis lateralibus, ſubſolitariis ſeſſilibus. Lin. 73.

Borſtbinſen. Bey dem Stadtholze.

Iuncus minimus ſpica breuiore ſquamoſa ſpadicea. Scheuch.

Scirpus (*acicularis*) culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ouata terminali biualui, ſeminibus nudis. Lin. 71.

An der Elſter und bey Koſchwitz.

Cyperus longus inodorus germanicus. C. Bauh. Pſeudo-Cyperus paluſtris, foliis et carina ſerratis. Scheuch.

Schoenus (*Mariſcus*) culmo tereti, foliis margine dorſoque aculeatis. Lin. 62.

Stachlichtes Knopfgras.

Gramen cyperoides anguſtiſolium ſpicis longis erectis.

C.

Digitized by Google

C. Bauh. Cyperoides veſicarium ſpicis viridantibus et ſubfuſcis. Scheuch.

Carex (*veſicaria*) ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. L. 1388.

Blaſigtes Riedgras. An ſumpfigten Gegenden.

Cyperoides polyſtachion flauicans, ſpicis breuibus prope ſummitatem caulis. Tournef. Pluk.

Carex (*palleſcens*) ſpicis pendulis, maſcula erecta, femineis ouatis imbricatis, capſulis confertis obtuſis, Lin. 1386.

Hangendes Riedgras.

Gramen cyperoides paluſtre aculeatum capitulo breuiore. Tournef. Scheuch.

Carex (*flaua*) ſpicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis maſcula lineari, capſulis acutis recuruis. Lin. 1384.

Gelbes Riedgras.

Cyperoides polyſtachion lanuginoſum. Morif.

Carex (*hirta*) ſpicis remotis, maſculis pluribus, femineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis. Lin. 1389.

Rauches Riedgras.

Cyperoides ſpica pendula breuiore. Scheuch.

Carex (*Pſeudo-Cyperus*) ſpicis pendulis, pedunculis geminatis. Lin. 1387.

Unächtes Cyperngras. Im Martinsgrunde.

Gramen cyperoides, foliis cariophyllaceis vulgatiſſimum. Rai.

Carex (*acuta nigra*) ſpicis maſculis pluribus, femineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis. Lin. 1388.

Gramen cyperoides ſpica ruffa. f. caule triangulo. C. Bauh.

Carex *acuta ruffa*. Lin. ib.

Spitziges Riedgras.

Gramen cyperoides paluſtre maius, ſpica compacta. C. Bauh.

Ca

Digitized by Google

Carex (*vulpina*) ſpica ſupra decompoſita, inferne laxiore, ſpiculis androgynis ouatis ſeſſilibus glomeratis, ſuperne maſculis. Lin. 1382.

An ſumpfigten Orten. Fuchsriedgras.

Gramen cyperoides ſpicatum minimum, ſpica diuulſa aculeata. Scheuch.

Carex (*muricata*) ſpiculis ſubouatis ſeſſilibus, remotis androgynis, capſulis acutis diuergentibus ſpinoſis. Lin. 1382.

Stacheliges Riedgras.

Cyperoides anguſtifolium, ſpicis ſeſſilibus in foliorum alis. Moriſ. Scheuch.

Carex (*remota*) ſpiculis ouatis ſubſeſſilibus, remotis androgynis, foliis caulinis culmum aequantibus. Lin. 1383.

Schmalblätteriges Riedgras.

Cyperoides montanum foliis anguſtis paruis, ſpica ſpadicea diuiſa. Scheuch.

Carex (*montana*) ſpicis femineis ſeſſilibus ſubſolitariis ouatis maſculae approximatis, culmo nudo, capſulis pubeſcentibus. Lin. 1385.

Berg-Riedgras.

Typha paluſtris maior. C. Bauh.

Typha (*latifolia*) foliis ſubenſiformibus, ſpica maſculafemineaque approximatis. Lin. 1377.

Teichkolben. Blüht im May bey Großdorf, Schippach und Pforten.

Sparganium ramoſum. C. Bauh.

Sparganium (*erectum*) foliis erectis triquetris. Lin. 1378.

Im Gräflichen Teiche bey Dientz.

Sparganium minimum. Rai.

Sparganium (*natans*) foliis decumbentibus planis. Linn. ib.

Bey der Cuba Mühle.

Digitized by Google

Acorus verus ſeu Calamus aromaticus officinarum. C. Bauh.
Acorus *Calamus vulgaris*. L. 462.
Kalmus. Bey Gros-Sara und Mittelpölnitz, auch zu Längenberg.

Sechzehnte Klaſſe.

Gewächſe mit einer unvollkommenen geballten Blüthe.

Beta communis viridis. C. Bauh.
Beta (*vulgaris Cicla* η.) caule erecto. Linn. 322.
Beta rubra vulgaris. C. Bauh. ſ. radice rapae.
Beta *vulgaris rubra* γ. Linn. ib.
Rothe Rüben.
Beta lutea maior. C. Bauh.
Beta vulgaris rubra δ. Linn. ib.
Beißkohl.
Spinacia vulgaris, capſula ſeminis aculeata. Tourneſ.
Spinacia (*Oleracea*) fructibus ſeſſilibus. Linn. 1456.
Spinat.
Lapathum hortenſe ſ. ſpinacia ſemine non ſpinoſo. C. Bauh.
Spinacia Oleracea β. Linn. ib.
Mercurialis teſticulata ſ. mas. C. Bauh.
Mercurialis (*annua*) caule brachiato, foliis glabris, floribus ſpicatis. Linn. 1465.
Mercurialis ſpicata ſ. femina. C. Bauh.
Mercurialis *annua* β. L. ib.
Bingelkraut.
Mercurialis montana teſticulata et ſpicata. C. Bauh.
Mercurialis (*perennis*) caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. Linn. ib.
Blüht mit jenen im May, am Haynberge.

Digitized by Google

Vrtica vrens maxima. C. Bauh.
Vrtica (*dioica*) foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis. Lin. 1396.
Groſſe brennende Neſſel.
Vrtica vrens minor. C. Bauh.
Vrtica (*vrens*) foliis oppoſitis oualibus. Linn. ib.
Eyter-Neſſel.
Vrtica vrens pilulas ferens, C. Bauh.
Vrtica (*pilulifera*) foliis oppoſitis ouatis ſerratis, amentis fructiferis globoſis. Lin. 1359.
Römiſche Neſſeln.
Vrtica foliis profunde laciniatis, ſemine lini. Amman.
Vrtica (*cannabina*) foliis oppoſitis tripartitis inciſis. Lin. 1396.
Hohe Siberiſche Neſſel. Im Genzeliſchen Garten.
Cannabis Satiua C. Bauh. ſ. mas. I. Bauh.
Cannabis erratica. C. Bauh. ſ. femina. I. Bauh.
Cannabis *ſatiua*. Lin. 1457.
Lupulus mas et femina. C. Bauh.
Humulus *Lupulus*. Lin. 1457.
Hopfen.
Ricinus vulgaris. C. Bauh.
Ricinus (*communis*) foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis. Lin. 1430.
Wunderbaum.
Buxus arboreſcens. C. Bauh.
Buxus *ſemperuirens arboreſcens*. Lin. 1395.
Buxbaum.
Buxus foliis rotundioribus. C. Bauh.
Buxus ſemperuirens ſuffruticoſa. L. ib.
Gemeiner Buxbaum.
Caſtanea ſatiua. C. Bauh.
Fagus (*Caſtanea* β.) foliis lanceolatis acuminato-ſerratis ſubtus nudis. Lin. 1416.
Im Krauſiſchen Garten.
Caſtanea ſatiua (fructu maiori).
Eine Varietät. Maronen. Im Geimſiſchen Garten.

Fagus

Digitized by Google

Fagus. C. Bauh.

Fagus (*syluatica*) foliis ouatis obsolete serratis. Linn. ib.

Quercus latifolia mas, quae breui pedicello est. C. Bauh.

Quercus (*robur*) foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinubus acutioribus, angulis obtusis. Lin. 1414.

Eiche.

Quercus altera tenerius dissecta. Rupp.

Man s. des Hn von Münchhausen Hausvater 5ten Theil S. 149. Linné rechnet sie mit zu iener.

Am Haynberge.

Nux iuglans, siue Regia vulgaris. C. Bauh.

Iuglans (*regia*) foliolis oualibus glabris subserratis subaequalibus. Lin. 1415.

Welscher Nußbaum, Wallnußbaum.

Iuglans (*nigra*) foliolis quindenis lanceolatis serratis, exterioribus minoribus, gemmulis super axillaribus. Lin. 1415.

Im Herrschaftlichen Garten. Schwarzer Wallnußbaum.

Corylus satiua, fructu albo maiore, siue vulgaris. C. Bauh.

Corylus (*Auellana* β.) stipulis ouatis obtusis, L. 1417.

Haselnüsse, Lambertsche Nüsse.

Corylus satiua, fructu rotundo maximo. C. Bauh.

Corylus (Auellana γ.) Lin. ib.

Zellernüsse.

Corylus sylueſtris. C. Bauh.

Corylus Auellana α. Lin. ib.

Wilde Haselnüsse. Blühn im Februar.

Carpinus. Dodon.

Carpinus (*Betulus*) squamis strobilorum planis. Lin. 1416.

Steinbuche. Blüht im April und May.

Digitized by Google

Alnus rotundifolia, glutinoſa, viridis. C. Bauh.
Betula (*Alnus glutinoſa*) pedunculis ramoſis. L. 1394.
Gemeine Eller oder Erle.

Alnus folio incano. C. Bauh.
Betula *Alnus incana*. L. ib.
Bey Waltershauſen und Gotha. Weiſſe Eller oder Erle.

Betula. C. Bauh.
Betula (*alba*) foliis ouatis acuminatis ſerratis. Linn. 1393.
Birke. Blüht im May und Junio

Vlmus campeſtris et Theophraſti. C. Bauh.
Vlmus (*campeſtris*) foliis duplicato-ſerratis, baſi inaequalibus. Lin. 327.
Gemeine Ulme, Ilme, Rüſter.

Vlmus carpini folio, ſeu cortice arboris albido. Rup.
Iſt eine Varietät. Stehet bey Groſſe.

Salix vulgaris alba, arboreſcens. C. Bauh.
Salix (*alba*) foliis lanceolatis acuminatis ſerratis vtrinque pubeſcentibus, ſerraturis infimis glanduloſis. Lin. 1449.
Gemeine weiſſe Weide. Am Haynberge.

Salix vulgaris nigricans, folio non ſerrato. C. Bauh.
Salix (*purpurea*) foliis ſerratis glabris lanceolatis, inferioribus oppoſitis. Lin. 1444.
Rothe Weide, Bandweide. An der Elſter.

Salix vulgaris rubens. C. Bauh.
Salix (*pentandra*) foliis ſerratis glabris, floſculis pentandris. Lin. 1442.
Lorbeerblätterige Bergweide, Faulweide, Schaf-Stechweide.

Salix ſatiua lutea, folio crenato. C. Bauh.
Salix (*Vitellina*) foliis ſerratis ouatis, acutis glabris, ſerraturis cartilagineis, petiolis calloſo-punctatis. Linn. 1442.
Gelbe Weide, Goldweide, Dotterweide. Bey groß und klein Sara.

Digitized by Google

Salix folio amygdalino, vtrinque virente, aurito. C. Bauh.

Salix (*amygdalina*) foliis ſerratis glabris, lanceolatis petiolatis, ſtipulis trapeziformibus. Linn. 1443.

Weide mit Mandelblättern. An der Elſter.

Salix folio auriculato ſplendente, flexilis. Raii.

Salix (*triandra*) foliis ſerratis glabris, floribus triandris. Lin. 1442.

Buſchweide, Kerb-Erdweide. Am Mühlgraben.

Salix oblongo, incano, acuto folio. C. Bauh.

Salix (*Viminalis*) foliis ſubintegerrimis, lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis. Lin. 1448.

Uferweide, Seilweide, Fiſcher- oder Haarweide. An der Elſter bey der großen Brücke.

Salix humilis anguſtifolia. C. Bauh.

Salix (*rosmarinifolia*) foliis integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis. Linn. ib.

Rosmarin- oder Krebsweide, Gielweide. Im Schinder-Weidig.

Salix humilis capitulo ſquamoſo. C. Bauh.

Salix (*Helix*) foliis ſerratis glabris lanceolato-linearibus, ſuperioribus oppoſitis obliquis. L. 1444.

Bachweide, Sandweide, Roſenweide. Am Haynberge.

Salix latifolia rotunda. C. Bauh.

Salix (*Caprea*) foliis ouatis rugoſis, ſubtus tomentoſis, vndatis, ſuperne denticulatis. Lin. 1448.

Söhlweide, Sahlweide, Palmweide.

Salix fragilis. C. Bauh.

Salix (*fragilis*) foliis ſerratis glabris, ouato-lanceolatis, petiolis dentato-glanduloſis. Lin. 1443.

Glasweide, Sprokweide, Bruchweide, Roßweide, Felber. Am Haynberge

Populus alba, maioribus foliis. C. Bauh.

Digitized by Google

Populus (*alba*) foliis ſubrotundis dentato-angulatis, ſubtus tomentoſis. Linn. 1463.

Im Genzeliſchen Garten. Weiſſe Pappel.

Populus nigra. C. Bauh.

Populus (*nigra*) foliis deltoidibus acuminatis ſerratis. Lin. 1464.

Schwarzer Pappelbaum, Pappelweide.

Populus *nigra* Italica. Munchhauſ. 230.

Eine Varietät von dieſer. Im Herrſchaftlichen Garten.

Populus tremula. C. Bauh.

Populus (*tremula*) foliis ſubrotundis dentato-angulatis, vtrinque glabris. L. ib.

Alſpe, Eſpe, Zitterpappel. Am Haynberge.

Fraxinus excelſior. C. Bauh.

Fraxinus (*excelſior*) foliolis ſerratis, floribus apetalis. L. 1509.

Aſche, Eſche. Im Saugraben.

Abies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante. Tournef.

Pinus (*picea*) foliis ſolitariis emarginatis. L. 1420.

Weiſſe Tanne.

Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo. Tourn.

Pinus (*Abies* β.) foliis ſubulatis *mucronatis laeuibus* bifariam verſis. L. 1421.

Rothe Tanne.

Larix. C. Bauh.

Pinus (*Larix*) foliis faſciculatis obtuſis. L. 1420.

Lerchenbaum. Im Geimſiſchen und Genzeliſchen Garten.

Pinus ſatiua. C. Bauh.

Pinus (*pinea*) foliis geminis, primordialibus ſolitariis ciliatis. Lin. 1419.

Im Geimſiſchen Garten. Zahme Pinus, Pignolenbaum.

Pinus ſylueſtris. C. Bauh.

Pinus (*ſylueſtris*) foliis geminis, primordialibus ſolitariis glabris. Lin. 1418.

Pinus

Kühnbaum, Fichte, Kiefer, gemeine Föhre oder Fohre.

Cupreſſus. C. Bauh.

Cupreſſus (*Semperuirens*) foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. L. 1422.

Cupreſſe.

Cupreſſus nana marina, fructu coeruleo paruo. Pluk.

Cupreſſus (*Thyoides*) foliis imbricatis, frondibus ancipitibus. Lin. 1422.

Im Herrſchaftlichen Garten.

Thuia Theophraſti. C. Bauh. ſ. arbor vitae. Cluſ.

Thuia (*occidentalis*) ſtrobilis laeuibus, ſquamis obtuſis. Lin. 1421.

Lebensbaum.

Sabina folio Tamariſci Dioſcoridis. C. Bauh.

Iuniperus (*Sabina* β.) foliis oppoſitis erectis decurrentibus, oppoſitionibus pyxidatis. Lin. 1472.

Sadebaum. In den Gärten.

Iuniperus vulgaris fruticoſa. C. Bauh.

Iuniperus (*communis*) foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. Lin. 1470.

Wacholderſtaude.

Iuniperus vulgaris arbor. C. Bauh.

Iuniperus *communis* β. Linn. ib.

Taxus C. Bauh.

Taxus (*baccata*) foliis approximatis. Lin. 1472.

An der Straße nach Schleitz und bey Rudolſtadt.

Lentiſcus vulgaris. C. Bauh.

Piſtacia (*lentiſcus*) foliis abrupte pinnatis, foliolis lanceolatis. Lin. 1455.

Maſtixbaum. In einigen Gärten.

Morus fructu nigro. C. Bauh.

Morus (*nigra*) foliis cordatis ſcabris. Lin. 1398.

Schwarzer Maulbeerbaum.

Morus fructu albo. C. Bauh.

Morus (*alba*) foliis oblique cordatis laeuibus. L. ib.

Weiſſer Maulbeerbaum.

Digitized by Google

Morocarpos maior et minor. Rup. Atriplex ſyluestris fructu Mori. C. Bauh.

Blitum (*virgatum*) capitellis ſparſis lateralibus. L. 7.

Erdbeer-Spinat.

Chenopodium, pes anſerinus. I. Tabern. Atriplex ſyluestris latifolia. C. Bauh.

Chenopodium (*rubrum*) foliis cordato-triangularibus obtuſiuſculis dentatis, racemis erectis compoſitis folioſis caule breuioribus. Lin. 318.

Wilde Melte.

Chenopodium folio ſinuato candicante. Tournef.

Chenopodium (*album*) foliis rhomboideo-triangularibus eroſis, poſtice integris, ſummis oblongis, racemis erectis. Lin. 319.

Chenopodium foetidum. Tournef. Vuluaria. *Dalech.*

Chenopodium (*Vuluaria*) foliis integerrimis rhombeo-ouatis, floribus conglomeratis axillaribus. Lin. 321.

Stinkende Melte. An Mauren.

Chenopodium latifolium minus ramoſum, florum petiolis longiſſimis, ex foliorum alis confertim enaſcentibus. v. Haller.

Chenopodium (*vrbicum*) foliis triangularibus ſubdentatis, racemis confertis ſtrictiſſimis, cauli approximatis longiſſimis. L. 318.

Auf alten Schutthaufen und Mauren.

Chenopodium folio triangulo. Tournef. Bonus Henricus. I. Bauh.

Chenopodium (*Bonus-Henricus*) foliis triangulari-ſagittatis integerrimis, ſpicis compoſitis aphyllis. Lin. ib.

Chenopodium Betae folio. Tournef. Blitum polyſpermum. C. Bauh.

Chenopodium (*polyſpermum*) foliis integerrimis ouatis, caule decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus. Lin. 321.

Stauderich.

Che-

Digitized by Google

Chenopodium ſuaueolens, foliis quernis. Tournef.
Botrys ambroſioides vulgaris. C. Bauh.
Chenopodium (*Botrys*) foliis oblongis ſinuatis, racemis nudis multifidis. Lin. 320.
Traubenkraut.
Chenopodium lini folio villoſo. Tournef. Linaria ſcoparia. C. Bauh.
Chenopodium (*Scoparia*) foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis. Lin. 321.
In einigen Gärten. Blühen zuſammen im Junio und Julio.
Herniaria glabra. I. Bauh.
Herniaria (*glabra*) herbacea. Lin. 317.
Bruchkraut. An der Elſter.
Parietaria officinarum et Dioſcoridis. C. Bauh.
Parietaria (*officinalis*) foliis lanceolato-ouatis alternis. Lin. 1492.
Glaßkraut. Bey dem alten Schloſſe. Blühet im May und Junio.
Atriplex hortenſis alba, ſiue pallide virens. C. Bauh.
Atriplex (*hortenſis*) caule erecto herbaceo, foliis triangularibus. Lin. 1493.
Atriplex hortenſis rubra. C. Bauh.
Atriplex (*hortenſis* β.) Lin. ib.
Melte.
Atriplex ſylueſtris fructu roſeo compreſſo. C. Bauh.
Atriplex (*roſea*) caule herbaceo, foliis incanis ſerratis, fructibus quadrangularibus dentatis. Lin. ib.

Siebzehente Klaſſe.

Gewächſe mit verborgener Fruktifikation.

I.

Farrenkräuter.

Melipteris. Dioſcoridis.
Filix ramoſa maior pinnulis obtuſis non dentatis. C. Bauh.

Digitized by Google

Pteris (*aquilina*) frondibus ſupra decompoſitis, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. Lin. 1533.

Im Holze auf dem Haynberge.

Thelypteris paluſtris non ramoſa. Rupp.

Acroſtichum (*Thelypteris*) frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis integerrimis. Lin. 1528.

Im Martinsgrunde und hinter dem Unterhauſe.

Filix ramoſa minor, pinnulis dentatis. C. Bauh.

Polypodium (*Dryopteris*) frondibus ſupra-decompoſitis, foliolis ternis binnatis. Lin. 1555.

Am Haynberge.

Filix mas, non ramoſa dentata. C. Bauh.

Polypodium (*Filix mas*) frondibus bipinnatis, pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. Lin. 1551.

Im Grunde hinter Päppeln, nach Jenſee.

Filix non ramoſa, petiolis tenuiſſimis et tenuiſſime dentatis. C. Bauh.

Polypodium (*Filix femina*) frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. L. 1551.

An der Mauer im Schloßgraben.

Filix rhaetica tenuiſſime denticulata. I. Bauh.

Filicula fontana maior ſ. Adianthum *album filicis* folio. C. Bauh.

Polypodium (*rhaeticum*) frondibus bipinnatis, foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ferraturis acuminatis. Lin. 1552.

Im Grunde hinter Päppeln, am Schmiedeliſchen Wäldgen.

Filix ſaxatilis non ramoſa, nigris maculis punctata. C. Bauh.

Polypodium (*fragile*) frondibus bipinnatis, foliolis remotis, pinnis ſubrotundis inciſis. L. 1553.

Bey Rotha.

Filicula fontana minor. C. Bauh.

Polypodium (*fontanum*) frondibus ſubbipinnatis lan-

lanceolatis, foliolis subrotundis argute incisis, stipite laeui. Lin. 1550.

Bey Mühlsdorf, im Wasser.

Adianthum foliis longioribus puluerulentis, pediculo nigro. C. Bauh. Dryopteris nigra. Dod.

Asplenium (*Adiantum nigrum*) frondibus subtripinnatis, foliolis alternis, pinnis lanceolatis inciso-serratis. Lin. 1541.

Filicula saxatilis corniculata. C. Bauh.

Acrostichum (*septentrionale*) frondibus nudis linearibus laciniatis. Lin. 1524.

Am Felsen des Bergschlosses bey Weida.

Trichomanes seu Polytrichum officinarum. C. Bauh.

Asplenium (*Trichomanes*) frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis. Lin. 1540.

Bey Roschitz, bey Wachholderbüschen, und nach Bernsdorf.

Polypodium vulgare. C. Bauh.

Polypodium (*vulgare*) frondibus pinnatifidis, pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. Lin. 1544.

Am Haynberge.

Spicant Tragi et Germanorum. Rupp. Lonchitis minor. C. Bauh.

Osmunda (*Spicant*) frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integerrimis parallelis. Lin. 1522.

Bey Schefreisen im Walde.

Phyllitis. Cammer. Lingua Ceruina officinarum. C. Bauh.

Asplenium (*Scolopendrium*) frondibus simplicibus, cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis. Lin. 1537.

In den Gärten.

Lingua ceruina multifido folio. C. Bauh.

Asplenium *Scolopendrium* ε.

Asplenium s. Ceterach officinarum. C. Bauh.

Asple-

Digitized by Google

Asplenium (*Ceterach*) frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus. L. 1538.

In Ehrich an den Mauern.

Ruta muraria. C. Bauh.

Asplenium (*Ruta muraria*) frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis Lin. 1541.

An der Unterhäusischen Kirche, und im Schreiberischen Garten.

Lunaria racemosa minor et vulgaris. C. Bauh.

Osmunda (*Lunaria*) scapo caulino solitario, fronde pinnata solitaria. Lin. 1519.

Hinter Pforten, bey Mühlsdorf und Nextenitz.

Lunaria racemosa, ramosa maior. C. Bauh.

Osmunda *Lunaria* β. Lin. ib.

Bey Ottendorf.

Ophioglossum vulgatum. C. Bauh.

Ophioglossum (*vulgatum*) fronde ouata. Lin. 1518.

Bey Mühlsdorf und auf den Wiesen nach Dieschitz.

Equisetum palustre longioribus setis. C. Bauh.

Equisetum (*fluuiatile*) caule striato, frondibus subsimplicibus. Lin. 1517.

In der Lache bey dem Schinder-Weidig und bey Dieschitz.

Equisetum syluaticum tenuissimis setis. C. Bauh.

Equisetum (*syluaticum*) caule spicato, frondibus compositis. Lin. 1516.

Im Martinsgrunde.

Equisetum palustre breuioribus setis. C. Bauh.

Equisetum (*palustre*) caule angulato, frondibus simplicibus. Lin. ib.

Auf den sumpfigten Wiesen bey Pforten.

Equisetum palustre minus polystachion. C. Bauh.

Equisetum *palustre* β. Lin. ib.

Auf der Wiese bey dem Rathsteiche.

Equisetum aruense longioribus setis. C. Bauh.

Equi-

Digitized by Google

Equiſetum (*aruenſe*) ſcapo fructificante nudo, ſterili frondoſo. Lin. ib.

Kannenkraut.

Equiſetum foliis nudum non ramoſum. C. Bauh.

Equiſetum (*hyemale*) caule nudo ſcabro, baſi ſubramoſo. Lin. 1517.

Schachtelhalmen. Bey Weida und Schlefreiſen.

2.

Mooße.

Lycopodium vulgare piloſum anfragoſum et repens. Dill.

Lycopodium (*clauatum*) foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. L. 1564.

Im Gräflichen Walde nach Frankenthal, und im Schmiedeliſchen Holze.

Lycopodium elatius iuniperinum, clauis ſingularibus ſine pediculis. Dill.

Lycopodium (*annotinum*) foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. Lin. 1566.

Im Martinsgrunde.

Lycopodium ſabinae facie. Dillen.

Lycopodium (*alpinum*) foliis quadrifariam imbricatis acutis, ſurculis erectis dichotomis, ſpicis ſeſſilibus teretibus. L. 1567.

Im Walde nach Gräz und Ottendorf.

Selago vulgaris Abietis rubrae facie. Dillen.

Lycopodium (*Selago*) foliis ſparſis octifariis, caule dichotomo erecto, faſtigiato, floribus ſparſis. Lin. 1565.

Im Walde nach Roda und Kahle.

Selaginoides foliis ſpinoſis. Dillen. Muſcus apocarpus ſyluaticus ceſpitoſus, capitulis craſſis virentibus. Rupp. p. 387.

Lycopodium (*Selaginoides*) foliis ſparſis ciliatis lanceo-

Digitized by Google

ceolatis, ſpicis ſolitariis terminalibus foliosis. Lin. 1565.

Im Thale des Haynberges und zu Anfang des Martingrundes.

Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis cymbiformibus. Dill.

Sphagnum (*paluſtre*) ramis deflexis. Linn. 1569.

Im Walde des Haynberges auf feuchten Gegenden.

Sphagnum paluſtre molle deflexum, ſquamis capillaceis. Dill.

Sphagnum *paluſtre* β. Lin. ib.

Zu Ende des Martingrundes, nach Wünſchen Bernsdorf.

Sphagnum acaulon bulbiforme maius. Dill.

Phaſcum (*acaulon*) anthera ſeſſili, foliis ouatis acutis conniuentibus. Lin. 1570.

Auf ſteinigten Aeckern.

Sphagnum acaulon bulbiferum minus. Dill.

Phaſcum acaulon β. Linn. ib.

Sphagnum acaulon trichodes. Dill.

Phaſcum (*ſubulatum*) acaule, anthera ſeſſili, foliis ſubulato-ſetaceis patulis. Linn. *ib.*

Fontinalis triangularis maior complicata, e foliorum alis capſulifera. Dill.

Fontinalis (*antipyretica*) foliis complicato-carinatis, trifariis acutis, antheris lateralibus. Linn. 1571.

Im Grunde, wohnweit Weisbach, und in dem Bache, ſo von Friesnitz nach Weida geht.

Muſcus ſquamoſus, Linariae folio, maior et criſpus. Tourn.

Fontinalis (*pennata*) foliis bifariis patentibus, capſulis lateralibus. Lin. 1571.

Polytrichum quadrangulare vulgare, yuccae foliis ſerratis. Dill. Polytrichum aureum maius. C. Bauh.

Polytrichum (*commune*) caule ſimplici, anthera parallelepipeda. Lin. 1573.

Poly-

Digitized by Google

Polytrichum quadrangulare, Iuniperi foliis breuioribus et rigidioribus. Lin.
Polytrichum *commune* β. ib.
Mit jenen im Stadtholze.

Polytrichum nanum, capsulis subrotundis galeritis, Aloes folio non serrato. Dillen.
Mnium (*Polytrichoides*) calyptra villosa. Lin. 1576.
Im Martinsgrunde.

Bryum dendroides polycephalon Phyllitidis folio vndulato pellucido, capsulis ouatis pendulis. Dill.
Mnium (*Serpyllifolium vndulatum*) pedunculis aggregatis, foliis oblongis vndulatis. Lin. 1578.
An Zäunen, auf den Wiesen und in Weinbergen.

Bryum pendulum serpylli folio rotundiore pellucido, capsulis ouatis. Dillen.
Mnium (*Serpyllifolium punctatum*) pedunculis aggregatis, foliis obouatis integerrimis, obtusis punctatis. Lin. 1577.
Auf den Wiesen.

Bryum bulbiforme aureum, calyptra quadrangulari, capsulis pyriformibus nutantibus. Dill.
Mnium (*hygrometricum*) acaule, anthera nutante, turbinato-ouata, calyptra reflexa quadrangulari. Lin. 1575.
Im Stadtholze auf Stämmen.

Bryum pendulum foliis variis pellucidis, capsulis ouatis. Dillen.
Mnium (*Serpyllifolium cuspidatum*) pedunculis aggregatis, foliis alternis acutis serratis. Lin. ib.
Auf feuchten Feldern.

Bryum stellare nitidum pallidum, capsulis tenuissimis Dill.
Mnium (*setaceum*) antheris erectis, operculis filiformibus longitudine antherarum.
An Mauern.

Sphagnum subhirsutum obscure virens, capsulis rubellis. Dill.

Bryum

Digitized by Google

Bryum (*Apocarpum*) antheris ſeſſilibus terminalibus calyptra minima. Lin. 1579.

An bergigten Orten.

Sphagnum nodoſum, hirſutum incanum. Dill.

Bryum apocarpum β. Lin. ib.

Polytrichum Bryi ruralis facie, capſulis ſubſeſſilibus minus. Dill.

Bryum (*ſtriatum* β.) antheris ſubſeſſilibus ſparſis, calyptris ſtriatis ſurſumue piloſis. Lin. 1579.

An alten Steinbrüchen und Mauern.

Polytrichum capillaceum criſpum, calyptris acutis piloſiſſimis. Dill.

Bryum *ſtellatum* δ. L. 1380.

An Bäumen im Haynberge.

Bryum albidum et glaucum fragile maius, foliis erectis, ſetis breuibus. Dill.

Bryum (*glaucum*) antheris erectiuſculis, operculo arcuato, foliis erectis imbricatis, ſurculis ramoſis. Lin. 1582.

In Zauffens Graben.

Bryum capillaceum, capſulis ſphaericis. Dill.

Bryum (*pomiforme*) antheris erectis ſphaericis. L. 1580.

In Wäldern.

Bryum phyllidis folio rugoſo acuto, capſulis incuruis. Dillen.

Bryum (*vndulatum*) antheris erectiuſculis, pedunculis ſubſolitariis, foliis lanceolatis carinatis, vndulatis patentibus ſerratis. Lin. 1582.

Im Martinsgrunde.

Bryum exiguum creberrimis capſulis rufis. Dill.

Muſcus capillaceus omnium minimus. Vaill.

Bryum (*trunculatum*) antheris erectis, ſubrotundis, operculo mucronato. Lin. 1584.

Bryum capillaceum et breue, pallide et laete virens, capſulis ouatis. Dill.

Bryum (*viridulum*) antheris erectis ouatis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. L. 1584.

An

Digitized by Google

An feuchten Orten.

Bryum tegulare humile pilosum et incanum. Dill.

Bryum (*murale*) antheris erectis, foliis piliferis rectiusculis, furculis simplicibus caespidosis. Lin. 1581.

Auf Dächern und Mauern.

Bryum calyptra extinctoria forma, minus. Dill.

Bryum (*extinctorium*) anthera erecta oblonga minori, calyptris laxis aequalibus. Lin. 1581.

An Mauern und trockenen Aeckern.

Bryum calyptra extinctorii forma, maius et ramosum. Dill.

Bryum (*extinctorium*) β. Lin. ib.

Im Stadtholze und anderwerts.

Bryum serpyllifolium pellucidum, capsulis pyriformibus. Dill.

Bryum (*Pyriforme*) antheris erectis obouatis, calyptra subulata, furculis acaulibus, foliis ouatis muticis. Lin. 1580.

An Wiesen und in Furchen der Aecker.

Bryum foliis latiusculis congestis, capsulis longis nutantibus. Dillen.

Bryum (*capillare*) antheris pendulis, foliis ouatis setiferis carinatis, pedunculis longissimis. Lin. 1586.

Im Stadtholze.

Bryum orbiculare puluinatum hirsutie canescens, capsulis immersis. Dill.

Bryum (*puluinatum*) antheris subrotundis, pedunculis reflexis, foliis piliferis. Lin. 1586.

Auf Mauern.

Bryum pendulum ouatum caespiticium et pilosum seta bicolori. Dill.

Bryum (*caespiticium*) antheris pendulis, foliis lanceolatis acuminato-setaceis, pedunculis longissimis. Lin. 1586.

An Aeckern und Mauern.

Digitized by Google

Hypnum filicinum, tamariſci foliis minoribus non ſplendentibus. Dill. Muſcus filicinus maior. C. Bauh.

Hypnum (*proliferum*) ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. Lin. 1590.

Im Stadtwalde, an Wurzeln und Stämmen der Bäume.

Hypnum filicinum, criſtam caſtrenſem repr[illegible]. Dillen.

Hypnum (*Criſta caſtrenſis*) ſurculis pinnatis, ramulis approximatis, apicibus recuruis. Lin. 1591.

Am Haynberge.

Hypnum filicinum tamariſci foliis maioribus ſplendentibus. Dillen.

Hypnum (*parietinum*) ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. Lin. 1591.

Hypnum dendroides ſericeum, ſetis et capſulis longioribus erectis. Dillen.

Hypnum (*dendroides*) ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſimpliciuſculis, antheris erectis. Lin. 1593.

Auf dem Haynberge.

Hypnum denticulatum pennatum, pinnulis duplicatis recuruis. Dillen.

Hypnum (*denticulatum*) fronde pinnata ſimplici, pinnis duplicatis, baſi pedunculifera. L. 1588.

Im Stadtholze.

Hypnum pennatum compreſſum et ſplendens, capſulis ouatis. Dillen.

Hypnum (*complanatum*) fronde pinnata ramoſa, foliis imbricatis acutis, complicatis compreſſis. Lin. 1588.

Im Stadtholze und anderwärts, an Stämmen der Bäume.

Hypnum taxiforme minus, baſi capſulifera. Dillen.

Hypnum (*taxifolium*) fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata, baſi pedunculifera. Lin. 1587.

Hypnum

Digitized by Google

Hypnum taxiforme exiguum, verſus ſummitatem capſuliferum. Dillen.

Hypnum (*bryoides*) fronde ſimpliciſſima pinnata lanceolata, apice pedunculifera, Lin. 1588.

Hypnum taxiforme paluſtre ramoſum maius et erectum. Dill.

Hypnum (*adiantoides*) fronde pinnata ramoſa erecta, medio pedunculifera. Lin. 1588.

Hinter dem Schloſſe, im Grunde nach Fenſee.

Hypnum dentatum vulgatiſſimum operculis obtuſis. Dillen.

Hypnum (*rutabulum*) ramis vagis ſubrepentibus, foliolis ouatis mucronatis imbricatis. Lin. 1590.

In den Gärten und an andern Orten.

Hypnum repens, triangularibus reflexis foliis, maius. Dillen.

Hypnum (*Squarroſum*) ramis vagis, foliis ouatis apice ſubulatis vndique reflexis. Lin. 1593.

In Grasgärten.

Hypnum cupreſſiforme vulgare foliis obtuſis. Dill.

Hypnum (*purum*) ſurculis pinnato-ſparſis ſubulatis, foliis ouatis, obtuſis conniuentibus. L. 1594.

Auf den Wieſen und in dem Grunde hinter Päppeln.

Hypnum myoſuroides tenuius, capſulis nutantibus. Dillen.

Hypnum (*myoſuroides*) ſurculis ramoſiſſimis, ramis ſubulatis, vtrinque attenuatis teretibus. L. 1596.

Im Herrſchaftlichen Walde, am Fuße der Bäume.

Hypnum cupreſſiforme rotundius, vel illecebrae aemulum. Dill.

Hypnum (*illecebrum*) ſurculis ramisque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis. Lin. 1594.

Hypnum luteſcens, alis ſubulatis tenacibus. Dillen.

Hypnum (*Abietinum*) ſurculis pinnatis teretiuſculis remotis inaequalibus. Lin. 1591.

In den Gärten und bey Nauliz im Holze.

Digitized by Google

Hypnum dendroides obſcurius, ſetis et capſulis breuioribus ſubnutantibus. Dillen.

Hypnum (*alopecurum*) ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiuiſis, antheris ſubnutantibus. Lin. 1594.

Hypnum vulgare triangulum maximum et pallidum. Dillen.

Hypnum (*triquetrum*) ramis vagis recuruis, foliis ouatis, recuruatis patulis. Lin. 1589.

Auf der Pfortner Wieſe und am Haynberge.

Hypnum vulgare ſericeum recuruum, capſulis erectis cuſpidatis. Dillen.

Hypnum (*ſericeum*) ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, antheris erectis. Lin. 1595.

Hypnum trichodes ſerpens, ſetis et capſulis longis erectis. Dillen.

Hypnum (*ſerpens*) ſurculis repentibus, ramis filiformibus, foliis obliteratis. Lin. 1596.

In Wäldern.

3.

Aftermooße.

Lichenaſtrum Aſplenii facie, pinnis laxioribus. Dill.

Iungermannia (*aſplenioides*) frondibus ſimpliciter pinnatis, foliolis ouatis ſubciliatis. Lin. 1597.

Im Martinsgrunde und in der Gegend nach Fenſee.

Lichenaſtrum Aſplenii facie, pinnis confertioribus. Dillen.

Iungermannia *aſplenioides* β. Lin. ib.

Ebendaſelbſt und am Fuße des Haynberges.

Lichenaſtrum auriculatum, pinnulis anguſtis planis recuruis. Dill.

Iungermannia (*albicans*) frondibus ſupra bipinnatis apice

Digitized by Google

apice floriferis, foliolis linearibus recuruatis. Lin. 1599.

Lichen petraeus latifolius seu Hepatica fontana. C. Bauh.

Marchantia (polymorpha) calyce communi decemfido. Lin. 1603.

Am Pfortner Bache und hinter dem Unterhause.

Lichen petraeus stellatus. C. Bauh.

Marchantia *polymorpha β.* ib. Lin.

Lichen petraeus vmbellatus. C. Bauh.

Marchantia polymorpha γ. L. ib.

Bey Sara und Geisen, und in dem gefaßten Brunnen bey Mühlsdorf.

Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiferis. Dill. Muscus pulmonarius. C. Bauh.

Lichen (*pulmonarius*) foliaceus laciniatus obtusus glaber, supra lacunosus, subtus tomentosus. Lin. 1612.

Im Gräflichen Walde an alten Buchen.

Lichenoides longifolium rugosum rigidum. Dill.

Lichen (*fraxineus*) foliaceus erectus oblongus lanceolatus sublaciniatus lacunosus glaber, scutellis subpedunculatis. Lin. 1614.

Lichenoides cornutum, bronchiale molle subtus incanum. Dill.

Lichen (*prunastri*) foliaceus erectiusculus lacunosus, subtus tomentosus albus. Lin. 1614.

An verschiedenen Bäumen.

Lichenoides digitatum cinereum, lactucae foliis sinuosis. Dillen.

Licheu (*caninus*) foliaceus repens lobatus obtusus planus, subtus venosus, villosus, pelta marginali adscendente. Lin. 1616.

Lichenoides digitatum laete virens, verrucis nigris notatum. Dillen.

Lichen (*aphrosus*) foliaceus repens lobatus obtusus

Digitized by Google

plenus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. Lin. 1616.

Lichenoides cinereum, ſegmentis argutis ſtellatis, ſcutellis nigris. Dillen.

Lichen (*ſtellaris*) imbricatus, foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. L. 1611.

Am Haynberge, an Tannen.

Lichenoides paruum vireſcens, peltis nigricantibus planis. Dillen.

Lichen (*venoſus*) foliaceus repens ouatus planus, ſubtus venoſus villoſus, peltis marginalibus horizontalibus. Lin. 1015.

Ebendaſelbſt an dem Wege nach dem Luſthauſe.

Lichenoides tartareum farinaceum, ſcutellarum vmbone fuſco. Dill.

Lichen (*tartareus*) cruſtaceus ex albido vireſcens, ſcutellis flaueſcentibus, margine albo. Lin. 1608.

Lichenoides rigidum eryngii folia referens. Dillen.

Lichen (*islandicus*) foliaceus adſcendens laciniatus, marginibus eleuatis ciliatis. Lin. 1611.

Bey Liebſchwiz im Fichtenwalde, auch bey Rotenburg. Iſt etwas ſelten.

Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum, *lacunoſum* et cirrhoſum. Dill.

Lichen (*ſaxatilis*) imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis folio concoloribus. L. 1609.

Auf Steinen und Ziegeldächern.

Lichenoides vulgare ſinuoſum, foliis et ſcutellis luteis. Dill.

Lichen (*parietinus*) imbricatus, foliis criſpis fuluis, peltis concoloribus fuluis. Lin. 1610.

Ebendaſelbſt.

Lichenoides oliuaceum, ſcutellis amplioribus verrucoſis. Dillen.

Lichen (*oliuaceus*) imbricatus, foliolis lobatis nitidis liuidis. Linn. 1610.

An Bäumen, Steinen und Dächern.

Liche-

Digitized by Google

Lichenoides hiſpidum maius et rigidius, ſcutellis nigris. Dillen.

Lichen (*ciliaris*) foliaceus erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. Linn. 1611.

An Bäumen.

Lichenoides ceratophyllum obtuſius et minus ramoſum. Dillen.

Lichen (*phyſodes*) imbricatus, laciniis obtuſis ſubinflatis. Lin. 1610.

Im Haynberge, an Bäumen.

Lichenoides tartareum tinctorium candidum, tuberculis atris. Dillen.

Lichen (*calcareus*) leproſus candidus, tuberculis atris. Lin. 1604.

Auf Steinen.

Lichenoides nigro-flauum tabulae geographicae inſtar pictum. Dillen.

Lichen (*geographicus*) leproſus flaueſcens, lineolis nigris mappam referens. Lin. ib.

Lichen cruſtaceus ſaxatilis niger, papillis maximis flauis. v. Haller.

Lichen (*atro-virens*) leproſus ater, tuberculis viridibus confertis. Lin. 1607.

Mit jenen auf Steinen.

Coralloides fungiforme carneum, baſi leproſa. Dill.

Fungilli incarnati coloris minuti muſco inſidentes. Mentz. pag. 4. 6.

Lichen (*ericetorum*) leproſus candidus, tuberculis incarnatis. Linn. 1608.

Auf grieſigten Gegenden des Haynberges.

Coralloides ſcyphiforme, tuberculis fuſcis. Dill.

Lichen (*pyxidatus*) ſcyphifer ſimplex, crenulatus tuberculis fuſcis. Lin. 1619.

Lichen pyxidatus prolifer. Vaill.

Lichen (*pyxidatus*) β. L. ib.

Digitized by Google

Coralloides scyphiforme gracile, marginibus serratis. Dillen. Lichen pyxidatus minor. Vaill.

Lichen (*fimbriatus*) scyphifer simplex denticulatus, stipite cylindrico. Lin. 1619.

Mit jenem im Haynberge.

Coralloides corniculis longioribus et rarioribus. Dill.

Lichen (*subulatus*) fruticulosus subdichotomus, ramis simplicibus subulatis. Lin. 1621.

Coralloides perforatum minus molle et tenue. Dill.

Lichen (*vncialis*) fruticulosus perforatus, ramulis breuissimis acutis. Lin. 1621.

Vsnea vulgatissima tenuior et breuior cum orbiculis. Dillen.

Lichen (*floridus*) filamentosus ramosus erectus, scutellis radiatis. Linn. 1624.

Auf dem Haynberge.

Vsnea barbata, loris tenuibus fibrosis. Dillen.

Lichen (*barbatus*) filamentosus pendulus subarticulatus, ramis patentibus. Lin. 1622.

An Birken, Tannen und Fichten, oft von beträchtlicher Größe.

Vsnea vulgaris, loris longis implexis. Dill.

Lichen (*plicatus*) filamentosus pendulus, ramis implexis, scutellis radiatis. Lin. 1622.

Vsnea capillacea et nodosa. Dill.

Lichen (*articulatus*) filamentosus, ramis tenuissimis punctatis. Lin. 1623.

An verschiedenen Bäumen.

Badiaga maior, Buxbaumii. Equisetum foetidum sub aqua repens. C. Bauh.

Chara (*vulgaris*) caulibus laeuibus, frondibus interne dentatis. Lin. 1624.

Bey Liebschwiz im Mühlteiche und nach Dienz im Schmiedelischen Teiche.

Tremella terrestris sinuosa pinguis et fugax. Dillen.

Tremella (*Nostoc*) plicata vndulata. Lin. 1625.

Sie

Digitized by Google

Sie entſteht nach warmen Gewitterregen, an ſteinigten und andern Gegenden.

Lichenoides tuberculoſum compreſſum, lignis putridis adnaſcens Dill.

Scheint eine Varietät von der

Tremella (*purpurea*) ſubgloboſa ſeſſili ſolitaria glabra. Lin. 1626. zu ſeyn.

An alten Bäumen.

Conferua filamentis longis geniculatis ſimplicibus. Dill.

Conferua (*capillaris*) filis geniculatis ſimplicibus, articulis alternatim compreſſis. Lin. 1636.

Bey Frankenthal, im Bache bey der Mühle.

Conferua paluſtris bombycina. Dillen.

Conferua (*bulboſa*) filamentis aequalibus ramoſis, bullas aereas includens. Lin. 1634.

Im Rathsteiche.

Conferua riuulorum capillacea, denſiſſime congeſtis ramulis. Dill.

Conferua (*canalicularis*) filamentis aequalibus, baſin verſus remotioribus. Lin. 1634.

In Bächen.

Conferua fluuiatilis ſericea vulgaris et fluitans. Dill.

Conferua (*riuularis*) filamentis ſimpliciſſimis aequalibus longiſſimis. Linn. 1634.

Ebendaſelbſt.

Conferua fontinalis ramoſiſſima glomeratim congeſta. Dillen.

Conferua (*glomerata*) filamentis geniculatis, ramulis breuioribus multifidis. Lin. 1637.

Bey dem Unterhauſe, im Grunde nach Fenſee, auch in Brunneuröhren.

4.
Schwämme.

a) Mit Blättern oder Lamellen an der untern Seite des Huthes.

Fungus anguloſus et velut in lacinias ſectus. C. Bauh.

Agaricus (*Canthacellus*) ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. L. 1639.

Am Haynberge.

Fungus pileo ſanguineo verrucoſo, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulboſo. v. Haller.

Agaricus (*Muſcarius*) ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite voluato, apice dilatato, baſi ouato. Lin. 1640.

Bey Ebersdorf im Rathsholze.

Fungus orbicularis ex albida pratenſis. v. Haller.

Agaricus (*Georgii*) ſtipitatus, pileo flauo conuexo, lamellis albis. Lin. 1643.

Fungus viſcidus papillaris ſtriatus terreus, ſubtus albus. v. Haller.

Agaricus (*clypeatus*) ſtipitatus, pileo hemiſphaerico viſcido acuminato, lamellis albis, ſtipite longo cylindrico albo. Lin. 1642.

Fungus multiplex obtuſe conicus, colore griſeo murino. Vaill.

Agaricus (*campanulatus*) ſtipitatus, pileo campanulato ſtriato pellucido, lamellis adſcendentibus, ſtipite nudo. Lin. 1643.

An alten Schutthaufen.

Fungus minimus totus albus, pileo hemiſphaerico vtrinque ſtriato, lamellis rarioribus. Mich.

Agaricus (*vmbelliferus*) ſtipitatus, pileo plicato membranaceo, lamellis baſi latioribus. Lin. ib.

Im Fichtenwalde.

Fungus minor, capitulo pileum nauticum referente. Buxb.

Agaricus (*mammoſus*) ſtipitatus, pileo conuexo acuminato griſeo, lamellis conuexis griſeis crenatis, ſtipite nudo. Linn. 1642.

Eben

Digitized by Google

Ebendaſelbſt.

Fungus albus ouum referens. Buxb.

Agaricus (*fimetarius*) ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. Lin. 1643.

Auf Miſtbeeten.

Fungus minimus aurantius mammillaris. Vaill.

Agaricus (*clauus*) ſtipitatus, pileo luteo conuexo, ſtriato, lamellis ſtipiteque alba. Lin. 1644.

In Wäldern.

Fungus pileo conuexo caſtaneo, lamellis luteis. v. Haller.

Agaricus (*cinnamomeus*) ſtipitatus, pileo ſordide flauo, lamellis luteo ruffis. Lin. 1642.

Im Stadtholze und am Haynberge.

Fungus flauo-ruffus in medio depreſſus, lacte non acri manans. v. Haller.

Agaricus (*lactifluus*) ſtipitatus, pileo plano carneo lacteſcente, lamellis ruffis, ſtipite longo carneo. Lin. 1614.

Iſt eßbar.

Fungus campeſtris albus ſuperne, inferne rubens. I. Bauh. v. Haller.

Agaricus (*campeſtris*) ſtipitatus, pileo conuexo ſquamato albido, lamellis ruffis. Linn. 1641.

Champignons.

Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. C. Bauh. v. Haller.

Agaricus (*piperatus*) ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente, margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis. Lin. 1641.

Fungus eſculentus bulboſus dilute purpureus. Mich.

Agaricus (*Violaceus*) ſtipitatus, pileo rimoſo, margine

Digitized by Google

gine violaceo tomentoſo, ſtipite coeruleſcente, lana ferruginea. Lin. 1641.

Im Tannen- und Fichtenwalde, im Haynberge.

Agarico-fungus lamellis craſſiſſimis rigidis. v. Haller.

Agaricus (*Quercinus*) acaulis, lamellis labyrinthiformibus. Lin. 1644.

Agarico-fungus, lamellis bifidis puluerulentis. v. Haller.

Agaricus (*alneus*) acaulis, lamellis bifidis puluerulentis. Lin. 1645.

Agaricus ſquamoſus coriaceus, ſuperne birſutus, inferne toroſus et variorum colorum. v. Haller.

Agaricus (*betulinus*) acaulis coriaceus villoſus, margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus. Linn. 1645.

Wachſen zuſammen an Bäumen und alten Stämmen.

b) Mit Löchern an der untern Seite des Huthes.

Agarico-polyporus verſicoloribus lineis varius, poris albis tenuiſſimis. v. Haller.

Boletus (*verſicolor*) acaulis, faſciis dicoloribus, poris albis. Lin. 1645.

In Wäldern.

Agaricus pedis equini facie. Tournef.

Boletus (*igniarius*) acaulis puluinatus laeuis, poris tenuiſſimis. Lin. 1645.

An Fichten und Pappelbäumen.

Suillus annulatus terreus, inferne flaueſcens. v. Hall.

Boletus (*luteus*) ſtipitatus, pileo puluinato ſubuiſcido, poris rotundatis conuexis flauiſſimis, ſtipite albido. Lin. 1646.

Im

Digitized by Google

Im Stadtholze.

Suillus fuluus inferne ex flauo virescens. v. Haller.

Boletus (*bouinus*) stipitatus, pileo glabro puluinato marginato, poris compositis acutis, porulis angulatis breuioribus. Linn. ib.

c) Mit Stacheln an der untern Seite des Huthes.

Erinaceus esculentus, pallide luteus. Mich.

Hydnum (*repandum*) stipitatum, pileo conuexo laeui flexuoso. Lin. 1647.

Hirschschwamm.

Erinaceus esculentus albus crassus. Mich.

Hydnum (*imbricatum*) stipitatum, pileo conuexo imbricato. Lin. 1647.

d) Mit einer napförmigen Oberfläche.

Phallus vulgaris totus albus, volua rotunda, pileo cellulato, ac summa parte vmbilico peruio ornata. Mich.

Phallus (*impudicus*) voluatus stipitatus, pileo celluloso. Lin. 1648.

Gichtmorcheln. Im Stadtholze.

Boletus esculentus rugosus. Mich. 1. 2. 3.

Phallus (*esculentus*) pileo ouato celluloso mudo rugoso. Lin. ib.

Morcheln. Sind eßbar.

e) Mit

Digitized by Google

e) Mit einem gegitterten Körper.

Boletus cancellatus purpureus. Tournef.

Clathrus (*cancellatus*) acaulis ſubrotundus. Lin. 1648.

Im Haynberge. Sind eßbar.

f) Mit einem glockenförmigen Körper.

Cyathoides cyathiformis cinereum et veluti ſericeum. Mich.

Peziza (*lentifera*) campanulata. Lin. 1649.

In Miſtbeeten und auf alten Bretern.

Peziza lutea parua, marginibus laeuibus. Raii.

Peziza (*cyathoides*) margine obtuſo erecto. Lin. 1651.

Fungoides maximum pyxidatum. Vaill.

Peziza (*Acetabulum*) cyathiformis, extus angulata, venis ramoſis. Linn. 1650.

Mit ienem in Wäldern.

Peziza lutea parua, marginibus piloſis. Rai.

Peziza (*ſcutellata*) plana, margine conuexo piloſo. Lin. 1651.

An alten Wänden.

g) Mit einem kaulenförmigen Körper.

Clauaria maior lutea. Michel.

Clauaria (*piſtillaria*) clauaeformis ſimpliciſſima. Lin. 1651.

Im Haynberge.

Clauaria ophioglosſoides nigra. Vaill.

Clauaria (*ophioglosſoides*) clauata integerrima, compreſſa obtuſa. Lin. 1652.

Im

Im Fichten und Kiefernwalde, an alten Stöcken.

Coralloides flaua albida. Tournef.

Clauaria (*coralloides*) ramis confertis ramosissimis inaequalibus. Lin. 1652.

Ziegenbart. Sowohl die Größe, als Farbe, macht hier verschiedene Spielarten.

Fungus paruus ramosus luteus. Rai.

Clauaria (*muscoides*) ramis ramosis acuminatis inaequalibus luteis. L. ib.

Agaricus digitatus niger. Tournef.

Clauaria (*digitata*) ramosa lignea nigra. Lin. 1652.

In Wäldern an alten Bäumen.

Hypoxylon. Rupp. 384.

Clauaria (*Hypoxylon*) ramoso-cornuta compressa. Lin. 1652.

An faulenden Orten.

b) Mit einem kugelförmigen Körper, mit Pulver erfüllt.

Lycoperdon parisiense minimum pediculo donatum. Tournef.

Lycoperdon (*pedunculatum*) stipite longo, capitulo globoso glabro, ore cylindrico integerrimo. Lin. 1654.

In der Allee im Haynberge.

Lycoperdon vulgare. Tournef.

Lycoperdon (*Bouista*) subrotundum, lacerato-dehiscens. Lin. 1653.

Bovist. Bey der Cuba Mühle, wo ich sie von beträchtlicher Größe gefunden.

Lycoperdon pyriforme, gregatim nascens, verrucosum et asperum subfuscum. Rupp.

Im

Digitized by Google

Im Walde des Haynberges.

Lycoperdon verrucosum, ventricosum et subfuscum veluti echinatum. Rupp.

Sind Varietäten von iener.

Tuber Matth.

Lycoperdon (*Tuber*) globosum solidum muricatum, radice destitutum. Lin. 1653.

Trüffeln. Bey Gros-Sara im Eichenwalde. Man findet sie von verschiedener Farbe, die weißen sind nicht eßbar.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google


Digitized by Google

Digitized by Google